

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/002337

International filing date: 16 February 2005 (16.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-038918
Filing date: 16 February 2004 (16.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 20 May 2005 (20.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 2 月 1 6 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 0 3 8 9 1 8

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号
J P 2 0 0 4 - 0 3 8 9 1 8
The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

出 願 人
Applicant(s): 第一製薬株式会社

2 0 0 5 年 4 月 2 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】	特許願
【整理番号】	P046130
【提出日】	平成16年 2月16日
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	A61P 31/00 A61P 31/10 C07D471/04 A61K 31/437 A61K 31/4375 A01N 37/34
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社内
【氏名】	川上 勝浩
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社内
【氏名】	金井 一夫
【発明者】	
【住所又は居所】	富山県高岡市長慶530番地 第一ファインケミカル株式会社内
【氏名】	藤沢 哲則
【発明者】	
【住所又は居所】	富山県高岡市長慶530番地 第一ファインケミカル株式会社内
【氏名】	森田 親典
【発明者】	
【住所又は居所】	富山県高岡市長慶530番地 第一ファインケミカル株式会社内
【氏名】	鈴木 貫
【特許出願人】	
【識別番号】	000002831
【氏名又は名称】	第一製薬株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100105647
【弁理士】	
【氏名又は名称】	小栗 昌平
【電話番号】	03-5561-3990
【選任した代理人】	
【識別番号】	100105474
【弁理士】	
【氏名又は名称】	本多 弘徳
【電話番号】	03-5561-3990
【選任した代理人】	
【識別番号】	100108589
【弁理士】	
【氏名又は名称】	市川 利光
【電話番号】	03-5561-3990
【選任した代理人】	
【識別番号】	100115107
【弁理士】	
【氏名又は名称】	高松 猛
【電話番号】	03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 濱田 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1


【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

下式（I）で表される化合物、その塩、またはそれらの溶媒和物。

【化 1】



【式中、

R^1 は、置換基を有していてもよい塩基性基を意味し、


R^2 は、

水素原子、

ハロゲン原子、

カルボキシ基、下式

【化 2】



（式中、 R^{21} および R^{22} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。）で表される基、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、

炭素数 2 から 6 のアルケニル基、

炭素数 2 から 6 のアルキニル基、

炭素数 2 から 7 のアシル基、

炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、

炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、

炭素数 5 から 6 のシクロアルケニル基、

炭素数 4 から 12 のシクロアルキルアルキル基、

炭素数 6 から 10 のアリール基、

炭素数 7 から 12 のアラルキル基、

炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）

炭素数 3 から 10 のヘテロアリール基、または

炭素数 3 から 12 のヘテロアリールアルキル基を意味するが、

R^2 が、

アルキル基、

アルケニル基、

アルキニル基、


アシル基、または

アルコキシカルボニル基である場合、これらは、【置換基群 2-1】から選ばれる 1 種以上の基 1 個以上を置換基として有していてもよい；

【置換基群 2-1】：

ハロゲン原子、
 アミノ基、
 イミノ基、
 ニトロ基、
 水酸基、
 メルカプト基、
 カルボキシ基、
 シアノ基、
 スルホ基、
 ジアルキルホスホリル基、下式

【化3】



(式中、 R^{211} および R^{221} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。)で表される基、

炭素数1から6のアルコキシ基、
 炭素数1から6のアルキルチオ基、
 炭素数2から7のアシル基、
 炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、
 炭素数3からの6シクロアルキル基、
 炭素数6から10のアリール基、および
 炭素数6から10のアリールチオ基；

ここで【置換基群2-1】のアミノ基は、
 ホルミル基、

炭素数1から6のアルキル基、
 炭素数1から6のアミノアルキル基、
 炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、
 炭素数1から6のメルカプトアルキル基、
 炭素数2から7のアシル基、
 炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、
 炭素数3から6のシクロアルキル基、
 炭素数6から10のアリール基、
 炭素数7から12のアラルキル基、

芳香族複素環基、

炭素数1から6のアルキルスルホニル基、および

炭素数6から10のアリールスルホニル基

からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、さらに、
 該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよく、

【置換基群2-1】の水酸基、または【置換基群2-1】のメルカプト基は、


炭素数1から6のアルキル基、
 炭素数1から6のアミノアルキル基、
 炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、
 炭素数1から6のメルカプトアルキル基、
 炭素数2から7のアシル基、
 炭素数3から6のシクロアルキル基、
 炭素数6から10のアリール基、
 炭素数7から12のアラルキル基、

芳香族複素環基からなる群から選ばれる１種以上のヘテロ原子を１個から４個含む。）
からなる群から選ばれる置換基を有していてもよく、
 R^{212} が、シクロアルキル基であるときは、これらは【置換基群２－２】から選ばれる１種以上の基１個以上を置換基として有していてもよい；

【置換基群２－２】：

ハロゲン原子、
アミノ基、
イミノ基、
ニトロ基、
水酸基、
メルカプト基、
カルボキシ基、
シアノ基、
スルホ基、下式

【化４】



（式中、 R^{212} および R^{222} は、各々独立して、水素原子、炭素数１から６のアルキル基、または炭素数６から１０のアリール基を表す。）で表される基、

炭素数１から６のアルコキシ基、
炭素数１から６のアルキルチオ基、
炭素数２から７のアシル基、および
炭素数１から７のアルコキシカルボニル基、

【置換基群２－２】のアミノ基は、

ホルミル基、
炭素数１から６のアルキル基、
炭素数１から６のアミノアルキル基、
炭素数１から６のヒドロキシアルキル基、
炭素数１から６のメルカプトアルキル基、
炭素数２から７のアシル基、
炭素数２から７のアルコキシカルボニル基、
炭素数３から６のシクロアルキル基、
炭素数６から１０のアリール基、
炭素数７から１２のアラルキル基、
芳香族複素環基、

炭素数１から６のアルキルスルホニル基、および

炭素数６から１０のアリールスルホニル基

からなる群から選ばれる１個または２個の基を置換基として有していてもよく、さらに、
該アミノ基の置換基が２個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

R^{212} が、

アリール基、
アラルキル基、
ヘテロアリール基、または


ヘテロアリールアルキル基である場合、これらは【置換基群２－３】から選ばれる１種以上の基１個以上を置換基として有していてもよい；

【置換基群２－３】：

ハロゲン原子、

アミノ基、
イミノ基、
ニトロ基、
水酸基、
メルカプト基、
カルボキシ基、
シアノ基、
スルホ基、下式

【化5】



（式中、 R^{213} および R^{223} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を意味する。）で表される基、

炭素数1から6のアルコキシ基、

炭素数1から6のアルキルチオ基、

炭素数2から7のアシル基、

炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、

炭素数7から12のアラルキルオキシ基、

炭素数8から15のアラルキルオキシカルボニル基、

アリール基、および

炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。）；

【置換基群2－3】のアミノ基は、

ホルミル基、

炭素数1から6のアルキル基、

炭素数1から6のアミノアルキル基、

炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、

炭素数1から6のメルカプトアルキル基、

炭素数2から7のアシル基、

炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、

炭素数3から6のシクロアルキル基、

炭素数6から10のアリール基、

炭素数7から12のアラルキル基、

芳香族複素環基、

炭素数1から6のアルキルスルホニル基、および

炭素数6から10のアリールスルホニル基

からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

R^2 が、複素環基である場合は、次の【置換基群2－4】から選ばれる1個または2個の基を置換基として有してもよい；

【置換基群2－4】：

ハロゲン原子、

アミノ基、


水酸基、

メルカプト基、

カルボキシ基、

スルホ基、下式

【化6】



(式中、 R^{214} および R^{224} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。)で表される基、

炭素数1から6のアルキル基、

炭素数2から6のアルケニル基、

炭素数2から6のアルキニル基、

炭素数1から6のアルコキシ基、

炭素数1から6のアルキルチオ基、

炭素数1から6のハロゲノアルキル基、

炭素数2から7のアシル基、

炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、および

炭素数6から10のアリール基；

ここで、【置換基群2-4】のアミノ基は、

ホルミル基、

炭素数1から6のアルキル基、

炭素数1から6のアミノアルキル基、

炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、

炭素数1から6のメルカプトアルキル基、

炭素数2から7のアシル基、

炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、

炭素数3から6のシクロアルキル基、

炭素数6から10のアリール基、

炭素数7から12のアラルキル基、

炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。）

、

芳香族複素環基、

炭素数1から6のアルキルスルホニル基、および

炭素数6から10のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、さらに、

該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

また、 R^1 と R^2 とが一緒になり、これらが結合している炭素原子を含んで、環状構造を形成してもよく、この環内には、窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種または1種以上のヘテロ原子を1個から2個を含み、ここで形成される構造部分は、飽和でも不飽和でもいずれでもよい。

R^3 は、

水素原子、

ハロゲン原子、

アミノ基、

水酸基、

メルカプト基、


ニトロ基、

シアノ基、

ホルミル基、

カルボキシ基、下式

【化 7】



(式中、 R^{31} および R^{32} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。) で表される基、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、

炭素数 2 から 6 のアルケニル基、

炭素数 2 から 6 のアルキニル基、

炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、

炭素数 2 から 5 のアシル基、

炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基、

炭素数 3 から 7 のシクロアルキル基、

炭素数 4 から 7 のシクロアルケニル基、

炭素数 6 から 10 のアリール基、

炭素数 7 から 12 のアラルキル基、

炭素数 3 から 10 のヘテロアリール基を意味するが、

該アミノ基、該水酸基、または該メルカプト基は、保護基によって保護されていてもよい。

R^3 が、

アルキル基、

アルケニル基、

アルキニル基、

アルコキシ基、

アルキルチオ基、

アシル基、

アルコキシカルボニル基、

シクロアルキル基、

シクロアルケニル基、

アリール基、

アラルキル基、または

ヘテロアリール基である場合、

これらは【置換基群 3-1】から選ばれる 1 種以上の基を 1 個以上置換基として有していてもよい。

【置換基群 3-1】：

アミノ基、

水酸基、

メルカプト基、

ハロゲン原子、

炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、

炭素数 2 から 5 のアシル基、および

炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基；

【置換基群 3-1】のアミノ基は、

ホルミル基、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、

炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、


炭素数 6 から 10 のアリール基、
 芳香族複素環基、
 炭素数 2 から 5 のアシル基、および
 炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基
 からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、
 該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。
 また、 R^2 と R^3 とが一緒になってポリメチレン鎖構造を形成し、 R^2 と R^3 が結合する炭素原子を含んで、5 員環または 6 員環の環状構造を形成してもよい。さらにこのポリメチレン鎖は、窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 または 2 個含んでいてもよい。
 ここで形成されたポリメチレン鎖は、【置換基群 3-2】から選ばれる 1 種以上の基を 1 個以上置換基として有していてもよい。

【置換基群 3-2】：

アミノ基、
 水酸基、
 メルカプト基、
 ハロゲン原子、
 炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
 炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、
 炭素数 2 から 5 のアシル基、および
 炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基；

【置換基群 3-2】のアミノ基は、
 ホルミル基、
 炭素数 1 から 6 のアルキル基、
 炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、
 炭素数 6 から 10 のアリール基、
 芳香族複素環基、
 炭素数 2 から 5 のアシル基、および
 炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基
 からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、
 該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。
 R^4 は、
 水素原子、
 炭素数 1 から 4 のアルキル基、
 炭素数 3 から 8 の環状アルキル基、
 炭素数 6 から 10 のアリール基、
 炭素数 5 から 9 のヘテロアリール基、
 炭素数 2 から 6 のアルキニル基、または下式

【化 8】



(式中、 R^{41} および R^{42} は、各々独立に、
 水素原子、
 炭素数 1 から 6 のアルキル基、
 炭素数 1 から 6 のアルコキシ基であるか、
 または、両者が一体化して、エクソメチレン構造となってもよく、

このエクソメチレン構造は、さらに
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
または炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基
を置換基として有していてもよい。

R^{43} は、
水素原子、
ハロゲン原子、
水酸基、
メルカプト基、
ニトリル基、
ニトロ基、
カルボキシ基、
炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 2 から 7 のアルキルアミノカルボニル基、
炭素数 7 から 11 のアリールアミノカルボニル基、
炭素数 2 から 7 のシクロアルキルアミノカルボニル基、
炭素数 8 から 12 のアラルキルアミノカルボニル基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
炭素数 3 から 8 のシクロアルキル基、
炭素数 3 から 8 のシクロアルキルオキシ基、
炭素数 7 から 11 のアラルキル基、または
炭素数 7 から 11 のアラルキルオキシ基を意味する。)


で表される基であるが、

R^4 が、アルキル基、環状アルキル基、アリール基、またはヘテロアリール基である場合、そして R^{43} がアルキル基である場合、これらは【置換基群 4】から選ばれる 1 種以上の基を 1 個以上置換基として有していてもよい。

【置換基群 4】：

ハロゲン原子、
アミノ基、
イミノ基、
ニトロ基、
水酸基、
メルカプト基、
カルボキシ基、
シアノ基、
スルホ基、下式

【化 9】



(式中、 R^{411} および R^{421} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を意味する。)

で表される基、

炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 7 から 12 のアラルキルオキシ基、
炭素数 8 から 15 のアラルキルオキシカルボニル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、および
炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）
；

【置換基群 4】のアミノ基は、
ホルミル基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
芳香族複素環基、
炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および
炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基
からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、
該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【置換基群 4】の水酸基、または【置換基群 4】のメルカプト基は、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
芳香族複素環基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよく、
 R^4 が、アルキニル基の場合は、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 2 から 12 のアルコキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、または
カルボキシ基、
を置換基として有していてもよい。

X^1 および X^2 は、各々独立に、
窒素原子であるかまたは、
ハロゲン原子、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
置換基を有していてもよい炭素数 1 から 6 のアルキル基、
もしくはエステル基で置換されていてもよい炭素原子を意味するが、
 X^1 および X^2 のいずれか一方は必ず窒素原子である。
ここで、アルキル基の置換基は、次の置換基の群から選ばれる、1 または 1 以上の基である。

ハロゲン原子、
アミノ基、
ニトロ基、
水酸基、
メルカプト基、
カルボキシ基、
シアノ基、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 3 からの 6 シクロアルキル基、および
炭素数 6 から 10 のアリール基；
炭素原子上の置換基がエステルであるときこれらは、
炭素数 1 から 6 のアルキルエステル、
炭素数 6 から 10 のアリールエステル、
または炭素数 1 から 6 のアルキル基と炭素数 6 から 10 のアリール基とから構成されるアラルキルエステルでよく；
さらにこれらのアリールエステルおよびアラルキル基のアリール部分は、次の置換基の群から選ばれる、1 または 1 以上の基によって置換されていてもよい；
ハロゲン原子、
アミノ基、
ニトロ基、
水酸基、
メルカプト基、
カルボキシ基、
シアノ基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 3 からの 6 シクロアルキル基、および
炭素数 6 から 10 のアリール基；
を意味する。】

【請求項 2】

R¹の塩基性基が、置換基を有していてもよいアミノ基、置換基を有していてもよい含窒素複素環基、置換基を有していてもよい炭素数 1 から 8 のアミノアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数 1 から 8 のアミノシクロアルキル基、または置換基を有していてもよい炭素数 6 から 10 のアミノアリール基である、請求項 1 に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。


【請求項 3】

R¹の置換基を有していてもよいアミノ基が、該置換基が置換基群【1-1】から選ばれる、1 または 2（2 のときは同一でも異なってもよい）の置換基であるところの置換基を有していてもよいアミノ基であり；

置換基群【1-1】：

ホルミル基、

下式



(式中、 R^{11} および R^{12} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。)

で表される基、

炭素数1から6のアルキル基、

炭素数2から6のアルケニル基、

炭素数2から6のアルキニル基、

炭素数2から6のアシル基、

炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、

炭素数3から10のシクロアルキル基、

炭素数4から10のシクロアルケニル基、

炭素数6から10のアリール基、

炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。）

、および

アミノ酸、ジペプチド、もしくは3個から5個のアミノ酸からなるポリペプチドから導かれる基；

ここで、置換基を有していてもよいアミノ基の置換基が、

アルキル基、

アルケニル基、

アルキニル基、

アシル基、

アルコキシカルボニル基、

シクロアルキル基、

シクロアルケニル基、または

アリール基である場合、

これらは【置換基群1-1-1】から選ばれる1種以上の基を1個以上置換基として有していてもよい；

【置換基群1-1-1】：

アミノ基、

炭素数1から6のアミノアルキル基（これらのアミノ基または炭素数1から6のアミノアルキル基のアミノ基部分は、保護基によって保護されているかまたは、炭素数1から6のアルキル基を1個または2個有していてもよいが、アルキル基を2個有する場合は同一でも異なってもよい。）、

水酸基、

メルカプト基、

ハロゲン原子、

炭素数1から6のアルコキシ基、

炭素数1から6のアルキルチオ基、

炭素数2から7のアシル基、

炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、

炭素数6から10のアリール基、

炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。）

、

炭素数2から7のアルキルカルボニルアミノ基、および


炭素数 3 から 10 のシクロアルキル基；

R¹の置換基を有していてもよい含窒素複素環基が、含窒素複素環基が、窒素原子を結合部位とし、飽和、部分飽和、もしくは不飽和であって、炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）であり、さらにこの複素環基上の置換基が【置換基群 1-2】から選択される 1 種または 1 種以上の 1 または 1 以上の基であるところの置換基を有していてもよい含窒素複素環基であり；

【置換基群 1-2】：

ハロゲン原子、
アミノ基、
水酸基、
オキソ基、下式

【化 11】



（式中、R¹¹¹およびR¹²¹は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。）

で表される基、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、

炭素数 1 から 8 のアルキルアミノ基、

炭素数 3 から 8 のシクロアルキルアミノ基、

炭素数 6 から 10 のアリール基、

炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）

、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、

炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、および

炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基；

ここで、【置換基群 1-2】のアルキル基、

アルキルアミノ基、

シクロアルキルアミノ基、

アルコキシ基、

アルキルチオ基、

ハロゲノアルキル基、または

アミノアルキル基のアルキル部分は、【置換基群 1-2-1】から選ばれる 1 種以上の基 1 個以上を置換基として有してもよく；

【置換基群 1-2-1】：

ハロゲン原子、

水酸基、

カルボキシ基、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、

炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、

炭素数 2 から 7 のアルキルカルボニルアミノ基、

炭素数 6 から 10 のアリール基、および

炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子

、および硫黄原子からなる群から選ばれる１種以上のヘテロ原子を１個から４個含む。）

ここで、【置換基群１－２】のアミノ基、

アミノアルキル基、および

アルキルアミノ基の

アミノ基部分は、保護基によって保護されていてもよく、また、

炭素数１から６のアルキル基（水酸基、ハロゲン原子、炭素数１から６のアルコキシ基、およびアルキルチオ基からなる群から選ばれる１種以上の基を１個以上置換基として有していてもよい。）を置換基として１個または２個有していてもよく、また、アミノ酸、ジペプチド、または３個から５個のアミノ酸からなるポリペプチドが結合していてもよい；

さらに、 R^1 の

置換基を有していてもよい炭素数１から８のアミノアルキル基、

置換基を有していてもよい炭素数１から８のアミノシクロアルキル基、または

置換基を有していてもよい炭素数６から１０のアミノアリール基の、

各々のアミノ基部分は、保護基によって保護されているか、または

炭素数１から６のアルキル基（水酸基、ハロゲン原子、炭素数１から６のアルコキシ基、およびアルキルチオ基からなる群から選ばれる１種以上の基１個以上を置換基として有していてもよい。）を置換基として１個または２個有しているか、あるいは、アミノ酸、ジペプチド、または３個から５個のアミノ酸からなるポリペプチドが結合していてもよいアミノ基であり、

さらにアミノ基以外の部分が【置換基群１－３】から選ばれる１種または１種以上の、１または１以上の基を置換基として有していてもよいところのアミノアルキル基、アミノシクロアルキル基、およびアミノアリール基；

である請求項２に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。

【置換基群１－３】：

ハロゲン原子、

アミノ基、

水酸基、


メルカプト基、

ニトロ基、

シアノ基、

カルボキシ基、下式

【化１２】



（式中、 R^{13} および R^{14} は、各々独立して、水素原子、炭素数１から６のアルキル基、または炭素数６から１０のアリール基を表す。）で表される基、

炭素数１から６のアルキル基、

炭素数１から８のアルキルアミノ基、

炭素数１から６のアルコキシ基、

炭素数２から７のアシル基、

炭素数３から６のシクロアルキル基、

炭素数３から８のシクロアルキルアミノ基、

炭素数４から１２のシクロアルキルアルキル基、

炭素数３から６のシクロアルキルオキシ基、

炭素数６から１０のアリール基、

炭素数６から１０のアリールアミノ基、

炭素数 7 から 12 のアラルキル基、および
炭素数 6 から 10 のアリールオキシ基；
ここで、【置換基群 1－3】のアミノ基は、
ホルミル基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
芳香族複素環基、
炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および
炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基
からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、
さらに、
該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい；
そして、【置換基群 1－3】の水酸基またはメルカプト基は、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、および
芳香族複素環基からなる群から選ばれる基を置換基として有していてもよい。

【請求項 4】

R¹が、置換基を有していてもよい含窒素複素環基である請求項 1 から 3 のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。


【請求項 5】

R¹が、置換基を有していてもよい含窒素複素環基が飽和の含窒素複素環基である請求項 4 に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。

【請求項 6】


R¹が、下式で表される基である請求項 5 に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物；

【化 13】



【式中、X a は、酸素原子、硫黄原子、置換基または N R⁵²を意味する。
R⁵¹および R⁵²は、各々独立に、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のハロゲンアルキル基、または炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基を意味し、置換基 Q は、次式、

【化 1 4】



で表わされる置換基を意味し、

b は、0、1、または 2 の整数を意味し、

n は 0 または 1 の整数を意味し、

R⁶¹ および R⁶² は、各々独立に、

水素原子、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、または

炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基であるか、

アミノ酸、ジペプチド、もしくは個から 5 個のアミノ酸からなるポリペプチドを意味し、

R⁷¹ および R⁷² は、各々独立に、

水素原子、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、

炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、

炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、

炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、

炭素数 2 から 12 のアルコキシアルキル基、

炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、

置換基を有してもよいフェニル基、または

置換基を有していてもよい炭素数 3 から 10 のヘテロアリアル基を意味する。】


【請求項 7】

R² が、置換基を有していてもよい、炭素数 6 から 10 のアリアル基または炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）である請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。


【請求項 8】

R² が、下式化 1 5 または化 1 6 で表される基である請求項 7 に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。

【化 1 5】



【化 1 6】



（式中、X^b は、酸素原子、硫黄原子、置換基または N R⁸ を意味するが、ここで R⁸ は、水素原子、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、または

炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基を意味する。

置換基 Y¹ は、

ハロゲン原子、

アミノ基、

イミノ基、


ニトロ基、

水酸基、

メルカプト基、

カルボキシ基、
シアノ基、
スルホ基、下式

【化 17】



(式中、 R^{213} および R^{223} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を意味する。)で表される基、

炭素数1から6のアルコキシ基、

炭素数1から6のアルキルチオ基、

炭素数2から7のアシル基、

炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、

炭素数7から12のアラルキルオキシ基、

炭素数8から15のアラルキルオキシカルボニル基、

アリール基、および

炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基(窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。)を表し、

該アミノ基は、

ホルミル基、

炭素数1から6のアルキル基、

炭素数1から6のアミノアルキル基、

炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、

炭素数1から6のメルカプトアルキル基、

炭素数2から7のアシル基、

炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、

炭素数3から6のシクロアルキル基、

炭素数6から10のアリール基、

炭素数7から12のアラルキル基、

芳香族複素環基、

炭素数1から6のアルキルスルホニル基、および

炭素数6から10のアリールスルホニル基

からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。)

【請求項9】

R^3 が、

ハロゲン原子、

アミノ基、

水酸基、

メルカプト基、

置換基を有していてもよい炭素数1から4のアルキル基、

置換基を有していてもよい炭素数1から6のアルコキシ基、

炭素数1から6のアルキルチオ基、

炭素数2から5のアシル基、または

炭素数2から5のアルコキシカルボニル基

である請求項1から8のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。

このうち、アミノ基は、


ホルミル基、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
芳香族複素環基、
炭素数 2 から 5 のアシル基、および
炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基
からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、
該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【請求項 10】

R^3 が、下式化 18 で表される基である請求項 1 から 7 のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。

【化 18】



(式中、Me は、メチル基を意味し、halogen はハロゲン原子を意味する。)

R^9 は、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 3 から 7 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
芳香族複素環基を意味する。

置換基 Y^2 は、

アミノ基、

水酸基、

メルカプト基、

ハロゲン原子、

炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、

炭素数 2 から 5 のアシル基、または

炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基

を意味し、

このうちのアミノ基は、

ホルミル基、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、

炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、

炭素数 6 から 10 のアリール基、

芳香族複素環基、

炭素数 2 から 5 のアシル基、および

炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基

からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、

該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。


【請求項 11】

R^4 が、置換基を有していてもよい炭素数 1 から 4 のアルキル基である請求項 1 から 10 のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。

【請求項 12】

R^4 が下式

【化 1 9】



(R⁴¹、R⁴²、およびR⁴³は既に定義したとおりである。)

で表される構造の置換基である 1 から 1 0 のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。

【請求項 1 3】

請求項 1 から 1 2 のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物を含有する医薬。

【請求項 1 4】

請求項 1 から 1 2 のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物を含有する感染症治療剤。

【請求項 1 5】

請求項 1 から 1 2 のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物を含有する抗真菌剤。

【請求項 1 6】

請求項 1 から 1 2 のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物を使用する感染症の治療方法。

【請求項 1 7】

請求項 1 から 1 2 のいずれか一項に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物の感染症治療のための使用。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 抗真菌作用複素環化合物

【技術分野】

【0001】

本発明は、病原性真菌に対して抗真菌作用を示す化合物、その塩、またはこれらの溶媒和物に関する。またこれらを含む抗真菌剤に関する。

【背景技術】

【0002】

真菌は、ヒト、動物、植物等に感染して様々な疾病を引き起こすことが知られている。例えば、ヒトの皮膚の表皮角質層や爪、毛髪等の角化組織、口腔等の粘膜上皮に表在性真菌症を起こす他、体表面から深い部位にある皮膚組織に対しても深部皮膚真菌症を起こし、食道や内臓、脳などの深部組織でも深在性真菌症を起こす。ヒトに感染して深在性真菌症を起こす病原性真菌の主なものとしては、カンジダ属、クリプトコッカス属、アスペルギルス属等が知られ、表在性真菌症では、皮膚、口腔、膣等に感染するカンジダ属、手足の皮膚に感染する白癬菌等が主なものと考えられている。その他にも多様な真菌が存在し、動植物に感染すると考えられている。

【0003】

1950年以降の抗生物質、化学療法薬に関する研究開発の急速な進歩、およびそれらの広範な普及により、細菌性の感染症に対する多くの治療薬が開発されてきた。同様に抗真菌薬の開発へ向けても多大な努力が払われたが、抗菌化学療法剤の開発に比較して、現在臨床の場に供されている化合物は少ない。その一方で、医療現場における抗菌性薬剤（抗生物質や化学療法剤）の繁用、悪性腫瘍、白血病、臓器や骨髄移植、および後天性免疫不全症候群等により免疫力の低下したコンプロマイズトホストの増加等により、近年では深在性真菌症が増加して、問題となっている。

【0004】

現在の臨床の場にて使用されている主な抗真菌剤としては、ポリエンマクロライド系、フロロピリミジン系、アゾール系等がある。表在性真菌症の治療には、主に外用として使用され、それらには多種のアゾール系薬剤を始め、ポリエンマクロライド系のナイスタチン、グリセオフルビン、塩酸テルピナフィン、塩酸ブテナフィン、塩酸アモロルフィン等が用いられている。一方、近年増加が著しい深在性真菌症の治療においてはアゾール系フルコナゾールとイトラコナゾールが、他の薬物に比較して安全性が高いことから多用されているが、これらは抗菌スペクトルが狭いことが問題とされている。また、ポリエンマクロライド系薬剤であるアンホテリシンBは、抗菌スペクトルが広く有効性も高いが、毒性（副作用）の面からみて問題がある。さらに、フロロピリミジン系薬剤であるフルシトシンは、毒性は低いものの容易に真菌の耐性化を招く。このように、現在、深在性真菌症の治療に使用されている薬剤は、抗菌スペクトル、有効性、安全性等の面からみて医療満足度の高いものは極めて少ない。さらに、これら抗深在性真菌剤のうちで特に多用されているフルコナゾールは病原性真菌のうち、例えば、カンジダ・グラブラタ、カンジダ・トロピカリス、カンジダ・クルーセイ等には低感受性であり、また、耐性菌も出現しつつある。したがって、臨床ではこれらの問題点を克服した新規抗真菌薬が待ち望まれている。

【0005】

一方、近年の真菌症療法の発達や新規抗真菌剤の開発へ向けて、有用性を科学的に評価するための試験方法が確立され、作用メカニズムの研究の進歩と相俟って、より有効で安全な薬剤の開発が望まれている。耐性菌問題の克服という点からも、新規作用メカニズムを有する抗真菌剤の開発も待望されている。

さらには、安全性面の問題から、真菌が細菌（原核細胞）とは異なって、ヒトと同様の真核細胞であるため、特異的（選択的）に真菌細胞に障害を及ぼす化合物を開発する必要がある。

【0006】

こうした状況下、真菌の主要な細胞壁構成成分の合成、いわゆる細胞壁多糖合成系を阻

害する薬剤、すなわち真菌に特異的に存在する細胞壁多糖系の合成酵素を作用標的分子とする抗真菌剤が作用メカニズムの新規性や選択毒性の面から期待されている。真菌細胞壁を構成している多糖としては、 β -グルカン、キチンあるいはキトサン、そしてマンナンが知られており、そのうちの真菌細胞壁の主要な構成成分である β -グルカンは、1, 3- β -グルカンと1, 6- β -グルカンに分けられる。

【0007】

1, 3- β -グルカン合成酵素阻害剤としては、これまでにバブラカンジン類（非特許文献1）、エキノカンジン類（非特許文献2）、ニューモカンジン類（非特許文献3）、アクレアシン類（非特許文献4）等が報告されている。

1, 6- β -グルカン合成酵素阻害剤としては3環系のイミダゾ[1, 2-a]ピリジン誘導体が報告されている（特許文献1）が、より増殖抑制の強い、広い対象病原性真菌スペクトラムをもつ1, 6- β -グルカン合成酵素阻害剤を開発する必要がある。

【0008】

一方、2環系の骨格をもつピリジン誘導体として、イミダゾピリジン、トリアゾロピリジン、ピラゾロピリジンおよびその誘導体が、非常に広範囲にわたる領域で薬理活性をもつことが知られており、イミダゾピリミジンやピラゾロピリミジン誘導体が植物病害を起こす真菌に対する抗真菌作用を示す報告がある（特許文献2、非特許文献5）。

【特許文献1】特願2002-022767号（国際出願番号PCT/JP03/00912号）

【特許文献2】国際公開03/022850号パンフレット

【非特許文献1】ジャーナル オブ アンチバイオティクス、第36巻、1539頁（1983年）

【非特許文献2】ジャーナル オブ メディシナルケミストリー、第38巻、3271頁（1995年）

【非特許文献3】ジャーナル オブ アンチバイオティクス、第45巻、1875頁（1992年）

【非特許文献4】ジャーナル オブ バイオケミストリー、第105巻、606頁（1989年）

【非特許文献5】ジャーナル オブ メディシナルケミストリー、第18巻、1253頁（1975年）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

本発明の目的は、1, 6- β -グルカン合成阻害という作用メカニズムに基づく抗真菌作用を広スペクトルで、かつ特異的または選択的に発現し得るような化合物を提供し、このような化合物、その塩、またはそれらの溶媒和物を含有する抗真菌剤を提供することである。

【課題を解決するための手段】


【0010】

本発明者らは、1, 6- β -グルカン合成酵素の阻害による抗真菌活性を示す化合物を獲得する目的で、化合物の探索を実施し、 $[^{14}\text{C}]$ -グルコースの取り込みを指標とする生体高分子合成阻害試験により1, 6- β -グルカン合成阻害作用を示す化合物を見出した。さらにその化合物と構造的に類似した化合物群が病原性の真菌に抗真菌作用を示すかを検証した。その結果、式（I）で表わされる、塩基性置換基を置換基として有する、イミダゾピリジン、トリアゾロピリジンおよびピラゾロピリジン誘導体、その塩並びにそれらの溶媒和物が、1, 6- β -グルカン合成阻害を作用メカニズムとする、広範囲で強い抗真菌作用を示し、特に深在性真菌症の代表的な起因菌であるカンジダ属、クリプトコッカス属およびアスペルギルス属に対して抗菌作用を示すことを見出し、本発明を完成させた。

【0011】

すなわち本発明は、下式（I）で表される化合物、その塩、またはそれらの溶媒和物；

【化1】



【0012】


〔式中、

R¹は、置換基を有していてもよい塩基性基を意味し、

R²は、水素原子、ハロゲン原子、カルボキシ基（-COOH）、下式

【0013】

【化2】



【0014】

（式中、R²¹およびR²²は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。）で表される基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数2から6のアルケニル基、炭素数2から6のアルキニル基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、炭素数5から6のシクロアルケニル基、炭素数4から12のシクロアルキルアルキル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から12のアラルキル基、炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。）、炭素数3から10のヘテロアリール基、または炭素数3から12のヘテロアリールアルキル基を意味するが、


【0015】

R²が、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アシル基またはアルコキシカルボニル基である場合、これらは、【置換基群2-1】から選ばれる1種以上の基1個以上を置換基として有していてもよい；

【置換基群2-1】：ハロゲン原子、アミノ基、イミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、スルホ基、ジアルキルホスホリル基、下式

【0016】

【化3】



【0017】

（式中、R²¹¹およびR²²¹は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。）で表される基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、および炭素数6から10のアリールチオ基；

【0018】

ここで【置換基群 2-1】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 7 から 12 のアラルキル基、芳香族複素環基、炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよく、

【0019】

【置換基群 2-1】の水酸基、または【置換基群 2-1】のメルカプト基は、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 7 から 12 のアラルキル基、芳香族複素環基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよく、


【0020】

R^2 が、シクロアルキル基であるときは、これらは【置換基群 2-2】から選ばれる 1 種以上の基 1 個以上を置換基として有していてもよい；

【置換基群 2-2】：ハロゲン原子、アミノ基、イミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、スルホ基、下式

【0021】

【化 4】



【0022】

(式中、 R^{212} および R^{222} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。) で表される基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 2 から 7 のアシル基、および炭素数 1 から 7 のアルコキシカルボニル基、

【0023】

【置換基群 2-2】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 7 から 12 のアラルキル基、芳香族複素環基、炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。


【0024】

R^2 が、アリール基、アラルキル基、ヘテロアリール基、またはヘテロアリールアルキル基である場合、これらは【置換基群 2-3】から選ばれる 1 種以上の基 1 個以上を置換基として有していてもよい；

【置換基群 2-3】：ハロゲン原子、アミノ基、イミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、スルホ基、下式

【0025】

【化5】



【0026】

(式中、 R^{213} および R^{223} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を意味する。)で表される基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数7から12のアラルキルオキシ基、炭素数8から15のアラルキルオキシカルボニル基、アリール基、および炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基(窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。)、

【0027】

【置換基群2-3】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のアミノアルキル基、炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、炭素数1から6のメルカプトアルキル基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から12のアラルキル基、芳香族複素環基、炭素数1から6のアルキルスルホニル基、および炭素数6から10のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。


【0028】

R^2 が、複素環基である場合は、次の【置換基群2-4】から選ばれる1個または2個の基を置換基として有してもよい；

【置換基群2-4】：ハロゲン原子、アミノ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、スルホ基、下式

【0029】

【化6】



【0030】

(式中、 R^{214} および R^{224} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。)で表される基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数2から6のアルケニル基、炭素数2から6のアルキニル基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数1から6のハロゲノアルキル基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、および炭素数6から10のアリール基、

【0031】

ここで【置換基群2-4】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のアミノアルキル基、炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、炭素数1から6のメルカプトアルキル基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から12のアラルキル基、炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基(窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。)、芳香族複素環基、炭素数1から6のアルキルスルホニル基、および炭素数6から10のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が2個の場合

は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【0032】


また、 R^1 と R^2 とが一緒になり、これらが結合している炭素原子を含んで、環状構造を形成してもよく、この環内には、窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種または1種以上のヘテロ原子を1個から2個を含み、ここで形成される構造部分は、飽和でも不飽和でもいずれでもよい。

【0033】

R^3 は、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、水酸基、メルカプト基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、カルボキシ基、下式

【0034】

【化7】



【0035】

(式中、 R^{31} および R^{32} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。)で表される基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数2から6のアルケニル基、炭素数2から6のアルキニル基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数2から5のアシル基、炭素数2から5のアルコキシカルボニル基、炭素数3から7のシクロアルキル基、炭素数4から7のシクロアルケニル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から12のアラルキル基、炭素数3から10のヘテロアリール基を意味するが、該アミノ基、該水酸基、または該メルカプト基は、保護基によって保護されていてもよい。

【0036】

R^3 が、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニル基、アリール基、アラルキル基、またはヘテロアリール基である場合、これらは【置換基群3-1】から選ばれる1種以上の基を1個以上置換基として有していてもよい；

【置換基群3-1】：アミノ基、水酸基、メルカプト基、ハロゲン原子、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数2から5のアシル基、および炭素数2から5のアルコキシカルボニル基；

【0037】

【置換基群3-1】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のシクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、芳香族複素環基、炭素数2から5のアシル基、および炭素数2から5のアルコキシカルボニル基からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有してもよく、該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【0038】

また、 R^2 と R^3 とが一緒になってポリメチレン鎖構造を形成し、 R^2 と R^3 が結合する炭素原子を含んで、5員環または6員環の環状構造を形成してもよい。さらにこのポリメチレン鎖は、窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1または2個含んでいてもよい。

【0039】

ここで形成されたポリメチレン鎖は、【置換基群3-2】から選ばれる1種以上の基を1個以上置換基として有していてもよい。

【置換基群3-2】：アミノ基、水酸基、メルカプト基、ハロゲン原子、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数2から5のアシル基、および炭素数2から5のアルコキシカルボニル基；

【0040】


【置換基群 3-2】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、芳香族複素環基、炭素数 2 から 5 のアシル基、および炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【0041】

R^4 は、水素原子、炭素数 1 から 4 のアルキル基、炭素数 3 から 8 の環状アルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 5 から 9 のヘテロアリール基、炭素数 2 から 6 のアルキニル基、または下式

【0042】

【化 8】



【0043】

(式中、 R^{41} および R^{42} は、各々独立に、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、であるか、または、両者が一体化して、エクソメチレン構造となってもよく、このエクソメチレン構造は、さらに炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、または炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、を置換基として有していてもよい。 R^{43} は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、メルカプト基、ニトリル基、ニトロ基、カルボキシ基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 2 から 7 のアルキルアミノカルボニル基、炭素数 7 から 11 のアリールアミノカルボニル基、炭素数 2 から 7 のシクロアルキルアミノカルボニル基、炭素数 8 から 12 のアラルキルアミノカルボニル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 3 から 8 のシクロアルキル基、炭素数 3 から 8 のシクロアルキルオキシ基、炭素数 7 から 11 のアラルキル基、または炭素数 7 から 11 のアラルキルオキシ基である。)を意味するが、


【0044】

R^4 が、アルキル基、環状アルキル基、アリール基、またはヘテロアリール基である場合、そして R^{43} がアルキル基である場合、これらは【置換基群 4】から選ばれる 1 種以上の基を 1 個以上置換基として有していてもよい。

【置換基群 4】：ハロゲン原子、アミノ基、イミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、スルホ基、下式

【0045】

【化 9】



【0046】

(式中、 R^{411} および R^{421} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を意味する。)で表される基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 7 から 12 のアラルキルオキシ基、炭素数 8 から 15 のアラルキルオキシカルボニル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、および炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基(窒素原子、酸素原子、および

硫黄原子からなる群から選ばれる１種以上のヘテロ原子を１個から４個含む。）；

【００４７】

【置換基群４】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数１から６のアルキル基、炭素数１から６のアミノアルキル基、炭素数１から６のヒドロキシアルキル基、炭素数１から６のメルカプトアルキル基、炭素数２から７のアシル基、炭素数２から７のアルコキシカルボニル基、炭素数３から６のシクロアルキル基、炭素数６から１０のアリール基、炭素数７から１２のアラルキル基、芳香族複素環基、炭素数１から６のアルキルスルホニル基、および炭素数６から１０のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる１個または２個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が２個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【００４８】

【置換基群４】の水酸基、または【置換基群４】のメルカプト基は、炭素数１から６のアルキル基、炭素数１から６のアミノアルキル基、炭素数１から６のヒドロキシアルキル基、炭素数１から６のメルカプトアルキル基、炭素数２から７のアシル基、炭素数３から６のシクロアルキル基、炭素数６から１０のアリール基、炭素数７から１２のアラルキル基、芳香族複素環基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよく、 R^4 が、アルキニル基の場合は、炭素数１から６のアルキル基、炭素数２から１２のアルコキシアルキル基、炭素数１から６のハロゲノアルキル基、またはカルボキシ基、を置換基として有していてもよい。

【００４９】

X^1 および X^2 は、各々独立に、窒素原子であるかまたは、ハロゲン原子、炭素数１から６のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数１から６のアルキル基、もしくはエステル基で置換されていてもよい炭素原子を意味するが、 X^1 および X^2 のいずれか一方は必ず窒素原子である。

【００５０】

ここで、アルキル基の置換基は、次の置換基の群から選ばれる、１または１以上の基である。

ハロゲン原子、アミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、炭素数１から６のアルコキシ基、炭素数１から６のアルキルチオ基、炭素数２から７のアシル基、炭素数２から７のアルコキシカルボニル基、炭素数３からの６シクロアルキル基、および炭素数６から１０のアリール基；

【００５１】

炭素原子上の置換基がエステルであるときこれらは、炭素数１から６のアルキルエステル、炭素数６から１０のアリールエステル、または炭素数１から６のアルキル基と炭素数６から１０のアリール基とから構成されるアラルキルエステルでよく；

【００５２】

さらにこれらのアリールエステルおよびアラルキル基のアリール部分は、次の置換基の群から選ばれる、１または１以上の基によって置換されていてもよい；

ハロゲン原子、アミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、炭素数１から６のアルキル基、炭素数１から６のアルコキシ基、炭素数１から６のアルキルチオ基、炭素数２から７のアシル基、炭素数２から７のアルコキシカルボニル基、炭素数３からの６シクロアルキル基、および炭素数６から１０のアリール基；
を意味する。】である。

【発明を実施するための最良の形態】

【００５３】

本明細書において用いられる用語の定義は以下の通りである。

「アルキル基」またはアルキル部分を含む置換基（例えばアルコキシ基等）におけるアルキル部分は、直鎖状または分枝鎖状のいずれでもよい。具体的には、アルキル基として、メチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、ノルマルブチル基、ノルマルペンチル基、ノルマルヘキシル基、ノルマルヘプチル基、ノルマルオクチル基、ノルマルノニル基、ノ

ルマルウンデシル基、ノルマルドデシル基、ノルマルトリデシル基、ノルマルテトラデシル基、ノルマルペンタデシル基、ノルマルヘキサデシル基、ノルマルヘプタデシル基、ノルマルオクタデシル基、イソプロピル基、イソブチル基、第二級ブチル基、第三級ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、第三級ペンチル基、イソヘキシル基、1，1－ジメチルプロピル基、n－ヘプチル基、n－オクチル基等を挙げることができる。

【0054】

「シクロアルキル基」は、単環式または二環式の環状アルキル基を意味し、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ビシクロ〔3・2・1〕オクトー2－イル基等を挙げることができる。

【0055】

「アルケニル基」は、直鎖状または分枝鎖状のいずれでもよく、炭素炭素二重結合を1個または2個以上有する。具体的には、ビニル基、プロペニル基、ブテンー1－イル基、イソブテニル基、ペンテンー1－イル基、2－メチルブテンー1－イル基、3－メチルブテンー1－イル基、ヘキセンー1－イル基、ヘプテンー1－イル基、オクテンー1－イル基等を挙げることができる。

【0056】

「シクロアルケニル基」は、単環式または二環式の環状アルケニル基を意味し、例えば、2－シクロペンテンー1－イル基、2，4－シクロペンタジエンー1－イル基、5－ノルボルネンー2－イル基等を挙げることができる。

【0057】

「アルキニル基」は、直鎖状または分枝鎖状のいずれでもよく、炭素炭素三重結合を1個または2個以上有する。具体的には、エチニル基、プロピニル基等を挙げることができる。

【0058】

「ハロゲン原子」とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、またはヨウ素原子を意味する。

【0059】

「アリール基」とは、芳香族炭化水素の芳香環から水素原子1個を除いた1価基のことを意味する。アリール基を構成する芳香環は単環または縮合環のいずれでもよい。例えば、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、アズレニル基等を挙げることができる。

【0060】


「アラルキル基」とは、アルキル基の水素原子が1個または2個以上前記のアリール基で置換されている基を意味する。例えば、ベンジル基、ベンズヒドリル基、トリチル基等を挙げることができる。

【0061】

「複素環基」とは、飽和、部分飽和、または不飽和の複素環化合物から導かれる基を意味し、単環式、二環式、またはスピロ環式のいずれでもよい。複素環基を与える複素環化合物としては、例えば、アジリジン、アゼチジン、ピロール、フラン、チオフェン、ピロリジン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロチオフェン、イミダゾール、ピラゾール、イミダゾリジン、ピラゾリジン、オキサゾール、イソオキサゾール、チアゾール、イソチアゾール、ピリジン、ジヒドロピリジン、テトラヒドロピラン、ピペリジン、ピリダジン、ピリミジン、トリアジン、ピラジン、ピペラジン、ピロリドン、ジオキサン、ピラン、モルホリン、ベンゾフラン、インドリジン、ベンゾチオフェン、インドール、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、クロマン等を挙げることができ、さらに、下式で表されるものを例示することができる。

【0062】

【化 1 0】




【0 0 6 3】

(式中、 R^{51} は、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のハロゲノアルキル基、または炭素数3から6のシクロアルキル基を意味し、置換基Qは、次式、

【0 0 6 4】

【化 1 1】



【0 0 6 5】

で表わされる置換基を意味し、 b は、0、1、または2の整数を意味し、 n は0または1の整数を意味し、 R^{61} および R^{62} は、各々独立に、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数1から6のハロゲノアルキル基であるか、アミノ酸、ジペプチド、もしくは個から5個のアミノ酸からなるポリペプチドを意味し、 R^{71} および R^{72} は、各々独立に、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のハロゲノアルキル基、炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、炭素数1から6のアミノアルキル基、炭素数2から12のアルコキシアルキル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、または置換基を有していてもよい炭素数3から10のヘテロアリアル基を意味する。)

【0066】

R⁵¹としては、水素原子、またはアルキル基が好ましく、アルキル基としては、メチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、またはイソプロピル基が好ましい。

【0067】

R⁶¹およびR⁶²としては、水素原子、またはアルキル基が好ましく、アルキル基としては、メチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、またはイソプロピル基が好ましい。

【0068】

R⁷¹とR⁷²は、各々独立に、水素原子、アルキル基、ハロゲンアルキル基、アルコキシアルキル基、シクロアルキル基、またはフェニル基が好ましい。これらのうちでも水素原子、メチル基、エチル基、フルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、メトキシメチル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、またはフェニル基がさらに好ましい。

【0069】

また、R⁷¹とR⁷²は、一体化して、炭素数3から6の環構造を形成してもよい。さらに、この環には環を構成する原子として窒素原子を含んでいてもよい。好ましい環構造として、シクロプロピル、シクロブチル、またはシクロペンチルを挙げることができる。

【0070】

「ヘテロアリアル基」とは、上記の複素環基の中で、芳香性（あるいは芳香族性）を有するものを特に意味し、「アロマティックヘテロサイクル」と称されるものを意味する。例えば、5員環や6員環で単環性のものや、双環性でベンゾ縮合環系あるいは複素環-複素環縮合環系で、5-6縮合環系、6-6縮合環系のもの等を挙げることができる。例えば、ピロリル基、フリル基、チエニル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、イソオキサゾリル基、チアゾリル基、イソチアゾリル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、トリアジニル基、ピラジニル基、ベンゾフリル基、インドリル基、ナフチリジニル基、キノキサリニル基、キナゾリニル基等を挙げることができる。

さらに、本願明細書において「芳香族複素環基」とは、上記のヘテロアリアル基のうちで、単環性の5員環または6員環で、窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個を含むものを特に意味する。例えば、ピロリル基、フリル基、チエニル基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、オキサゾリル基、イソオキサゾリル基、チアゾリル基、イソチアゾリル基、ピリジル基、ピリダジニル基、ピリミジニル基、トリアジニル基、ピラジニル基等を挙げることができる。

【0071】

本明細書中に、アミノ基、水酸基、またはメルカプト基等について、「保護基によって保護されていてもよい」とある場合の「保護基」はこの分野で汎用されるものであれば特に限定されないが、例えば、第三級ブトキシカルボニル基、2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基類；ベンジルオキシカルボニル基、パラメトキシベンジルオキシカルボニル基、パラニトロベンジルオキシカルボニル基等のアラルキルオキシカルボニル基類；アセチル基、メトキシアセチル基、トリフルオロアセチル基、クロロアセチル基、ピバロイル基、ホルミル基、ベンゾイル基等のアシル基類；第三級ブチル基、ベンジル基、パラニトロベンジル基、パラメトキシベンジル基、トリフェニルメチル基等のアルキル基類、またはアラルキル基類；メトキシメチル基、第三級ブトキシメチル基、テトヒドロピラニル基、2, 2, 2-トリクロロエトキシメチル基等のエーテル類；トリメチルシリル基、イソプロピルジメチルシリル基、第三級ブチルジメチルシリル基、トリベンジルシリル基、第三級ブチルジフェニルシリル基等の（アルキルおよび／またはアラルキル）置換シリル基を挙げることができる。また、アミノ基がフタルイミドとなって保護されていてもよい。

「アミノ酸、ジペプチド、もしくは3個から5個のアミノ酸からなるポリペプチドから導かれる基」、あるいは「アミノ基に結合するアミノ酸、ジペプチド、または3個から5個のアミノ酸からなるポリペプチド」とは、例えば、アミノ酸類、ジペプチド類、およびトリペプチド類、あるいはこれらから導かれる置換カルボニル基である。すなわち、グリ

シン、アラニン、アスパラギン酸等のアミノ酸類、グリシンーグリシン、グリシンーアラニン、アラニンーアラニン等のジペプチド類、そしてグリシンーグリシンーアラニン、グリシンーアラニンーアラニン等のトリペプチド類、あるいはこれらから導かれる置換カルボニル基を挙げることができる。


【 0 0 7 2 】

本発明の式 I で表される化合物の部分構造および置換基について述べる。

下式 (I)、

【 0 0 7 3 】

【 化 1 2 】



【 0 0 7 4 】

で表される化合物において、R¹は置換基を有していてもよい塩基性基を意味し、好ましくは、置換基を有していてもよいアミノ基、置換基を有していてもよい含窒素複素環基、置換基を有していてもよい炭素数1から8のアミノアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1から8のアミノシクロアルキル基、または置換基を有していてもよい炭素数6から10のアミノアリール基である。


【 0 0 7 5 】

R¹が置換基を有していてもよいアミノ基であるときの置換基は、好ましくは、置換基群【1-1】から選ばれる、1または2（2のときは同一でも異なってもよい）の置換基であり；

置換基群【1-1】：ホルミル基、下式

【 0 0 7 6 】

【 化 1 3 】



【 0 0 7 7 】

（式中、R¹¹およびR¹²は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。）で表される基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数2から6のアルケニル基、炭素数2から6のアルキニル基、炭素数2から6のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3から10のシクロアルキル基、炭素数4から10のシクロアルケニル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。）、およびアミノ酸、ジペプチド、もしくは3個から5個のアミノ酸からなるポリペプチドから導かれる基；

【 0 0 7 8 】

ここで、置換基を有していてもよいアミノ基の置換基が、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アシル基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニル基、またはアリール基、である場合、これらは【置換基群1-1-1】から選ばれる1種以上の基を1個以上置換基として有していてもよい；

【 0 0 7 9 】

【置換基群 1-1-1】：アミノ基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基（これらのアミノ基または炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基のアミノ基部分は、保護基によって保護されているかまたは、炭素数 1 から 6 のアルキル基を 1 個または 2 個有していてもよいが、アルキル基を 2 個有する場合は同一でも異なってもよい。）、水酸基、メルカプト基、ハロゲン原子、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）、炭素数 2 から 7 のアルキルカルボニルアミノ基、および炭素数 3 から 10 のシクロアルキル基；


【0080】

R¹が、置換基を有していてもよい含窒素複素環基であるときの含窒素複素環基は、好ましくは、窒素原子を結合部位とし、飽和、部分飽和、もしくは不飽和であって炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）であり、さらにこの複素環基上の置換基が【置換基群 1-2】から選択されて有されていてもよく；

【置換基群 1-2】：ハロゲン原子、アミノ基、水酸基、オキソ基、下式

【0081】

【化 14】



【0082】

（式中、R¹¹¹およびR¹²¹は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。）で表される基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 8 のアルキルアミノ基、炭素数 3 から 8 のシクロアルキルアミノ基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 1 から 6 のハロゲンアルキル基、および炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基；

【0083】

ここで、【置換基群 1-2】のアルキル基、アルキルアミノ基、シクロアルキルアミノ基、アルコキシ基、アルキルチオ基、ハロゲンアルキル基、またはアミノアルキル基のアルキル部分は、【置換基群 1-2-1】から選ばれる 1 種以上の基 1 個以上を置換基として有してもよく；

【0084】

【置換基群 1-2-1】：ハロゲン原子、水酸基、カルボキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 2 から 7 のアルキルカルボニルアミノ基、炭素数 6 から 10 のアリール基、および炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）、

【0085】

ここで、【置換基群 1-2】のアミノ基、アミノアルキル基、およびアルキルアミノ基のアミノ基部分は、保護基によって保護されていてもよく、また、炭素数 1 から 6 のアルキル基（水酸基、ハロゲン原子、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、およびアルキルチオ基からなる群から選ばれる 1 種以上の基を 1 個以上置換基として有していてもよい。）を置換基として 1 個または 2 個有していてもよく、また、アミノ酸、ジペプチド、または 3 個か

ら5個のアミノ酸からなるポリペプチドが結合していてもよい；

【0086】


さらに、 R^1 の置換基を有していてもよい炭素数1から8のアミノアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数1から8のアミノシクロアルキル基、または置換基を有していてもよい炭素数6から10のアミノアリール基は、好ましくはその各々のアミノ基部分は、保護基によって保護されているか、または炭素数1から6のアルキル基（水酸基、ハロゲン原子、炭素数1から6のアルコキシ基、およびアルキルチオ基からなる群から選ばれる1種以上の基1個以上を置換基として有していてもよい。）を置換基として1個または2個有しているか、あるいは、アミノ酸、ジペプチド、または3個から5個のアミノ酸からなるポリペプチドが結合していてもよいアミノ基であり、さらにアミノ基以外の部分が、【置換基群1-3】から選ばれる1種または1種以上の、1または1以上の基を置換基として有していてもよい。

【0087】

【置換基群1-3】：ハロゲン原子、アミノ基、水酸基、メルカプト基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、下式

【0088】

【化15】



【0089】

（式中、 R^{13} および R^{14} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。）で表される基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から8のアルキルアミノ基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数2から7のアシル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、炭素数3から8のシクロアルキルアミノ基、炭素数4から12のシクロアルキルアルキル基、炭素数3から6のシクロアルキルオキシ基、炭素数6から10のアリール基、炭素数6から10のアリールアミノ基、炭素数7から12のアラルキル基、および炭素数6から10のアリールオキシ基；

【0090】

ここで、【置換基群1-3】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のアミノアルキル基、炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、炭素数1から6のメルカプトアルキル基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から12のアラルキル基、芳香族複素環基、炭素数1から6のアルキルスルホニル基、および炭素数6から10のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい；

【0091】


そして、【置換基群1-3】の水酸基またはメルカプト基は、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のアミノアルキル基、炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、炭素数1から6のメルカプトアルキル基、炭素数2から7のアシル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から12のアラルキル基、および芳香族複素環基からなる群から選ばれる基を置換基として有していてもよい。

【0092】

また R^1 は、置換基を有していてもよい含窒素複素環基、中でも飽和の含窒素複素環基であることも本発明の好ましい態様である。具体的には、 R^1 は、下式で表される基であることが特に好ましい。

【0093】

【化 1 6】




【0 0 9 4】

【式中、X a は、酸素原子、硫黄原子、置換基または N R ⁵² を意味する。R ⁵¹ および R ⁵² は、各々独立に、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、または炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基を意味し、置換基 Q は、次式、

【0 0 9 5】

【化 1 7】



【0 0 9 6】


で表わされる置換基を意味し、b は、0、1、または 2 の整数を意味し、n は 0 または 1 の整数を意味し、R ⁶¹ および R ⁶² は、各々独立に、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基であるか、アミノ酸、ジペプチド、もしくは個から 5 個のアミノ酸からなるポリペプチドを意味し、R ⁷¹ および R ⁷² は、各々独立に、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、炭素数 2 から 1 2 のアルコキシアルキル基、炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、置換基を有してもよいフェニル基、または置換基を有していてもよい炭素数 3 から 1 0 のヘテロアリール基を意味する。

【0 0 9 7】

R ² は水素原子、ハロゲン原子、カルボキシ基、下式

【0 0 9 8】

【化 1 8】



【0 0 9 9】

（式中、R ²¹ および R ²² は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 1 0 のアリール基を表す。）で表される基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 2 から 6 のアルケニル基、炭素数 2 から 6 のアルキニル基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 5 から 6 のシクロアルケニル基、炭素数 4 から 1 2 のシクロアルキルアルキル基、炭素数 6 から 1 0 のアリール基、炭素数 7 から 1 2 のアラルキル基、炭素数 2 から 1 0 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）、炭素数 3 から 1 0 のヘテロアリール基、または炭素数 3 から 1 2 のヘテロアリールアルキル基を意味するが、

【0 1 0 0】


R ² がアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アシル基、またはアルコキシカルボニル基である場合、これらは、【置換基群 2-1】から選ばれる 1 種以上の基 1 個以上を置換基として有していてもよい。

【置換基群 2-1】：ハロゲン原子、アミノ基、イミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプ

ト基、カルボキシ基、シアノ基、スルホ基、ジアルキルホスホリル基、下式

【0101】

【化19】



【0102】

(式中、 R^{211} および R^{221} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。)で表される基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3からの6シクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、および炭素数6から10のアリールチオ基；

【0103】

ここで【置換基群2-1】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のアミノアルキル基、炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、炭素数1から6のメルカプトアルキル基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から12のアラルキル基、芳香族複素環基、炭素数1から6のアルキルスルホニル基、および炭素数6から10のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよく；

【0104】

【置換基群2-1】の水酸基、または【置換基群2-1】のメルカプト基は、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のアミノアルキル基、炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、炭素数1から6のメルカプトアルキル基、炭素数2から7のアシル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から12のアラルキル基、芳香族複素環基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよく；


【0105】

R^2 が、シクロアルキル基であるときは、これらは【置換基群2-2】から選ばれる1種以上の基1個以上を置換基として有していてもよい。

【置換基群2-2】：ハロゲン原子、アミノ基、イミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、スルホ基、下式

【0106】

【化20】



【0107】

(式中、 R^{212} および R^{222} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。)で表される基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数2から7のアシル基、および炭素数1から7のアルコキシカルボニル基；

【0108】

【置換基群2-2】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のアミノアルキル基、炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、炭素数1から6のメルカプトアルキル基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3から6のシクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から12のアラルキル基、芳香族複素環基、炭素数1から6のアルキルスルホニル基、お

よび炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。


【0109】

R^2 がアリール基、アラルキル基、ヘテロアリール基、またはヘテロアリールアルキル基である場合、これらは【置換基群 2-3】から選ばれる 1 種以上の基 1 個以上を置換基として有していてもよい。

【置換基群 2-3】：ハロゲン原子、アミノ基、イミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、スルホ基、下式

【0110】

【化 2 1】



【0111】

（式中、 R^{213} および R^{223} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を意味する。）で表される基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 7 から 12 のアラルキルオキシ基、炭素数 8 から 15 のアラルキルオキシカルボニル基、アリール基、および炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）；

【0112】

【置換基群 2-3】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 7 から 12 のアラルキル基、芳香族複素環基、炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。


【0113】

R^2 が複素環基である場合は、次の【置換基群 2-4】から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよい。

【置換基群 2-4】：ハロゲン原子、アミノ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、スルホ基、下式

【0114】

【化 2 2】



【0115】

（式中、 R^{214} および R^{224} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。）で表される基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 2 から 6 のアルケニル基、炭素数 2 から 6 のアルキニル基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、および炭素数 6 から 10 のアリール基；

【0116】


ここで、【置換基群 2-4】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 7 から 12 のアラルキル基、炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）、芳香族複素環基、炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【0117】

これらのうち好ましい R^2 は、置換基を有していてもよい炭素数 6 から 10 のアリール基または炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）であり、さらに好ましくは、 R^2 は、下式化 23 または化 24 で表される基である。


【0118】

【化 23】



【0119】

【化 24】



【0120】


（式中、 X^b は、酸素原子、硫黄原子、置換基または NR^8 を意味するが、ここで R^8 は、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 1 から 6 のハロゲンアルキル基を意味する。置換基 Y^1 は、【置換基群 2-3】に前述したと同じものを意味する。）

【0121】

さらに R^1 と R^2 とが一緒になり、これらが結合している炭素原子を含んで、環状構造を形成してもよく、この環内には、窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種または 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 2 個を含み、ここで形成される構造部分は、飽和でも不飽和でもいずれでもよい。 R^1 と R^2 とから形成される複素環構造の具体例としては、例えば、下式に表されるものを挙げることができる。

【0122】

【化25】



【0123】


(式中、 R^{16} は、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、炭素数2から6のアルケニル基、炭素数2から6のアルキニル基、炭素数1から6のハロゲノアルキル基、または炭素数3から6のシクロアルキル基を意味し、 R^{17} は、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアミノ基、水酸基、チオール基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数2から6のアルケニル基、炭素数2から6のアルキニル基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数1から6のハロゲノアルキル基、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数3から6のビスシクロアルキル基、またはハロゲン原子を有していてもよい炭素数3から6のスピロシクロアルキル基を意味し、 k は、0、1、または2の整数を意味する。)

【0124】

R^3 は、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、水酸基、メルカプト基、ニトロ基、シアノ基、ホルミル基、カルボキシ基、下式

【0125】

【化26】



【0126】

(式中、 R^{31} および R^{32} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。)で表される基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数2から6のアルケニル基、炭素数2から6のアルキニル基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数2から5のアシル基、炭素数2から5のアルコキシカルボニル基、炭素数3から7のシクロアルキル基、炭素数4から7のシクロアルケニル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から12のアラルキル基、炭素数3から10のヘテロアリール基を意味するが、該アミノ基、該水酸基、または該メルカプト基は、保護基によって保護されていてもよい。

【0127】

R^3 が、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、

アシル基、アルコキシカルボニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニル基、アリール基、アラルキル基、またはヘテロアリール基である場合、これらは【置換基群 3-1】から選ばれる 1 種以上の基を 1 個以上置換基として有していてもよい；

【置換基群 3-1】：アミノ基、水酸基、メルカプト基、ハロゲン原子、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 2 から 5 のアシル基、および炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基；

【0128】


【置換基群 3-1】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、芳香族複素環基、炭素数 2 から 5 のアシル基、および炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【0129】

これらのうち好ましい R^3 は、ハロゲン原子、アミノ基、水酸基、メルカプト基、置換基を有していてもよい炭素数 1 から 4 のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 2 から 5 のアシル基、または炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基であり、アミノ基は、ホルミル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 3 から 10 のヘテロアリール基、炭素数 2 から 5 のアシル基、および炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。具体的には R^3 は、下式化 27 で表される基である。

【0130】

【化 27】



【0131】

(式中、Me は、メチル基を意味し、halogen はハロゲン原子を意味し、 R^9 は、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 3 から 7 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 7 から 12 のアラルキル基、芳香族複素環基を意味する。また置換基 Y^2 は、アミノ基、水酸基、メルカプト基、ハロゲン原子、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 2 から 5 のアシル基、または炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基を意味し、このうちのアミノ基は、ホルミル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、芳香族複素環基、炭素数 2 から 5 のアシル基、および炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。)

【0132】

また、 R^2 と R^3 とが一緒になってポリメチレン鎖構造を形成し、 R^2 と R^3 が結合する炭素原子を含んで、5 員環または 6 員環の環状構造を形成してもよい。さらにこのポリメチレン鎖は、窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 または 2 個含んでいてもよい。

ここで形成されたポリメチレン鎖は、【置換基群 3-2】から選ばれる 1 種以上の基を 1 個以上置換基として有していてもよい。

【置換基群 3-2】：アミノ基、水酸基、メルカプト基、ハロゲン原子、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 2 から 5 のアシル基、および

炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基；

【0133】


【置換基群 3-2】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、芳香族複素環基、炭素数 2 から 5 のアシル基、および炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【0134】

R^4 は、水素原子、炭素数 1 から 4 のアルキル基、炭素数 3 から 8 の環状アルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 5 から 9 のヘテロアリール基、炭素数 2 から 6 のアルキニル基、または下式

【0135】

【化 28】



【0136】

(式中、 R^{41} および R^{42} は、各々独立に、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、であるか、または、両者が一体化して、エクソメチレン構造となってもよく、このエクソメチレン構造は、さらに炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、または炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、を置換基として有していてもよい。

【0137】

R^{43} は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、メルカプト基、ニトリル基、ニトロ基、カルボキシ基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 2 から 7 のアルキルアミノカルボニル基、炭素数 7 から 11 のアリールアミノカルボニル基、炭素数 2 から 7 のシクロアルキルアミノカルボニル基、炭素数 8 から 12 のアラルキルアミノカルボニル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、炭素数 3 から 8 のシクロアルキル基、炭素数 3 から 8 のシクロアルキルオキシ基、炭素数 7 から 11 のアラルキル基、または炭素数 7 から 11 のアラルキルオキシ基を意味する。)で表される基であるが、


【0138】

R^4 が、アルキル基、環状アルキル基、アリール基、またはヘテロアリール基である場合、そして R^{43} がアルキル基である場合、これらは【置換基群 4】から選ばれる 1 種以上の基を 1 個以上置換基として有していてもよい。

【置換基群 4】：ハロゲン原子、アミノ基、イミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、スルホ基、下式

【0139】

【化 29】



【0140】

(式中、 R^{411} および R^{421} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を意味する。)で表される基、炭素数 1 から 6 のア

ルコキシ基、炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 7 から 12 のアラルキルオキシ基、炭素数 8 から 15 のアラルキルオキシカルボニル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、および炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）。

【0141】

【置換基群 4】のアミノ基は、ホルミル基、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 7 から 12 のアラルキル基、芳香族複素環基、炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【0142】


【置換基群 4】の水酸基、または【置換基群 4】のメルカプト基は、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、炭素数 2 から 7 のアシル基、炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、炭素数 6 から 10 のアリール基、炭素数 7 から 12 のアラルキル基、芳香族複素環基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよく、 R^4 が、アルキニル基の場合は、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 2 から 12 のアルコキシアルキル基、炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、またはカルボキシ基、を置換基として有していてもよい。

【0143】

これらのうち好ましい R^4 は、置換基を有していてもよい炭素数 1 から 4 のアルキル基または下式

【0144】

【化30】



【0145】


(R^{41} 、 R^{42} 、および R^{43} は既に定義したとおりである。) で表される構造の置換基である。

【0146】

以上述べた置換基 R^1 、 R^2 、 R^3 、および R^4 の説明におけるアリール基、ヘテロアリール基、または複素環基は、特に明記されていない場合でも、ハロゲン原子、アミノ基、水酸基、メルカプト基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ基、スルホ基、下式

【0147】

【化31】



【0148】

(式中、 R^{51} および R^{52} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。) で表される基、炭素数 1 から 10 のアルキ

ル基、炭素数2から10のアルケニル基、炭素数2から10のアルキニル基、炭素数1から10のアルコキシ基、炭素数1から10のアルキルチオ基、炭素数1から10のハロゲノアルキル基、炭素数2から10のアシル基、炭素数2から10のアルコキシカルボニル基、炭素数6から10のアリール基、および芳香族複素環基からなる群から選ばれる1種以上の基を1個以上置換基として有してもよいが、

【0149】


該アルキル基、該アルコキシ基、該アルキルチオ基、該アシル基、該アルコキシカルボニル基、該アリール基、または該芳香族複素環基は、ハロゲン原子、水酸基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基からなる群から選ばれる1種以上の基を1個以上置換基として有してもよく、

【0150】

該アミノ基は、ホルミル基、炭素数1から10のアルキル基、炭素数1から8のアミノアルキル基、炭素数1から8のヒドロキシアルキル基、炭素数1から8のメルカプトアルキル基、炭素数2から8のアシル基、炭素数2から8のアルコキシカルボニル基、炭素数3から10のシクロアルキル基、炭素数6から10のアリール基、炭素数7から16のアラルキル基、炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。）、芳香族複素環基、炭素数1から10のアルキルスルホニル基、および炭素数6から10のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。このような環状構造としては、下式に表されるものを例示することができる。

【0151】

【化32】



【0152】


(式中、 R^{71} は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、チオール基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数2から6のアルケニル基、炭素数2から6のアルキニル基、炭素数1から6のアルコキシル基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数1から6のハロゲノアルキル基、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数3から6のビスシクロアルキル基、またはハロゲン原子を有していてもよい炭素数3から6のスピロシクロアルキル基を意味し、 R^{81} は、炭素数1から6のアルキル基または炭素数1から6のハロゲノアルキル基を意味する。)

【0153】

上記の置換基 R^1 、 R^2 、 R^3 、および R^4 の説明におけるアミノ基は、特に明記されていない場合でも、ホルミル基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数2から18のアシル基、炭素数2から18のアルコキシカルボニル基、炭素数1から18のアルキルスルホニル基、および炭素数6から10のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。このような環状構造としては、下式に表されるものを例示することができる。

【0154】

【化33】



【0155】

(式中、 R^{72} は、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、チオール基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数2から6のアルケニル基、炭素数2から6のアルキニル基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数1から6のハロゲノアルキル基、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数3から6のビシクロアルキル基、またはハロゲン原子を有していてもよい炭素数3から6のスピロシクロアルキル基を意味し、 R^{82} は、炭素数1から6のアルキル基または炭素数1から6のハロゲノアルキル基を意味する。)

【0156】

X^1 および X^2 は、各々独立に、窒素原子であるかまたは、ハロゲン原子、炭素数1から6のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1から6のアルキル基、もしくはエステル基で置換されていてもよい炭素原子を意味するが、 X^1 および X^2 のいずれか一方は必ず窒素原子である。

【0157】

ここで、アルキル基の置換基は、次の置換基の群から選ばれる、1または1以上の基である。

ハロゲン原子、アミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3からの6シクロアルキル基、および炭素数6から10のアリール基；

【0158】

炭素原子上の置換基がエステルであるときこれらは、炭素数1から6のアルキルエステル、炭素数6から10のアリールエステル、または炭素数1から6のアルキル基と炭素数6から10のアリール基とから構成されるアラルキルエステルでよく；

【0159】

さらにこれらのアリールエステルおよびアラルキル基のアリール部分は、次の置換基の群から選ばれる、1または1以上の基によって置換されていてもよい；

ハロゲン原子、アミノ基、ニトロ基、水酸基、メルカプト基、カルボキシ基、シアノ基、炭素数1から6のアルキル基、炭素数1から6のアルコキシ基、炭素数1から6のアルキルチオ基、炭素数2から7のアシル基、炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、炭素数3からの6シクロアルキル基、および炭素数6から10のアリール基。

【0160】

前記本発明の式Iで表わされる化合物が、鏡像異性体（エナンチオマー）の存在する構造であるとき、その各エナンチオマー、その1：1比の混合物であるラセミ体、および各エナンチオマーが適宜の混合比で存在し、光学純度が100%未満であるエナンチオマー混合物のいずれもが、本発明化合物に包含される。さらに、式Iで表わされる化合物がジアステレオマーの存在する構造であるとき、本発明化合物には、単一のジアステレオマーおよびジアステレオマーの混合物が包含される。

【0161】

式Iで表わされる化合物がエナンチオマーの存在する構造であるとき、本発明化合物をヒトや動物に投与する際は単一のエナンチオマーからなるものを投与することが望ましい。この「単一のエナンチオマーからなる」とは、もう一方の鏡像異性体（エナンチオマー）を全く含有しない場合だけでなく、化学的に純粋であると通常言える程度の場合を含むと解される。つまり、物理定数や、生理活性に対して影響がない程度であれば、もう一方の鏡像異性体（エナンチオマー）が含まれていてもよいと解される。

【0162】

さらに、式Iで表わされる化合物がジアステレオマーの存在する構造であるとき、本発明化合物をヒトや動物に投与する際は単一のジアステレオマーからなるものを投与することが望ましい。この「単一のジアステレオマーからなる」とは、他のジアステレオマーを全く含有しない場合だけでなく、化学的に純粋であると通常言える程度の場合を含むと解される。つまり、物理定数や、生理活性に対して影響がない程度であれば、他のジアステレオマーが含まれていてもよいと解される。

【0163】

また、「立体化学的に単一な」とは、化合物等において不斉炭素原子が含まれるために、異性体関係となる場合にそれらのうちの1種のみにて構成されたものであることを意味する。この場合においてもこの「単一な」の解釈に関しても上記と同様に考える。

【0164】

式Iで表わされる化合物が、任意の置換基部分に、フェニール性水酸基、カルボキシ基（カルボン酸誘導体）、またはスルホ基（スルホン酸誘導体）を有する酸誘導体である場合、それらの酸誘導体は遊離体のままでよいが、フェニール性水酸基、カルボキシ基、またはスルホ基の塩としてもよい。

【0165】

これらの塩のとしては、例えば、リチウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩、マグネシウム塩、カルシウム塩等のアルカリ土類金属塩、アンモニウム塩、またはトリエチルアミン塩やN-メチルグルカミン塩、トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタン塩等で無機塩類、有機塩類のいずれでもよい。また、これらの酸誘導体の遊離体や塩は水和物として存在することもある。

【0166】

一方、式Iで表わされる化合物が、任意の置換基部分に、アミノ基、アミン構造を有する塩基性誘導体である場合、それらの塩基性誘導体は遊離体のままでよいが、酸付加塩としてもよい。

【0167】

酸付加塩とする場合の例としては、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、リン酸塩等の無機酸塩類、あるいはメタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、パラトルエンスルホン酸塩（スルホン酸塩）、酢酸塩、クエン酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、乳酸塩、酒石酸塩（カルボン酸塩）等の有機酸塩を挙げることができる。また、これらの塩基性誘導体の遊離体や塩は水和物として存在することもある。

【0168】

式Iで表わされる化合物が、カルボン酸化合物である場合、カルボン酸部分がエステルとなった誘導体は合成中間体やプロドラッグとして有用である。例えば、アルキルエステル類やベンジルエステル類、アルコキシアルキルエステル類、フェニルアルキルエステル類およびフェニルエステル類は合成中間体として有用である。

【0169】

また、本発明のカルボン酸化合物を抗真菌目的に使用する場合、プロドラッグとして用いられるエステルとしては、生体内で容易に切断されてカルボン酸の遊離体を生成するようなエステルであり、例えば、アセトキシメチルエステル、ピバロイルオキシメチルエステル、エトキシカルボニルエステル、コリンエステル、ジメチルアミノエチルエステル、5-インダニルエステルおよびフタリジニルエステル、5-アルキル-2-オキソ-1,

3-ジオキソール-4-イルメチルエステル、そして3-アセトキシ-2-オキソブチルエステル等のオキソアルキルエステルを挙げることができる。

【0170】

さらに、式Iで表わされる化合物が、アミノ基を有する塩基性化合物であり、アミノ基にアミノ酸、ジペプチド、トリペプチドが結合した誘導体はプロドラッグとして有用である。

【0171】


プロドラッグとして用いられるアミノ酸、ジペプチド、およびトリペプチドとしては、これらのカルボキシ基と本発明化合物である式Iのアミノ基から形成されるペプチド結合が生体内で容易に切断されてアミンの遊離体を生成するようなものであり、例えば、グリシン、アラニン、アスパラギン酸等のアミノ酸類、グリシン-グリシン、グリシン-アラニン、アラニン-アラニン等のジペプチド類、およびグリシン-グリシン-アラニン、グリシン-アラニン-アラニン等のトリペプチド類を挙げることができる。

【0172】

式(I)で表わされる本発明の化合物は種々の方法により製造される。その好ましい例として代表的な製造法を次式に示し説明するが、これらに限定されるものではない。なお、反応に際しては必要に応じて置換基を保護基で保護して実施し、各置換基(官能基)の変換順序は特に限定されない。

【0173】

【化34】



【0174】

(式中、 X^1 および X^2 は、各々独立に、窒素原子であるかまたは、ハロゲン原子、炭素数1から6のアルコキシ基、置換基を有してもよい炭素数1から6のアルキル基、もしくはエステル基で置換されていてもよい炭素原子を意味するが、 X^1 および X^2 のいずれか一方は必ず窒素原子である。)

【0175】

工程1は、化合物(1)であるイミダゾール、トリアゾールもしくはピラゾールのアセトニトリル誘導体と化合物(2)である β -ケトエステル誘導体を作用させ、縮合環化させて化合物(3)を製造する工程である。

【0176】

反応は、溶媒を使用して、または溶媒を使用せず行うことができる。反応に使用する溶媒は、反応を阻害しないものであればよく、例えば、クロロホルム、ジクロロエタン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、クロルベンゼン、ジクロルベンゼン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、1,

4-ジオキサン、ジフェニルエーテル、またはこれらの混合物を挙げることができる。出発物質である化合物（１）と化合物（２）の両方、もしくは一方が液体の場合は、溶媒を使用せずに反応を行うのが好ましい。

【０１７７】

反応は、無機塩基または有機塩基のような酸受容体、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、またはアンモニアとの酢酸塩、炭酸塩、または炭酸水素酸塩等の無機塩基性化合物、あるいはトリエチルアミン、ピリジン、１，８-ジアザビシクロウンデセン、Ｎ-メチルピペリジン、Ｎ，Ｎ-ジイソプロピルエチルアミン等の有機塩基化合物の存在で行うのが好ましい。これらのなかでは、酢酸アンモニウムの使用が特に好ましいが、塩基の使用は、反応性に依じて適宜変換するのが好ましい。

【０１７８】

反応温度は、通常、室温ないし２００℃の温度範囲で実施でき、好ましくは、溶媒使用の場合に２５℃から還流温度、溶媒を使用しない場合は８０℃から１５０℃の範囲である。反応時間は、１５分から４８時間の範囲でよく、通常は３０分から６時間程度で完結する。

【０１７９】

工程２は、化合物（３）にハロゲン化剤を作用させて、化合物（４）を製造する工程である。

【０１８０】

反応は、溶媒を使用して、または溶媒を使用せず行うことができる。反応に使用する溶媒は、反応を阻害しないものであればよく、例えば、クロロホルム、ジクロロエタン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ベンゼン、トルエン、クロルベンゼン、ジクロルベンゼン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、１，４-ジオキサン、ジフェニルエーテル、またはこれらの混合物を挙げることができる。ハロゲン化剤が溶液の場合は、溶媒を使用せずに、過剰のハロゲン化剤で溶媒を兼ねて使用し、反応を行うのが好ましい。

【０１８１】

ハロゲン化剤としては、通常、例えば、アルコールのハロゲン化に使用されるものであれば、特に限定はない。例えば、チオニルクロリド、チオニルブロミド、チオニルアイオダイドのようなチオニルハライド類、スルフリルクロリド、スルフリルブロミド、スルフリルアイオダイドのようなスルフリルハライド類、三塩化リン、三臭化リン、三ヨウ化リンのような三ハロゲン化リン類、五塩化リン、五臭化リン、五ヨウ化リンのような五ハロゲン化リン類、オキシ塩化リン、オキシ臭化リン、オキシヨウ化リンのようなオキシハロゲン化リン類、下記の一般式

【０１８２】

【化３５】



【０１８３】

（式中、 R^{35} 、および R^{36} は、同一または異なって、炭素数１から６のアルキル基、または、一緒になって酸素原子を介してもよい炭素数２から６のアルキレン基を表わす。）で表わされるジアルキルアミノサルファイトフルオリド類、 $CF_3CHF(CF_2N(C_2H_5)_2)$ 、または $CF_3CF=CFN(C_2H_5)_2$ のようなフッ素化剤を挙げることができる。好ましくは、オキシ塩化リン等のクロル化剤である。

【０１８４】

反応温度は、通常、室温ないし２００℃の温度範囲で実施でき、好ましくは溶媒使用やハロゲン化剤が液体の場合に溶媒を兼ねる場合に２５℃から還流温度、好ましくは、５０℃から１５０℃の範囲である。反応時間は、１５分から４８時間の範囲でよく、通常は３０分から２時間程度で完結する。

【０１８５】

工程 3 は、化合物 (4) にアミン誘導体 (5) を作用させて、式 (I) で示した置換基 R^1 が (置換) アミノ基で置換された、本発明化合物を製造する工程である。この際、芳香族ハロゲン化合物 (4) へのアミン誘導体 (5) の求核置換反応によって、本発明化合物 (I) が生成する。

【0186】

反応は、溶媒を使用して、または溶媒を使用せず行うことができる。反応に使用する溶媒は、反応を阻害しないものであればよく、例えばジメチルスルホキシド、ピリジン、アセトニトリル、エタノール、クロロホルム、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリドン、テトラヒドロフラン、水、3-メトキシブタノール、またはこれらの混合物を挙げることができる。

【0187】

反応は無機塩基または有機塩基のような酸受容体、例えば、アルカリ金属もしくはアルカリ土類金属炭酸塩または炭酸水素塩、あるいはトリエチルアミン、ピリジン、1, 8-ジアザビシクロウンデセン、N-メチルピペリジン、N, N-ジイソプロピルエチルアミン等の有機塩基性化合物の存在下で行うのが好ましい。

【0188】

反応温度は、通常、室温ないし 200℃ の温度範囲で実施でき、好ましくは 25～150℃ の範囲である。反応時間は、30 分から 48 時間の範囲でよく、通常は 30 分から 18 時間程度で完結する。

【0189】

反応に使用するアミン誘導体 (5) が、アミノ基、水酸基、またはチオール基を有する場合は、それらの置換基が適当な保護基で保護された化合物を使用することができる。さらに、反応終了後、脱保護が必要な場合は保護基に対応した適当な条件で保護基を除去して式 (I) で示される目的化合物を得ることができる。

【0190】

保護基としては、この分野で通常使用されている保護基であればよく、例えば、第三級ブトキシカルボニル基、2, 2, 2-トリクロロエトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基類、ベンジルオキシカルボニル基、パラメトキシベンジルオキシカルボニル基、パラニトロベンジルオキシカルボニル基等のアラルキルオキシカルボニル基類、アセチル基、メトキシアセチル基、トリフルオロアセチル基、クロロアセチル基、ピバロイル基、ホルミル基、ベンゾイル基等のアシル基類、第三級ブチル基、ベンジル基、パラニトロベンジル基、パラメトキシベンジル基、トリフェニルメチル基等のアルキル基類、またはアラルキル基類、メトキシメチル基、第三級ブトキシメチル基、テトヒドロピラニル基、2, 2, 2-トリクロロエトキシメチル基等のエーテル類、トリメチルシリル基、イソプロピルジメチルシリル基、第三級ブチルジメチルシリル基、トリベンジルシリル基、第三級ブチルジフェニルシリル基等のシリル基類を挙げることができる。

【0191】


反応終了後、工程 3 の目的化合物は、通常実施される方法によって反応混合物から採取される。例えば、反応終了後、適当な溶媒を加えて析出した目的化合物をろ過、採取するか、反応液に水を加え、水と混和せず目的化合物を溶解する溶媒を加えて、目的化合物を抽出した後、抽出した有機層を適宜水洗等の操作後、無水硫酸ナトリウムや無水硫酸マグネシウム等を用いて乾燥させた後、溶媒を留去することによって目的化合物が得られる。

【0192】

また、先に述べた工程 1 において、 β -ケトエステル誘導体 (2) の代わりにアクリル酸エステルもしくはアクリロニトリル誘導体 (2-1) を用いても、 β -ケトエステル誘導体 (2) の場合と同様にして縮合環化体 (3-1) を得ることができる。この場合、塩基としてリチウムジイソプロピルアミドなどの強塩基を用いて -30℃ 以下の低温にて縮合環化体を得られる。アクリロニトリル誘導体を用いた場合に得られる縮合環化体 (3-1) のアミノ基は、Sandmeyer 反応などによりハロゲン原子に置換することができる。

【0193】

【化 3 6】



【0194】

さらに、このようにして得られる目的化合物は、必要に応じて、通常実施される方法、例えば、再結晶、再沈殿、クロマトグラフィー等によって精製できる。

【0195】

本発明化合物は、抗菌作用や抗癌作用を示さず抗真菌作用を特異的（選択的）に示すとともに、各種の真菌感染症の原因となる広範囲の真菌類に対して活性であり、これらの病原体によって引き起こされる疾病を治療し、予防し、または軽減することができる。

【0196】

本発明化合物が有効な真菌類として、カンジダ・アルビカンズ、カンジダ・グラブラタ、カンジダ・クルーセイ、カンジダ・トロピカリス等のカンジダ属諸菌種、クリプトコッカス・ネオフォルマンズ等のクリプトコッカス属、アスペルギルス・フミガタス、アスペルギルス・フラバス等のアスペルギウス属、ニューモシスティス・カリニ菌、クモリスカビ属、アブシディア属、ヒストプラズマ・カプスラータム等のヒストプラズマ属、コクシジオイデス・イミティス等のコクシジオイデス属、ブラストミセス属、バラコクシジオイデス・ブラジリエンシス等のバラコクシジオイデス属、ペニシリウム属、シェーダレシア属、スポロトリクス属、黒色真菌、トリコフィトン属、ミクロスポルム属、エピデルモフィトン属、マラセチア属、ホンセンカエア属、フサリウム属、ベシロミセス属、トリコスボロン・クタネウム等のトリコスボロン属、ヒアロホーラ属、クラドスポリウム等を例示することができる。さらに、サッカロミセス セレヴィシエ、カンジダ アルビカンズ、カンジダ グラブラタ、カンジダ クルーセイ、カンジダ トロピカリス、クリプトコッカス ネオフォルマンズ、トリコスボロン・クタネウム、アスペルギルス・フミガタス等を例示することができる。

【0197】

また、これらの病原体によって引き起こされる疾病として、内臓真菌症（深在性真菌症）としては、カンジダ症、クリプトコッカス症、アスペルギルス（糸状菌症）、アクチノマイセス症（放線菌症）、ノカルジア症、ムコール症（接合菌症）、ゲオトリクム症、ヒストプラズマ症、コクシジオイデス症、バラコクシジオイデス症、ブラストミセス症、ペニシリウム症等、具体的には、真菌血症、呼吸器真菌症、消化器真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎等が、深部皮膚真菌症としては、スポロトリコーシス、クロモミコーシス（黒色真菌症）、菌腫（マイセトーマ）等が、表在性真菌症としては、通常病型白癬、深在性白癬、難治性白癬、爪白癬、癬風、皮膚カンジダ症、口腔カンジダ症等を例示することができる。

また、本発明化合物は、動物の真菌感染症の原因となる各種の真菌類にも有効である。

【0198】

本発明化合物の病原性の真菌に対する抗真菌作用を利用して、本発明化合物、その塩、またはこれらの溶媒和物を含有する医薬、感染症治療剤、または抗真菌剤として用いることができる他、動物薬、水産用薬、または抗真菌性の保存剤にも応用が可能である。

【0199】

本発明化合物、その塩、またはこれらの溶媒和物は、これらを含有する医薬、感染症治療剤、または抗真菌剤の生産に使用してもよい。例えば、溶液状態で提供される注射剤または液剤等の生産のために本発明化合物、その塩、またはこれらの溶媒和物を使用してもよい。また、本発明化合物、その塩、またはこれらの溶媒和物を配合し、必要に応じて適

宜添加剤を加える等の通常の製剤の方法により、医薬、感染症治療剤、または抗真菌剤を生産することができる。

【0200】
本発明化合物を、その塩、またはこれらの溶媒和物からなる抗真菌剤の剤型としては例えば錠剤、散剤、顆粒剤、もしくはカプセル剤、あるいは溶液剤、シロップ剤、エリキシル剤、または油性もしくは水性の懸濁液等を経口用製剤として例示できる。

【0201】
注射剤としては、製剤中に安定剤、防腐剤、または溶解補助剤を使用することもあり、これらの補助剤を含むこともある溶液を容器に収納後、凍結乾燥等によって固形製剤として用時調製の製剤としてもよい。

【0202】
また外用製剤として溶液剤、懸濁液、乳濁液、軟膏、ゲル、クリーム、ローション、またはスプレー等を例示できる。

【0203】
固形製剤としては、本発明化合物、その塩、またはそれらの溶媒和物とともに製剤学上許容されている添加物を含んでよく、例えば、充填剤類や増量剤類、結合剤類、崩壊剤類、溶解促進剤類、湿潤剤類、潤滑剤類等を必要に応じて選択して混合し、製剤化することができる。

【0204】
液体製剤としては、溶液、懸濁液、乳液剤等を挙げることができるが添加剤として懸濁化剤、乳化剤等を含むこともある。

【0205】
本発明化合物、その塩、またはそれらの溶媒和物を動物に投与する方法としては、直接あるいは飼料中に混合して経口的に投与する方法、また溶液とした後、直接もしくは飲水、飼料中に添加して経口的に投与する方法、注射によって投与する方法等を例示することができる。

【0206】
本発明化合物、その塩、またはそれらの溶媒和物を動物に投与するための製剤としては、この分野において通常用いられている技術によって、適宜、散剤、細粒剤、可溶散剤、シロップ剤、溶液剤、あるいは注射剤とすることができる。

次に製剤処方例を示す。

【0207】

製剤例1．（カプセル剤）：			
実施例1の化合物	100.0	mg	
コーンスターチ	23.0	mg	
CMC カルシウム	22.5	mg	
ヒドロキシメチルセルロース	3.0	mg	
ステアリン酸マグネシウム	1.5	mg	
総計	150.0	mg	

【0208】

製剤例2．（溶液剤）：			
実施例1の化合物	1	～	10 g
酢酸又は水酸化ナトリウム	0.5	～	2 g
パラオキシ安息香酸エチル			0.1 g
精製水	88.9	～	98.4 g
計			100 g

【0209】

製剤例3．（飼料混合用散剤）：			
実施例1の化合物	1	～	10 g
コーンスターチ	98.5	～	89.5 g

【0210】

本発明の医薬の投与方法、投与量および投与回数は特に限定されずに、病原性真菌の種類や患者の年齢、体重、症状等の種々の条件に応じて適宜選択することができる。通常成人に対しては、経口または非経口（注射、点滴等）的投与により、1日、0.1～100 mg/kgを1回から数回に分割して投与すればよい。

【実施例】

【0211】

次に本願発明を実施例と参考例により説明するが、本願発明はこれに限定されるものではない。

【0212】

【参考例1】

6-n-ブチル-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-1)

既知の方法（国際公開第94/06791号パンフレット）に準じて合成した（1H-イミダゾール-2-イル）アセトニトリル 311 mg (2.90 mmol)、2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 626 μ l (3.19 mmol) および酢酸アンモニウム 448 mg (5.81 mmol) の混合物を140℃にて1.5時間加熱した。冷後、反応混合物に水を加え攪拌した後固体をろ取、アセトニトリルで洗浄後乾燥し標記化合物 288 mg (43%) を茶褐色固体として得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.94 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.36-1.50 (4H, m), 2.45 (3H, s), 2.61-2.65 (2H, m), 7.08 (1H, d, J = 2.2 Hz), 7.67 (1H, d, J = 2.2 Hz).

【0213】

【参考例2】

6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-2)

6-n-ブチル-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-1) 288 mg (1.26 mmol) および塩化ホスホリル 2.0 ml (21.5 mmol) の混合物を1時間加熱還流した。冷後、反応混合物を減圧下濃縮し、残留物に氷水を加え攪拌後、クロロホルムにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた粗生成物を乾燥させ標記化合物 304 mg (97%) を茶褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 247 (M⁺).

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.00 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.45-1.59 (4H, m), 2.69 (3H, s), 2.80-2.84 (2H, m), 7.73 (1H, d, J = 1.2 Hz), 7.78 (1H, d, J = 1.2 Hz).

【0214】

【実施例1】

6-n-ブチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 1)

6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-2) 299 mg (1.21 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (4 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 208 μ l (1.33 mmol) およびトリエチルアミン 336 μ l (2.41 mmol) を加え90℃にて5.5時間加熱した。反応混合物を濃縮後、残留物をクロロホルムで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。クロロホルム-メタノール (9:1, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 271 mg (69%) を褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 326 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.95-1.30 (3H, m), 1.41-1.53 (4H, m), 2.10 (1H, m), 2.28 (1H, m), 2.33 (6H, s), 2.62 (3H, s), 2.66-2.70 (2H, m), 2.97 (1H, m), 3.32 (1H, m), 3.34-3.47 (3H, m), 7.59 (1H, broad s), 7.63 (1H, broad s).

IR (ATR): 2954, 2861, 2815, 2767, 2217, 1610, 1486 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{19}\text{H}_{27}\text{N}_5$ として

理論値: C, 70.12%; H, 8.36%; N, 21.28%

実測値: C, 69.81%; H, 8.33%; N, 21.28%.

【0215】

【参考例3】

7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-3)

(1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル 160 mg (1.49 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 308 mg (1.49 mmol) および酢酸アンモニウム 230 mg (2.99 mmol) の混合物を140℃にて1.5時間加熱した。冷後、反応混合物に水を加えクロロホルムで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物にアセトニトリルを加え攪拌した後、析出した固体をろ取、乾燥し標記化合物 158 mg (43%) を褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 250 (M+1)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 2.16 (3H, s), 7.22 (2H, d, $J = 7.3$ Hz), 7.30 (1H, t, $J = 7.3$ Hz), 7.39 (2H, t, $J = 7.3$ Hz), 7.61 (1H, d, $J = 2.2$ Hz), 7.77 (1H, d, $J = 2.2$ Hz).

【0216】

【参考例4】

5-クロロ-7-メチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-4)

7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-3) 210 mg (0.84 mmol) および塩化ホスホリル 2.0 ml (21.5 mmol) の混合物を1.5時間加熱還流した。冷後、反応混合物を減圧下濃縮し、残留物に氷水を加え攪拌後、クロロホルムにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた粗生成物を乾燥させ標記化合物 156 mg (69 %) を茶褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 268, 270 (M+1)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 2.38 (3H, s), 7.23-7.25 (2H, m), 7.48-7.56 (3H, m), 7.80 (1H, m), 7.84 (1H, m).

【0217】

【実施例2】

5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-7-メチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 2)

5-クロロ-7-メチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-4) 156 mg (0.58 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (3 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 81.3 μl (0.64 mmol) およびトリエチルアミン 162 μl (1.17 mmol) を加え100℃にて18時間加熱した。反応混合物を濃縮後、残留物をクロロホルムで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。クロロホルム-メタノール(10:1, v/v)の混合溶媒で溶出し標記化合物 53 mg (26 %) を赤色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 346 (M+1)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.64 (1H, m), 1.95 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.29 (3H, s), 2.57 (1H, m), 2.82 (1H, dd, $J = 9.3, 8.1$ Hz), 2.98-3.04 (2H, m), 3.13 (1H, dd, $J = 9.3, 7.1$ Hz), 7.17 (1H, m), 7.21 (1H, m), 7.43-7.51 (3H, m), 7.56 (1H, d, $J = 1.2$ Hz), 7.68 (1H, d, $J = 1.2$ Hz).

IR (ATR): 2958, 2863, 2759, 2217, 1602, 1533, 1469, 1440 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{N}_5 \cdot 0.25\text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 72.08%; H, 6.77%; N, 20.01%.

実測値：C, 72.44%; H, 6.64%; N, 20.09%.

【0218】

【参考例5】

7-メチル-6-(2-メチルチアゾール-4-イル)-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-5)

(1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル 300 mg (2.80 mmol)、2-(2-メチルチアゾール-4-イル)アセト酢酸エチルエステル 637 mg (2.80 mmol) および酢酸アンモニウム 432 mg (5.60 mmol) の混合物を140℃にて1.5時間加熱した。冷後、反応混合物に水を加えクロロホルムで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物にアセトニトリルを加え攪拌した後、析出した固体をろ取、乾燥し標記化合物 260 mg (34%) を褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 271 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.43 (3H, s), 2.75 (3H, s), 7.11 (1H, d, J = 2.2 Hz), 7.75 (1H, d, J = 2.2 Hz).

【0219】

【参考例6】

5-クロロ-7-メチル-6-(2-メチルチアゾール-4-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-6)

7-メチル-6-(2-メチルチアゾール-4-イル)-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-5) 180 mg (0.66 mmol) および塩化ホスホリル 3.0 ml (32.2 mmol) の混合物を5時間加熱還流した。冷後、反応混合物を減圧下濃縮し、残留物に氷水を加え攪拌後、クロロホルムにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた粗生成物を乾燥させ標記化合物 150 mg (79 %) を茶褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 289, 291 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.45 (3H, s), 2.81 (3H, s), 7.25 (1H, s), 7.78 (1H, d, J = 1.5 Hz), 7.82 (1H, d, J = 1.5 Hz).

【0220】

【実施例3】

5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-7-メチル-6-(2-メチルチアゾール-4-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 3)

5-クロロ-7-メチル-6-(2-メチルチアゾール-4-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-6) 150 mg (0.52 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (3.5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 72.5 μ l (0.57 mmol) およびトリエチルアミン 145 μ l (1.04 mmol) を加え110℃にて10時間加熱した。反応混合物を濃縮後、残留物をクロロホルムで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。クロロホルム-メタノール(10:1, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 110 mg (58 %) を赤色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 367 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.74 (1H, m), 2.04 (1H, m), 2.19 (6H, s), 2.34 (3H, s), 2.65 (1H, m), 2.80 (3H, s), 2.86 (1H, t, J = 8.0 Hz), 3.04-3.13 (2H, m), 3.25 (1H, dd, J = 7.1, 9.3 Hz), 7.07 (1H, s), 7.56 (1H, d, J = 1.2 Hz), 7.66 (1H, d, J = 1.2 Hz).

IR (ATR): 2871, 2827, 2773, 2221, 1596, 1459 cm⁻¹.

元素分析値：C₁₉H₂₂N₆S 0.25H₂Oとして

理論値：C, 61.51%; H, 6.11%; N, 22.65%; S, 8.64%

実測値：C, 61.68%; H, 6.13%; N, 22.26%; S, 8.44%

【0221】

【参考例7】

7-エチル-6-ヘキシル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-7)

(1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル 300 mg (2.80 mmol)、2-プロピオニルオクタン酸エチルエステル 660 mg (3.08 mmol) および酢酸アンモニウム 432 mg (5.60 mmol) の混合物を140℃にて6時間加熱した。冷後、反応混合物に水を加えクロロホルムで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにより精製した。クロロホルム-メタノール (10:1, v/v) の混合溶媒にて溶出し標記化合物 446 mg (59%) を褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 272 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 0.89-0.91 (3H, m), 1.09 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.24-1.92 (8H, m), 2.60-2.66 (2H, m), 2.82 (2H, q, J = 7.1 Hz), 7.16 (1H, d, J = 2.5 Hz), 7.78 (1H, d, J = 2.5 Hz).

【0222】

【参考例8】

5-クロロ-7-エチル-6-ヘキシルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-8)

7-エチル-6-ヘキシル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-7) 446 mg (1.64 mmol) および塩化ホスホリル 4.0 mlの混合物を1時間加熱還流した。冷後、反応混合物を減圧下濃縮し、残留物に氷水を加え攪拌後、クロロホルムにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにより精製した。クロロホルム-メタノール (10:1, v/v) の混合溶媒で溶出して標記化合物 214 mg (45%) を褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 290, 292 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 0.92 (3H, t, J = 6.8 Hz), 1.28-1.39 (9H, m), 1.46 (1H, m), 1.57 (1H, m), 2.78-2.82 (2H, m), 3.01 (2H, q, J = 7.6 Hz), 7.73 (1H, d, J = 1.2 Hz), 7.78 (1H, d, J = 1.2 Hz).

【0223】

【実施例4】

5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-7-エチル-6-ヘキシルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#4)

5-クロロ-7-エチル-6-ヘキシルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-8) 214 mg (0.74 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (4.0 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 103 μl (0.81 mmol) およびトリエチルアミン 206 μl (1.48 mmol) を加え110℃にて3時間加熱した。反応混合物を濃縮後、残留物をクロロホルムで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。クロロホルム-メタノール (10:1, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 139 mg (51%) を赤色油状物として得た。

MS (ESI) m/z: 368 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 0.92 (3H, t, J = 6.8 Hz), 1.21 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.29-1.35 (6H, m), 1.40-1.54 (4H, m), 2.11 (1H, m), 2.32 (1H, m), 2.63-2.67 (2H, m), 2.93-2.98 (3H, m), 3.32 (1H, m), 3.42-3.45 (2H, m), 3.47 (2H, q, J = 7.1 Hz), 7.58 (1H, broad s), 7.64 (1H, d, J = 1.2 Hz).

IR (ATR): 2937, 2865, 2819, 2767, 2219, 1604, 1477 cm⁻¹.

【0224】

【参考例9】

6-ベンジル-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-9)

(1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル 300 mg (2.80 mmol)、2-ベンジルアセト酢酸エチルエステル 634 μl (3.08 mmol) および酢酸アンモニウム 432 mg (5.60 mmol) の混合物を120℃にて2時間加熱した。冷後、反応混合物に水を加えクロロホルム-メタノール

ル (5:1, v/v) で抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物にアセトニトリルを加え攪拌した後、析出した固体をろ取、乾燥し標記化合物 478 mg (65%) を褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 264 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.44 (3H, s), 4.05 (2H, s), 7.08 (1H, d, J = 2.4 Hz), 7.14 (1H, m), 7.21-7.25 (4H, m), 7.79 (1H, d, J = 2.4 Hz).

【0225】

【参考例10】

6-ベンジル-5-クロロ-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-10)

6-ベンジル-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-9) 478 mg (1.81 mmol) および塩化ホスホリル 3.0 mlの混合物を1時間加熱還流した。冷後、反応混合物を減圧下濃縮し、残留物に氷水を加え攪拌後、クロロホルムにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにより精製した。クロロホルム-メタノール (20:1, v/v) の混合溶媒で溶出して標記化合物 472 mg (93%) を褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 282, 284 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.56 (3H, s), 4.27 (2H, s), 7.06 (2H, d, J = 7.1 Hz), 7.25-7.32 (3H, m), 7.77 (1H, d, J = 1.2 Hz), 7.84 (1H, d, J = 1.2 Hz).

【0226】

【実施例5】

6-ベンジル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#5)

6-ベンジル-5-クロロ-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-11) 466 mg (1.65 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (10 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 210 μ l (1.65 mmol) およびトリエチルアミン 346 μ l (2.48 mmol) を加え100℃にて18時間加熱した。反応混合物を濃縮後、残留物をクロロホルムで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。クロロホルム-メタノール (20:1, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 364 mg (63 %) を赤色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 360 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.95 (1H, m), 2.19 (1H, m), 2.23 (6H, s), 2.43 (3H, s), 2.84 (1H, m), 3.34 (1H, m), 3.32-3.36 (3H, m), 4.11 (1H, d, J = 6.6 Hz), 4.16 (1H, d, J = 6.6 Hz), 7.00 (2H, d, J = 7.3 Hz), 7.20 (1H, t, J = 7.3 Hz), 7.26 (2H, d, J = 7.3 Hz), 7.65 (1H, s), 7.68 (1H, s).

IR (ATR): 2948, 2863, 2819, 2771, 2217, 1612, 1486 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₂H₂₅N₅として

理論値: C, 73.51%; H, 7.01%; N, 19.48%

実測値: C, 73.31%; H, 6.98%; N, 19.38%.

【0227】

【参考例11】

5-オキソ-1,5,6,7,8,9-ヘキサヒドロイミダゾ[1,2-b]イソキノリン-8-カルボニトリル (I-11)

(1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル 300 mg (2.80 mmol)、2-オキソシクロヘキサンカルボン酸エチルエステル 493 μ l (3.08 mmol) および酢酸アンモニウム 432 mg (5.60 mmol) の混合物を110℃にて2時間加熱した。冷後、反応混合物に水を加えクロロホルムで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物にアセトニトリルを加え攪拌した後、析出した固体をろ取、乾燥し標記化合物 360 mg (60%) を褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 214 (M+1)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.78-1.83 (4H, m), 2.58-2.64 (2H, m), 2.80-2.85 (2H, m), 7.09 (1H, d, J = 2.4 Hz), 7.73 (1H, d, J = 2.4 Hz).

【0228】

【参考例12】

5-クロロ-6,7,8,9-テトラヒドロイミダゾ[1,2-b]イソキノリン-8-カルボニトリル (I-12)

5-オキソ-1,5,6,7,8,9-ヘキサヒドロイミダゾ[1,2-b]イソキノリン-8-カルボニトリル (I-11) 360 mg (1.69 mmol) および塩化ホスホリル 5.0 mlの混合物を1時間加熱還流した。冷後、反応混合物を減圧下濃縮し、残留物に水を加え攪拌後、クロロホルム-メタノール (5:1, v/v) にて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにより精製した。クロロホルム-メタノール (100:1, v/v) の混合溶媒で溶出して標記化合物 329 mg (84%) を淡黄色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 232, 234 ($M+1$)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.86-1.94 (4H, m), 2.86 (2H, m), 3.13 (2H, m), 7.72 (1H, d, J = 1.5 Hz), 7.77 (1H, d, J = 1.5 Hz).

【0229】

【実施例6】

5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6,7,8,9-テトラヒドロイミダゾ[1,2-b]イソキノリン-8-カルボニトリル (#6)

5-クロロ-6,7,8,9-テトラヒドロイミダゾ[1,2-b]イソキノリン-8-カルボニトリル (I-13) 329 mg (1.42 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド (5.0 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 198 μl (1.56 mmol) およびトリエチルアミン 297 μl (2.13 mmol) を加え90℃にて4時間加熱した。反応混合物を濃縮後、残留物をクロロホルムで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。クロロホルム-メタノール (10:1, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 266 mg (61%) を紫色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 310 ($M+1$)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.79-1.89 (4H, m), 2.06 (1H, m), 2.29 (1H, m), 2.32 (6H, s), 2.69-2.73 (2H, m), 2.94 (1H, m), 3.09-3.12 (2H, m), 3.33 (1H, m), 3.45-3.53 (3H, m), 7.56 (1H, d, J = 1.1 Hz), 7.64 (1H, d, J = 1.1 Hz).

IR (ATR): 2937, 2865, 2819, 2767, 2219, 1604, 1477 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{18}\text{H}_{23}\text{N}_5$ として

理論値: C, 69.87%; H, 7.49%; N, 22.63%

実測値: C, 69.41%; H, 7.45%; N, 22.47%.

【0230】

【参考例13】

4-メチル-1-トリチル-1H-イミダゾール (I-13)

氷冷下、4-メチル-1H-イミダゾール 6.00 g (73.1 mmol) およびトリエチルアミン11.2 ml (80.4 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド 40 ml 溶液に塩化トリチル 20.4 g (73.1 mmol) を加えた。室温に戻し18時間攪拌した後、反応混合液をクロロホルムで希釈し飽和炭酸水素ナトリウムおよび飽和食塩水で洗浄し無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去した後、残留物にジエチルエーテルを加え結晶化させろ取、乾燥させて標記化合物 21.0 g (89%) を無色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 325 ($M+1$)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 2.05 (3H, s), 6.58 (1H, s), 7.03-7.09 (6H, m), 7.21 (1H, s), 7.30-7.42 (9H, m).

【0231】

【参考例14】

(4-メチル-1-トリチル-1H-イミダゾール-2-イル)メタノール (I-14)

氷冷下、4-メチル-1-トリチル-1H-イミダゾール (I-13) 10.5 g (32.4 mmol) のテトラヒドロフラン 300 ml 懸濁液にn-ブチルリチウム(1.58M n-ヘキサン溶液) 22.5 ml (35.6 mmol) を滴下し、室温に戻し2時間攪拌後パラホルムアルデヒド 3.0 g を一度に加えた。14時間攪拌した後、飽和塩化アンモニウム水溶液を加え反応を停止させ、水および酢酸エチルを加え抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去した後、残留物をカラムクロマトグラフィーにより精製した。クロロホルム-メタノール (10:1, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 6.58 g (57%) を淡黄色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 355 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 2.15 (3H, s), 3.64 (2H, s), 6.45 (1H, s), 7.12-7.15 (6H, m), 7.32-7.37 (9H, m).

【0232】

【参考例15】

2-クロロメチル-4-メチル-1H-イミダゾール (I-15)

氷冷下、(4-メチル-1-トリチル-1H-イミダゾール-2-イル)メタノール (I-14) 5.47 g (15.4 mmol) に塩化チオニル 4.70 ml (64.4 mmol) を加え0.5時間攪拌後室温に戻しさらに1.5時間攪拌した。反応混合液を減圧下濃縮し、残留物をテトラヒドロフランおよび酢酸エチルで結晶化させ標記化合物 1.59 g (79%) を無色固体として得た。

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 2.29 (3H, s), 4.32 (2H, s), 7.02 (1H, s), 7.11-7.12 (6H, m), 7.43-7.49 (9H, m)

【0233】

【参考例16】

(4-メチル-1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル (I-16)

氷冷下、シアン化カリウム 2.48 g (38.1 mmol) の水溶液 (11 ml) に2-クロロメチル-4-メチル-1H-イミダゾール (I-15) 1.59 g (9.52 mmol) のエタノール (50 ml) 溶液を滴下した。室温に戻し3時間攪拌後、不溶物をろ去し、ろ液を濃縮した。残留物を飽和炭酸水素ナトリウムで希釈した後酢酸エチルで抽出し、飽和食塩水で洗浄後無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去した後、残留物をカラムクロマトグラフィーにより精製した。酢酸エチルで溶出し標記化合物 758 mg (66%) を黄色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 122 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 2.25 (3H, s), 3.91 (2H, s), 6.74 (1H, s).

【0234】

【参考例17】

2,7-ジメチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-17)

(4-メチル-1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル (I-16) 250 mg (2.06 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 426 mg (2.06 mmol) および酢酸アンモニウム 318 mg (4.12 mmol) の混合物を140℃にて3時間加熱した。冷後、反応混合物に水を加えクロロホルムで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物にアセトニトリルを加え攪拌した後、析出した固体をろ取、乾燥し標記化合物 330 mg (61%) を褐色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 264 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 2.15 (3H, s), 2.31 (3H, s), 7.21-7.23 (2H, m), 7.31 (1H, m), 7.38-7.41 (2H, m), 7.54 (1H, s).

IR (ATR): 3156, 2204, 1650, 1616, 1523, 1317 cm⁻¹.

【0235】

【参考例18】

5-クロロ-2,7-ジメチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-18)

2,7-ジメチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-17) 432 mg (1.64 mmol) および塩化ホスホリル 2.5 ml (26.8 mmol) の混

合物を3時間加熱還流した。冷後、反応混合物を減圧下濃縮し、残留物に氷水を加え攪拌後、クロロホルムにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにより精製した。クロロホルム-メタノール (6:1, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 462 mg (100 %) を茶褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 282, 284 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-*d*₆) δ : 2.25 (3H, s), 2.43 (3H, s), 7.35-7.37 (2H, m), 7.47-7.56 (3H, m).

【0236】

【実施例7】

5-[(3*S*)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-2,7-ジメチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (#7)

5-クロロ-2,7-ジメチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-18) 556 mg (1.97 mmol) のジメチルスルホキシド (5 ml) 溶液に (3*S*)-ジメチルアミノピロリジン 275 μ l (1.97 mmol) およびトリエチルアミン 825 μ l (5.92 mmol) を加え100℃にて8時間加熱した。反応混合物を濃縮後、残留物を酢酸エチルで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。クロロホルム-メタノール (10:1, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 167 mg (24 %) を赤色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 360 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.67 (1H, m), 1.95 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.27 (3H, s), 2.52 (3H, s), 2.56 (1H, m), 2.81 (1H, m), 2.94-3.03 (2H, m), 3.12 (1H, dd, J = 7.1, 9.1 Hz), 7.15 (1H, m), 7.19 (1H, m), 7.29 (1H, broad s), 7.43-7.50 (3H, m).

IR (ATR): 2817, 2767, 2221, 1604, 1471 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₂H₂₅N₅として

理論値: C, 73.51%; H, 7.01%; N, 19.48%

実測値: C, 73.24%; H, 6.93%; N, 19.24%.

【0237】

【参考例19】

ベンジルオキシ酢酸 3-メチル-2-オキソブチルエステル (I-19)

氷冷下、ベンジルオキシ酢酸 7.40 g (44.5 mmol) および炭酸カリウム 12.3 g (89.1 mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド混合液に1-ブロモ-3-メチル-2-ブタノン 7.35 g (44.5 mmol) を加えた後室温にて6時間攪拌した。反応混合液をセライトろ過した後、ろ液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。n-ヘキサノン-酢酸エチル (3:2, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 10.5 g (94%) を淡黄色油状物として得た。

MS (ESI) m/z : (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.16 (6H, d, J = 6.8 Hz), 2.69 (1H, hept, J = 6.8 Hz), 4.24 (2H, s), 4.68 (2H, s), 4.85 (2H, s), 7.29-7.40 (5H, m).

【0238】

【参考例20】

2-ベンジルオキシメチル-4-イソプロピル-1*H*-イミダゾール (I-20)

ベンジルオキシ酢酸 3-メチル-2-オキソブチルエステル (I-19) 10.5 g (42.0 mmol) および酢酸アンモニウム 32.3 g (420 mmol) の混合物を140℃にて5時間加熱した。冷却後、反応混合物をクロロホルムで希釈し1*N*水酸化ナトリウムおよび飽和食塩水で洗浄し、有機層を無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。ろ過後減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。n-ヘキサノン-酢酸エチル (1:3, v/v) の混合溶媒で溶出した後、再度クロロホルム-メタノール (50:1, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 2.85 g (29%) を赤色油状物として得た。

MS (ESI) m/z : (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.25 (6H, d, J = 6.8 Hz), 2.89 (1H, hep, J = 6.8 Hz), 4.00 (1H, s), 4.57 (2H, s), 4.63 (2H, s), 6.68 (1H, s), 7.28-7.40 (5H, m).

【0239】

【参考例21】

(4-イソプロピル-1H-イミダゾール-2-イル)メタノール (I-21)

2-ベンジルオキシメチル-4-イソプロピル-1H-イミダゾール (I-20) 2.85 g (12.4 mmol) のエタノール溶液に 1N塩酸／エタノール溶液 13.6 ml (13.6 mmol) および 10% Pd/C 570 mg を加え 4気圧水素雰囲気下接触還元した。反応終了後触媒をろ去し、ろ液を濃縮し標記化合物 2.11 g を赤色油状物として得た。得られた粗生成物は精製せずに次の反応に付した。

MS (ESI) m/z : (M+1)⁺.

¹H-NMR (CD₃OD) δ : 1.32 (6H, d, J = 7.1 Hz), 3.03 (1H, hep, J = 7.1 Hz), 4.02 (1H, s), 4.81 (2H, s), 7.18 (1H, s).

【0240】

【参考例22】

2-クロロメチル-4-イソプロピル-1H-イミダゾール (I-22)

氷冷下、(4-イソプロピル-1H-イミダゾール-2-イル)メタノール (I-21) 2.11g に塩化チオニル 3.50 ml (47.8 mmol) を滴下した。室温にて2時間攪拌後、減圧下反応混合液を濃縮し標記化合物 2.45 g を黒色油状物として得た。得られた粗生成物は精製せずに次の反応に付した。

MS (ESI) m/z : (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-*d*₆) δ : 1.26 (6H, d, J = 6.8 Hz), 3.01 (1H, hep, J = 6.8 Hz), 5.01 (2H, s), 7.43 (1H, s), 8.35 (1H, s).

【0241】

【参考例23】

(4-イソプロピル-1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル (I-23)

氷冷下、シアン化カリウム 3.27 g (50.2 mmol) の水溶液 (14 ml) に 2-クロロメチル-4-イソプロピル-1H-イミダゾール (I-22) 2.45 g のエタノール (60 ml) 溶液を滴下した。室温にて2時間攪拌後不溶物をろ去、ろ液を減圧下濃縮し残留物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で希釈し酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去した後残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。酢酸エチルにて溶出し標記化合物 1.08 g (57%) を赤色油状物として得た。

MS (ESI) m/z : (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.25 (6H, d, J = 6.8 Hz), 2.90 (1H, hep, J = 6.8 Hz), 3.92 (2H, s), 6.72 (1H, s).

【0242】

【参考例24】

2-イソプロピル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-24)

(4-イソプロピル-1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル (I-23) 373 mg (2.50 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 567 mg (2.75 mmol) および酢酸アンモニウム 386 mg (5.00 mmol) の混合物を 135℃にて3.5時間加熱した。冷後、反応混合物に水を加えクロロホルム-メタノール (5:1, v/v) で抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し残留物にアセトニトリルを加え攪拌した後、析出した固体をろ取、乾燥し標記化合物 387 mg (53%) を淡黄色固体として得た。

MS (ESI) m/z : (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-*d*₆) δ : 1.29 (6H, d, J = 6.8 Hz), 2.14 (3H, s), 2.99 (1H, hep, J = 6.8 Hz), 7.21 (2H, d, J = 7.3 Hz), 7.29 (1H, t, J = 7.3 Hz), 7.38 (2H, t, J = 7.3 Hz).

【0243】

【参考例25】

5-クロロ-2-イソプロピル-7-メチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-25)

2-イソプロピル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-24) 387 mg (1.33 mmol) および塩化ホスホリル 2.0 ml (21.5 mmol) の混合物を1時間加熱還流した。冷後、反応混合物を減圧下濃縮し、残留物に水を加え攪拌後、クロロホルムにて抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、得られた粗生成物を乾燥させ標記化合物 285 mg (69 %) を茶褐色固体として得た。

MS(ESI) m/z : 247 (M^+).

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.40 (6H, d, $J = 6.8$ Hz), 2.35 (3H, s), 3.18 (1H, hept, $J = 6.8$ Hz), 7.20-7.23 (2H, m), 7.47-7.56 (4H, m).

【0244】

【実施例8】

5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-2-イソプロピル-7-メチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#8)

5-クロロ-2-イソプロピル-7-メチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-25) 285 mg (0.92 mmol) のジメチルスルホキシド (3 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 140 μl (1.10 mmol) およびトリエチルアミン 256 μl (1.83 mmol) を加え90℃にて5.5時間加熱した。反応混合物を濃縮後、残留物をクロロホルムで希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残留物をカラムクロマトグラフィーにて精製した。クロロホルム-メタノール(7:1, v/v) の混合溶媒で溶出し標記化合物 186 mg (52 %) を褐色固体として得た。

MS(ESI) m/z : 388 ($M+1$)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.39 (6H, d, $J = 6.5$ Hz), 1.65 (1H, m), 1.96 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.26 (3H, s), 2.55 (1H, hept, $J = 6.5$ Hz), 2.82 (1H, t, $J = 8.5$ Hz), 2.94-3.02 (2H, m), 3.11 (1H, m), 3.18 (1H, m), 7.14 (1H, m), 7.19 (1H, m), 7.41-7.49 (4H, m).

IR (ATR): 2958, 2863, 2759, 2217, 1602, 1533, 1469, 1440 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{19}\text{H}_{27}\text{N}_5 \cdot 0.25\text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 73.53%; H, 7.58%; N, 17.86%

実測値: C, 73.55%; H, 7.52%; N, 17.89%.

【0245】

【参考例26】

ベンジルオキシ酢酸 3,3-ジメチル-2-オキソ-ブチルエステル (1-26)

ベンジルオキシ酢酸 1.00 g (5.59 mmol) をN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) に溶解し、窒素気流下0℃にて炭酸カリウムおよび 1-ブロモ-3,3-ジメチル-2-ブタノン 1.0 g (5.59 mmol) をN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) に溶解した溶液を加えた。室温にて24時間攪拌した後、0.5M塩酸水溶液 (40 ml) にあけた。本溶液を酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムを用いて乾燥した。溶媒を留去して得られる残留物をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィーに付しヘキサン:酢酸エチル=95:5流分より標記化合物 1.17 g (80 %) を得た。

HRMS (FAB) m/z : 265.1446 (Calcd for $\text{C}_{15}\text{H}_{21}\text{O}_4$ 265.1440).

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.20 (9H, s), 4.24 (2H, s), 4.67 (2H, s), 4.97 (2H, s), 7.28-7.40 (5H, m).

IR (ATR): 1764, 1722, 1192, 1124, 1082, 987, 738, 698 cm^{-1} .

【0246】

【参考例27】

2-ベンジルオキシメチル-4-tert-ブチル-1H-イミダゾール (I-27)

ベンジルオキシ酢酸 3,3-ジメチル-2-オキソ-ブチルエステル (I-26) 6.46 g (24.44 mmol) および酢酸アンモニウム 18.8 g (244.4 mmol) を140℃にて12時間撹拌した。室温まで冷却した後、反応混合物をクロロホルムおよび1M水酸化ナトリウム水溶液で分画した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムを用いて乾燥した。溶媒を留去して得られる残留物をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィーに付しクロロホルム：メタノール=98：2流分より標記化合物4.52 g (76%) を淡黄色油状物として得た。

HRMS (EI) m/z : 244.1580 (Calcd for $C_{15}H_{20}N_2O$ 244.1576).

1H -NMR ($CDCl_3$) δ : 1.27 (9H, s), 4.55 (2H, s), 4.61 (2H, s), 6.66 (1H, s), 7.28-7.37 (5H, m).

IR (ATR): 2960, 1456, 1363, 1092, 1072, 735, 698 cm^{-1} .

【0247】

【参考例28】

4-tert-ブチル-2-クロロメチル-1H-イミダゾール塩酸塩 (I-28)

2-ベンジルオキシメチル-4-tert-ブチル-1H-イミダゾール (I-27) 4.48 g (18.34 mmol) をエタノール (45 ml) に溶解し、室温にて10%パラジウム炭素 (896 mg) および1M塩酸エタノール溶液 19.3 ml (19.25 mmol) を加えた。本混合物を4気圧水素気流下で12.5時間室温にて撹拌した。触媒を濾別後、溶媒を濃縮して2-ヒドロキシメチル-4-tert-ブチル-1H-イミダゾールを得た。(粗精製物として3.34 g) 次いで、本化合物に0℃にて塩化チオニル (6 ml) をゆっくり加え、室温にて9時間撹拌した。反応後、減圧下溶媒を留去し、残留物にトルエン (50 ml) を加え減圧下溶媒を留去した。この操作をもう一度繰り返した。次いで、テトラヒドロフラン (50 ml) を加え、減圧下溶媒を留去した。この操作をもう一度繰り返した。残留物にジエチルエーテルを加え、ソニケーションすると固体が生じた。本固形物を濾取し、減圧下乾燥し 標記化合物2.91 g (80%) を茶色粉末として得た。

MS (EI) m/z : 172 (M^+).

HRMS (EI) m/z : 172.0755 (Calcd for $C_8H_{13}N_2Cl$ 172.0767).

1H -NMR ($CDCl_3$) δ : 1.37 (9H, s), 4.91 (2H, s), 7.32 (1H, s).

IR (ATR): 2686, 1682, 1630, 1282, 901, 823, 727 cm^{-1} .

【0248】

【参考例29】

(4-tert-ブチル-1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル (I-29)

シアン化カリウム3.57 g (54.90 mmol) を水 (15 ml) に溶解し、4-tert-ブチル-2-クロロメチル-1H-イミダゾール塩酸塩 (I-28) 2.87 g (13.72 mmol) をエタノール (61 ml) に溶解した溶液を0℃にて1時間かけてゆっくり加えた。室温にて2時間撹拌後、沈殿物を濾別して得られる溶液を減圧下濃縮した。残留物に1M水酸化ナトリウム水溶液 (100 ml) を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムを用いて乾燥した。溶媒を留去して得られる残留物をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィーに付しヘキサン：酢酸エチル=1：2流分より標記化合物1.51 g (67%) をオレンジ色固体として得た。

HRMS (EI) m/z : 163.1101 (Calcd for $C_9H_{13}N_3$ 163.1109).

1H -NMR ($CDCl_3$) δ : 1.28 (9H, s), 3.90 (2H, s), 6.72 (1H, s).

IR (ATR): 2962, 2258, 1464, 1365, 1203, 754 cm^{-1} .

【0249】

【参考例30】

2-tert-ブチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-b]ピリジン-8-カルボニトリル (I-30)

(4-tert-ブチル-1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル (I-29) 300 mg (1.84 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチル386 μ l (2.02 mmol)、酢酸アンモニウム283 mg (3.68 mmol) を140℃で6時間加熱した。室温に冷却した後、クロロホルムおよび飽和炭酸水素ナト

リウム水溶液で分画した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムを用いて乾燥した。溶媒を留去して得られる残留物をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィーに付しヘキサン：酢酸エチル＝2：1流分より標記化合物398 mg (71%) を淡茶色固体として得た。

HREMS (EI) m/z : 305.1511 (Calcd for $C_{19}H_{19}N_3O$ 305.1528).

1H -NMR ($CDCl_3$) δ : 1.38 (9H, s), 2.28 (3H, s), 7.26-7.40 (2H, m), 7.36-7.40 (2H, m), 7.44 (1H, s), 11.58 (1H, br s).

IR (ATR): 2208, 1645, 1518, 1317, 748, 717 cm^{-1} .

【0250】

【参考例31】

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-31)

2-tert-ブチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-b]ピリジン-8-カルボニトリル (I-30) 458 mg (1.50 mmol) をオキシ塩化リン (10 ml) に溶解し窒素気流120℃で4時間加熱した。室温に冷却した後、減圧下溶媒を留去した。残留物をクロロホルムおよび飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で分画した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムを用いて乾燥した。溶媒を留去して得られる残留物をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィーに付しクロロホルム：アセトン＝97：3流分より標記化合物423 mg (87%) を茶色固体として得た。

MS (EI) m/z : 323 (M^+).

HRMS (EI) m/z : 323.1187 (Calcd for $C_{19}H_{18}N_3Cl$ 323.1189).

1H -NMR ($CDCl_3$) δ : 1.45 (9H, s), 2.35 (3H, s), 7.21-7.54 (2H, m) 7.49-7.54 (3H, m), 7.56 (1H, s).

IR (ATR): 2229, 1458, 1236, 773, 704 cm^{-1} .

【0251】

【実施例9】

(3'S)-2-tert-ブチル-5-(3-ジメチルアミノピロリジン-1-イル)-7-メチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#9)

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-31) 420 mg (1.30 mmol) を無水ジメチルスルホキシド (10 ml) に溶解し、窒素気流下室温にてトリエチルアミン362 μ l (2.59 mmol) および (3S)-(-)-(ジメチルアミノ)ピロリジン247 μ l (1.95 mmol) を加え、90℃で7時間加熱した。室温まで冷却した後、減圧下溶媒を留去した。残留物をクロロホルムおよび飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で分画した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムを用いて乾燥した。溶媒を留去して得られる残留物をシリカゲルを用いるカラムクロマトグラフィーに付しクロロホルム：アセトン＝9：1流分より標記化合物501 mg (96%) を桃色固体として得た。

MS (EI) m/z : 401 (M^+).

1H -NMR ($CDCl_3$) δ : 1.42 (9H, s), 1.67 (1H, dq, J = 8.8, 12.0), 1.93-2.00 (1H, m), 2.15 (6H, s), 2.24 (3H, s), 2.56 (1H, dq, J = 7.1, 8.8 Hz), 2.83 (1H, t, J = 8.8 Hz), 2.95-3.06 (2H, m), 3.12 (1H, dd, J = 7.1, 8.8 Hz), 7.12-7.21 (1H, m), 7.27 (1H, s), 7.41-7.50 (3H, m).

IR (ATR): 2222, 1606, 1471, 1227, 1201, 1153, 912, 704 cm^{-1} .

元素分析値： $C_{25}H_{31}N_5$ として

理論値：C, 74.78%; H, 7.78%; N, 17.44%

実測値：C, 74.55%; H, 7.79%; N, 17.40%.

【0252】

【参考例32】

2-tert-ブチル-7-メチル-6-(2-メチルチアゾール-4-イル)-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-32)

化合物I-30の合成法に従い、(4-tert-ブチル-1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル

(1-29) 300 mg (1.84 mmol)、2-(2-メチルチアゾール-4-イル)-3-オキソ-ブタン酸エチル 460 mg (2.02 mmol) および酢酸アンモニウム 283 mg (3.68 mmol) から、標記化合物 143 mg (24%) を茶色無定結晶として得た。

HRMS (EI) m/z : 326.1206 (Calcd for $C_{17}H_{18}N_4OS$ 326.1201).

1H -NMR ($CDCl_3$) δ : 1.05 (9H, s), 2.08 (3H, s), 2.38 (3H, s), 6.92 (1H, s), 6.93 (1H, s), 11.28 (1H, br s).

IR (ATR): 3112, 2204, 1643, 1529, 1173, 748, 731 cm^{-1} .

【0253】

【参考例33】

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-(2-メチルチアゾール-4-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-33)

化合物1-31の合成法に従い、2-tert-ブチル-7-メチル-6-(2-メチルチアゾール-4-イル)-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-32) 142 mg (0.44 mmol) およびオキシ塩化リン (5 ml) から、表題化合物 75 mg (50%) を茶色粉末として得た。

HRMS (EI) m/z : 344.0857 (Calcd for $C_{17}H_{17}N_4ClS$ 344.0862).

1H -NMR ($CDCl_3$) δ : 1.42 (9H, s), 2.41 (3H, s), 2.80 (3H, s), 7.21 (1H, s), 7.54 (1H, s).

IR (ATR): 2229, 1234, 1180, 766 cm^{-1} .

【0254】

【実施例10】

(3'S)-2-tert-ブチル-5-(3-ジメチルアミノピロリジン-1-イル)-7-メチル-6-(2-メチルチアゾール-4-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#10)

化合物#9の合成法に従い、2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-(2-メチルチアゾール-4-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-33) 72 mg (0.21 mmol)、トリエチルアミン 58 μ l (0.42 mmol) および (3S)-(-)-(ジメチルアミノ)ピロリジン 32 μ l (0.25 mmol) から表題化合物 87 mg (98%) を白色固体として得た。

MS (EI) m/z : 422 (M^+).

1H -NMR ($CDCl_3$) δ : 1.41 (9H, s), 1.74 (1H, dq, $J = 8.8, 12.2$), 2.01-2.09 (1H, m), 2.20 (6H, s), 2.30 (3H, s), 2.64 (1H, dq, $J = 7.3, 8.8$ Hz), 2.80 (3H, s), 2.87 (1H, t, $J = 8.8$ Hz), 3.02-3.14 (2H, m), 3.23 (1H, dd, $J = 7.3, 8.8$ Hz), 7.05 (1H, s), 7.26 (1H, s).

IR (ATR): 2216, 1604, 1495, 1460, 1340, 1234, 1174 cm^{-1} .

元素分析値: $C_{23}H_{30}N_6S$ として

理論値: C, 65.37%; H, 7.16%; N, 19.89%

実測値: C, 65.18%; H, 7.18%; N, 19.84%.

【0255】

【参考例34】

2-tert-ブチル-7-メチル-5-オキソ-6-(2-フェニルチアゾール-4-イル)-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-34)

化合物1-30の合成法に従い、(4-tert-ブチル-1H-イミダゾール-2-イル)アセトニトリル (1-29) 300 mg (1.84 mmol)、2-(2-フェニルチアゾール-4-イル)-3-オキソ-ブタン酸エチル 585 mg (2.02 mmol) および酢酸アンモニウム 283 mg (3.68 mmol) から、標記化合物 414 mg (58%) を白色粉末として得た。

HRMS (EI) m/z : 388.1388 (Calcd for $C_{22}H_{20}N_4OS$ 388.1418).

1H -NMR ($CDCl_3$) δ : 1.34 (9H, s), 2.39 (3H, s), 7.43-7.51 (5H, m), 7.70 (1H, s), 7.91-7.96 (2H, m).

IR (ATR): 3153, 2208, 1645, 1595, 1516, 758, 688 cm^{-1} .

【0256】

【参考例35】

2-(tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-(2-フェニルチアゾール-4-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-35)

化合物I-31の合成法に従い、2-tert-ブチル-7-メチル-5-オキソ-6-(2-フェニルチアゾール-4-イル)-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-34) 400 mg (1.03 mmol) およびオキシ塩化リン (10 ml) から、表題化合物208 mg (50%) を茶色粉末として得た。

HRMS (EI) m/z: 406.1013 (Calcd for C₂₂H₁₉N₄ClS 406.1019).

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.43 (9H, s), 2.47 (3H, s), 7.37 (1H, s), 7.44-7.50 (3H, m), 7.56 (1H, s), 7.96-8.01 (2H, m).

IR (ATR): 2227, 1606, 1464, 1439, 1238, 983, 764, 685 cm⁻¹.

【0257】

【実施例11】

(3'S)-2-tert-ブチル-5-(3-ジメチルアミノピロリジン-1-イル)-7-メチル-6-(2-フェニルチアゾール-4-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 11)

化合物#9の合成法に従い、2-(tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-(2-フェニルチアゾール-4-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-35) 205 mg (0.50 mmol)、トリエチルアミン141 μl (1.00 mmol) および(3S)-(-)-(ジメチルアミノ)ピロリジン77 μl (0.60 mmol) から表題化合物188 mg (77%) を茶色粉末として得た。

MS (EI) m/z: 484 (M⁺).

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.42 (9H, s), 1.73 (1H, dq, J = 8.8, 12.0), 1.96-2.06 (1H, m), 2.15 (6H, s), 2.36 (3H, s), 2.64 (1H, dq, J = 7.1, 8.8 Hz), 2.99 (1H, t, J = 8.8 Hz), 3.07 (1H, dt, J = 7.1, 8.8 Hz), 3.18 (1H, dt, J = 3.4, 8.8 Hz), 3.30 (1H, dd, J = 7.1, 8.8 Hz), 7.22 (1H, s), 7.30 (1H, s), 7.45-7.49 (3H, m), 7.96-8.01 (2H, m).

IR (ATR): 2218, 1603, 1471, 768, 688 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₈H₃₂N₆Sとして

理論値: C, 69.39%; H, 6.65%; N, 17.34%; S, 6.62%

実測値: C, 69.19%; H, 6.616%; N, 17.16%; S, 6.764%.

【0258】

【参考例36】

6-(1-ベンゾチオフェン-3-イル)-2-(tert-ブチル)-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-36)

特願2002-022767記載の方法に従い合成した2-(1-ベンゾチオフェン-3-イル)アセト酢酸メチル690 mg (2.78 mmol)、2-[4-(tert-ブチル)-1H-イミダゾ-2-イル]アセトニトリル (I-29) 454 mg (2.78 mmol) および酢酸アンモニウム 428 mg (5.56 mmol) の混合物を150℃にて1時間加熱した。放冷後、水を加えクロロホルムにて抽出した。得られた有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。n-ヘキサン-酢酸エチル (2:1) の混合溶媒で溶出し、標記化合物124 mg (12%) を淡灰色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 362 (M + 1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 1.38 (9H, s), 2.12 (3H, s), 7.31-7.37 (3H, m), 7.44 (1H, s), 7.58 (1H, s), 8.01 (1H, d, J = 8.0 Hz).

【0259】

【参考例37】

6-(1-ベンゾチオフェン-3-イル)-2-(tert-ブチル)-5-クロロ-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-37)

6-(1-ベンゾチオフェン-3-イル)-2-(tert-ブチル)-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-36) 122 mg (0.34 mmol) を塩化ホスホリル (1.20 ml) 中に2時間加熱還流した。放冷後、反応液を減圧下に濃縮し、ジクロロメタンを加え、飽和炭酸水素ナトリウム溶液にて中和し、飽和食塩水にて洗浄した。得られた

有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物を少量のメタノールに溶解し、n-ヘキサン-酢酸エチルにて再結晶精製し、標記化合物139 mg (quant.) を白色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 380 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.57 (9H, s), 2.48 (3H, s), 7.31 (1H, s), 7.41 (1H, t, J = 7.8 Hz), 7.48 (1H, t, J = 7.8 Hz), 7.60 (1H, s), 7.67 (1H, s), 8.00 (1H, d, J = 7.8 Hz).

【0260】

【実施例12】

6-(1-ベンゾチオフェン-3-イル)-2-(tert-ブチル)-5-[(3S)-3-(ジメチルアミノ)ピロリジン-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#12)

6-(1-ベンゾチオフェン-3-イル)-2-(tert-ブチル)-5-クロロ-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-37) 139 mg (0.37 mmol) をジメチルスルホキシド (3.00 ml) に懸濁させ、トリエチルアミン0.10 ml (0.73 mmol) および (3S)-ジメチルアミノピロリジン56 μl (0.44 mmol) を加え、90℃にて23時間加熱撹拌した。室温に戻した後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をクロロホルムに溶解し飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水にて洗浄した。有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧下留去し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。クロロホルム-メタノール (20:1) の混合溶媒で溶出し、標記化合物26 mg (16%) を淡赤色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 458 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 1.44 (9H, s), 1.50-1.70 (1H, m), 1.87 (1H, m), 2.04 (3H, s), 2.07 (3H, s), 2.21 (3H, d, J = 7.8 Hz), 2.34-2.39 / 2.51-2.55 (1H, m), 2.78-3.21 (4H, m), 7.23-7.45 (5H, m), 7.95 (1H, t, J = 6.6 Hz).

IR (ATR): 2769, 1458 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₇H₃₁N₅S · 0.5H₂Oとして

理論値: C, 69.49%; H, 6.91%; N, 15.01%; S, 6.87%

実測値: C, 69.53%; H, 6.73%; N, 14.68%; S, 6.85%.

【0261】

【参考例38】

6-(1-ベンゾフラン-3-イル)-2-(tert-ブチル)-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-38)

特願2002-022767記載の方法に従い合成した2-(1-ベンゾフラン-3-イル)アセト酢酸メチル521 mg (2.24 mmol)、2-[4-(tert-ブチル)-1H-イミダゾ-2-イル]アセトニトリル (1-29) 366 mg (2.24 mmol) および酢酸アンモニウム356 mg (4.48 mmol) の混合物を150℃にて16.5時間加熱した。放冷後、水を加えクロロホルムにて抽出した。得られた有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。クロロホルム-メタノール (20:1) の混合溶媒で溶出し、標記化合物350 mg (45%) を褐色油状物質として得た。

MS (ESI) m/z: 346 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.42 (9H, s), 2.38 (3H, s), 7.21 (1H, t, J = 7.6 Hz), 7.28-7.33 (2H, m), 7.47 (1H, s), 7.54 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.65 (1H, s), 11.0 (1H, br).

【0262】

【参考例39】

6-(1-ベンゾフラン-3-イル)-2-(tert-ブチル)-5-クロロ-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-39)

6-(1-ベンゾフラン-3-イル)-2-(tert-ブチル)-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-38) 350 mg (1.01 mmol) を塩化ホスホリル (3.50 ml) 中に1.5時間加熱還流した。放冷後、反応液を減圧下に濃縮し、クロロホルムを加え、飽和炭酸水素ナトリウム溶液にて中和し、飽和食塩水にて洗浄した。得られた有機

相を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。n-ヘキサン-酢酸エチル (2:1) の混合溶媒で溶出し、標記化合物192 mg (52%) を褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 364 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.44 (9H, s), 2.44 (3H, s), 7.23-7.43 (3H, m), 7.57 (1H, s), 7.62 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.68 (1H, s).

【0263】

【実施例13】

6-(1-ベンゾフラン-3-イル)-2-(tert-ブチル)-5-[(3S)-3-(ジメチルアミノ)ピロリジニル]-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 13)

6-(1-ベンゾフラン-3-イル)-2-(tert-ブチル)-5-クロロ-7-メチルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-39) 190 mg (0.52 mmol) をジメチルスルホキシド (4.00 ml) に懸濁させ、トリエチルアミン0.14 ml (1.04 mmol) および (3S)-ジメチルアミノピロリジン79 μl (0.63 mmol) を加え、90℃にて4時間加熱撹拌した。室温に戻した後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をクロロホルムに溶解し飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水にて洗浄した。有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧下留去し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。クロロホルム-メタノール (20:1) の混合溶媒で溶出し、ジエチルエーテルにて再結晶精製して、標記化合物104 mg (45%) を淡灰色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 442 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.44 (9H, s), 1.59-1.68 (1H, m), 1.91-1.99 (1H, m), 2.05 (3H, s), 2.09 (3H, s), 2.29, 2.31 (3H, s each), 2.35-2.44, 2.58-2.62 (1H, m each), 2.90-3.3 (4H, m), 7.24-7.29 (2H, m), 7.31, 7.32 (1H, s each), 7.37-7.42 (1H, m), 7.50, 7.56 (1H, s each), 7.60 (1H, t, J = 7.3 Hz).

IR (ATR): 2220, 1454 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₇H₃₁N₅Oとして

理論値: C, 73.44%; H, 7.08%; N, 15.86%

実測値: C, 73.10%; H, 7.07%; N, 15.72%.

【0264】

【参考例40】

2-(1-メチル-1H-インドール-3-イル)酢酸メチル (1-40)

2-(1-メチル-3-インドール)酢酸 5.00 g (26.43 mmol) をベンゼン (75 ml) およびメタノール (25 ml) の混合溶媒に溶解し、氷冷下にトリメチルシリルジアゾメタン15.90 ml (31.71 mmol, 2.0M n-ヘキサン溶液) を加え、室温にて14時間撹拌した。反応液を減圧下留去し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。n-ヘキサン-酢酸エチル (5:1) の混合溶媒にて溶出し、標記化合物5.68 g (quant.) を黄色透明油状物質として得た。

MS (ESI) m/z: 204 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 3.69 (3H, s), 3.75 (3H, s), 3.77 (2H, s), 7.03 (1H, s), 7.12 (1H, dt, J = 0.9, 8.0 Hz), 7.22 (1H, dt, J = 0.9, 8.0 Hz), 7.28 (1H, dd, J = 0.7, 8.3 Hz), 7.59 (1H, dd, J = 0.7, 7.8 Hz).

【0265】

【参考例41】

メチル 2-(1-メチル-1H-インドール-3-イル)-3-オキソブタノエイト (1-41)

n-ブチルリチウム8.90 ml (1.57M n-ヘキサン溶液) をテトラヒドロフラン (60 ml) に溶解させ、-20℃にてジイソプロピルアミン1.97 ml (14.02 mmol) を滴下した。同温にて15分間撹拌した後、反応液を-40℃に冷却し2-(1-メチル-1H-インドール-3-イル)酢酸メチル (1-40) 3.00 g (14.76 mmol) のテトラヒドロフラン溶液 (15 ml) を加え、同温にて1時間撹拌した。さらに無水酢酸0.49 ml (5.17 mmol) を滴下し、室温に昇温しながら16時間撹拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、ジエチルエーテルにて抽出し

、飽和食塩水にて洗浄した。得られた有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、*n*-ヘキサン-酢酸エチル（5:1）の混合溶媒で溶出し、標記化合物477 mg（無水酢酸に対して38%）をケト-エノール混合物・赤色油状物質として得た。

MS (ESI) m/z : 246 ($M+1$)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.90 (3H, s), 2.20 (3H, s), 3.66 (3H, s), 3.70 (3H, s), 3.77 (3H, s), 3.80 (3H, s), 4.98 (1H, s), 6.89 (1H, s), 7.10-7.18 (2H, m), 7.24-7.39 (6H, m), 7.57 (1H, d, J = 8.1 Hz), 13.26 (1H, s).

【0266】

【参考例42】

2-(tert-ブチル)-7-メチル-6-(1-メチル-1H-インドール-3-イル)-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-42)

2-[4-(tert-ブチル)-1H-イミダゾ-2-イル]アセトニトリル (I-29) 316 mg (1.94 mmol)、メチル 2-(1-メチル-1H-インドール-3-イル)-3-オキソブタノエイト (I-41) 475 mg (1.94 mmol) および酢酸アンモニウム308 mg (3.87 mmol) の混合物を150℃にて6時間加熱した。放冷後、水を加えクロロホルムにて抽出した。得られた有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をアセトニトリルにて再結晶精製し、標記化合物255 mg (37%) を淡褐色非晶質固体として得た。

MS (ESI) m/z : 359 ($M+1$)⁺.

¹H-NMR (DMSO-*d*₆) δ : 1.38 (9H, s), 2.21 (3H, s), 3.84 (3H, s), 6.98 (1H, t, J = 6.8 Hz), 7.15 (1H, t, J = 6.8 Hz), 7.16 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.25 (1H, s), 7.41 (1H, s), 7.46 (1H, d, J = 8.3 Hz), 13.07 (1H, s).

【0267】

【参考例43】

2-(tert-ブチル)-5-クロロ-7-メチル-6-(1-メチル-1H-インドール-3-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-43)

2-(tert-ブチル)-7-メチル-6-(1-メチル-1H-インドール-3-イル)-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-42) 250 mg (0.70 mmol) を塩化ホスホリル (2.50 ml) 中に2.5時間加熱還流した。放冷後、得られた反応液を氷水 (10 ml) に注ぎ、飽和炭酸水素ナトリウム溶液にて中和し、クロロホルムにて抽出し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた粗結晶をろ取した後、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、*n*-ヘキサン-酢酸エチル (4:1) の混合溶媒で溶出し、粗結晶とあわせてジエチルエーテル-酢酸エチルにて再結晶精製し、標記化合物170 mg (65%) を黄色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 377 ($M+1$)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.45 (9H, s), 2.42 (3H, s), 3.91 (3H, s), 7.07 (1H, s), 7.13-7.22 (2H, m), 7.32 (1H, dt, J = 1.5, 6.6 Hz), 7.43 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.56 (1H, s).

【0268】

【実施例14】

2-(tert-ブチル)-5-[(3S)-3-(ジメチルアミノ)ピロリジニル]-7-メチル-6-(1-メチル-1H-インドール-3-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 14)

2-(tert-ブチル)-5-クロロ-7-メチル-6-(1-メチル-1H-インドール-3-イル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-43) 168 mg (0.45 mmol) をジメチルスルホキシド (3.40 ml) に懸濁させ、トリエチルアミン0.14 ml (0.89 mmol) および (3S)-ジメチルアミノピロリジン68 μ l (0.54 mmol) を加え、90℃にて2時間加熱攪拌した。室温に戻した後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をクロロホルムに溶解し飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水にて洗浄した。有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧下留去し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。クロロホルム-メタノール (30:1) の混合溶媒で溶出し、クロロホルム-*n*-ヘキサン-酢酸エ

チルにて再結晶精製し、標記化合物 78 mg (38%) を白色固体として得た。

MS (ESI) m/z : 455 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.44 (9H, s), 1.51-1.65 (1H, m), 1.83-1.90 (0.5H, m), 2.02, 2.03 (6H, s each), 2.25, 2.27 (3H, s each), 2.31-2.35 (0.5H, m), 2.49-2.52 (0.5H, m), 2.79-3.91 (4H, m), 6.85, 6.91 (1H, s each), 7.11-7.25 (1H, m), 7.26-7.31 (1H, m), 7.40 (1H, t, J = 7.6 Hz).

IR (ATR): 2220, 1460, 746 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₈H₃₄N₆ · 0.25H₂Oとして

理論値: C, 73.25%; H, 7.57%; N, 18.30%

実測値: C, 73.28%; H, 7.51%; N, 18.04%.

【0269】

【参考例44】

2-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)酢酸 (I-44)

4-ブロモメチル-7-メトキシクマリン 5.00 g (18.58 mmol) を1規定水酸化ナトリウム水溶液に懸濁させ、6時間加熱還流した。反応液を氷冷して1規定塩酸水溶液にて中和し、クロホルムにて抽出した。得られた有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧下留去し、標記化合物 3.78 g (99%) を淡褐色固体の粗体として得、そのまま次反応に付した。

【0270】

【参考例45】

2-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)酢酸メチル (I-45)

メタノール (70 ml) 中に-40℃にて塩化チオニル 3.97 ml (55.11 mmol) を滴下し、同温にて30分間攪拌した。2-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)酢酸 (I-44) 3.78 g (18.37 mmol) のメタノール溶液 (30 ml) を滴下し、室温にて7時間攪拌した。反応液を減圧下に留去して、酢酸エチルにて希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および飽和食塩水にて洗浄した。得られた有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。n-ヘキサン-酢酸エチル (4:1) の混合溶媒にて溶出し、標記化合物 3.89 g (96%) を白色固体として得、そのまま次反応に付した。

【0271】

【参考例46】

メチル 2-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)-3-オキソブタノエイト (I-46)

n-ブチルリチウム 10.70 ml (16.81 mmol, 1.57M n-ヘキサン溶液) をテトラヒドロフラン (60 ml) に溶解させ、-20℃にてジイソプロピルアミン 2.36 ml (16.81 mmol) を滴下した。同温にて15分間攪拌した後、反応液を-40℃に冷却し2-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)酢酸メチル (I-45) 3.89 g (17.69 mmol) のテトラヒドロフラン溶液 (20 ml) を加え、同温にて1時間攪拌した。さらに無水酢酸 1.59 ml (16.81 mmol) を滴下し、室温に昇温しながら19時間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルにて抽出し、飽和食塩水にて洗浄した。得られた有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (10:1) の混合溶媒で溶出し、標記化合物 731 mg (無水酢酸に対して16%) をケト-エノール混合物・淡黄色透明油状物質として得た。

MS (ESI) m/z : 263 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.95, 2.23 (3H, s each), 3.68, 3.79 (3H, s each), 3.85, 3.86 (3H, s each), 4.83 (0.2H, s), 6.87-6.92 (1H, m), 7.02-7.04 (1H, m), 7.23 (1H, d, J = 8.5 Hz), 7.38 (0.8H, s), 7.40 (0.2H, d, J = 8.5 Hz), 7.71 (0.2H, s), 13.25 (0.6H, s).

【0272】

【参考例47】

2-(tert-ブチル)-6-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒ

ドロイミダゾ [1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-47)

2-[4-(tert-ブチル)-1H-イミダゾ-2-イル]アセトニトリル (I-29) 451 mg (2.76 mmol)、メチル 2-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)-3-オキソブタノエイト (I-46) 725 mg (2.76 mmol) および酢酸アンモニウム 439 mg (5.53 mmol) の混合物を 150℃ にて 11 時間加熱した。放冷後、水を加えクロロホルムにて抽出した。得られた有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (3:1) の混合溶媒で溶出し、標記化合物 300 mg (29%) を褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 376 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.42 (9H, s), 2.38 (3H, s), 3.86 (3H, s), 6.85 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.06 (1H, s), 7.18 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.47 (1H, s), 7.56 (1H, s), 11.01 (1H, s).

【0273】

【参考例48】

2-(tert-ブチル)-5-クロロ-6-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)-7-メチルイミダゾ [1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-48)

2-(tert-ブチル)-6-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロイミダゾ [1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-47) 300 mg (0.80 mmol) を塩化ホスホリル (3 ml) 中に 3 時間加熱還流した。放冷後、溶媒を減圧下留去し、酢酸エチルで希釈して、飽和炭酸水素ナトリウム溶液にて中和し、飽和食塩水にて洗浄した。得られた有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた粗結晶を n-ヘキサン-酢酸エチルにて再結晶精製し、標記化合物 241 mg (77%) を淡褐色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 394 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.44 (9H, s), 2.45 (3H, s), 3.89 (3H, s), 6.92 (1H, dd, J = 2.2, 8.8 Hz), 7.09 (1H, d, J = 8.3 Hz), 7.13 (1H, d, J = 2.2 Hz), 7.57 (1H, s), 7.58 (1H, s).

【0274】

【実施例15】

2-(tert-ブチル)-5-[(3S)-3-(ジメチルアミノ)ピロリジニル]-6-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)-7-メチルイミダゾ [1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#15)

2-(tert-ブチル)-5-クロロ-6-(6-メトキシ-1-ベンゾフラン-3-イル)-7-メチルイミダゾ [1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-48) 235 mg (0.60 mmol) をジメチルスルホキシド (4.70 ml) に懸濁させ、トリエチルアミン 0.17 ml (1.19 mmol) および (3S)-ジメチルアミノピロリジン 91 μl (0.72 mmol) を加え、90℃ にて 2 時間加熱攪拌した。室温に戻した後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をクロロホルムに溶解し飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水にて洗浄した。有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧下留去し、得られた残留物を n-ヘキサン-酢酸エチルにて再結晶精製し、標記化合物 163 mg (57%) を白色固体として得た。

MS (ESI) m/z: 472 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.43 (9H, s), 1.72 (1H, m), 1.95-1.99 (1H, m), 2.10, 2.14 (6H, s each), 2.29, 2.31 (3H, s each), 2.44-2.50, 2.62-2.66 (1H, m each), 2.97-3.33 (4H, m), 3.88 (3H, s each), 6.90-6.92 (1H, m), 7.07-7.13 (2H, m), 7.31 (0.8H, d, J = 4.2 Hz), 7.40, 7.46 (1H, s each), 7.56 (0.2H, d, J = 5.4 Hz).

IR (ATR): 2222, 1228 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₈H₃₃N₅O₂ · 0.5H₂O として

理論値: C, 69.98%; H, 7.13%; N, 14.57%

実測値: C, 69.89%; H, 6.91%; N, 14.25%.

【0275】

【実施例16】

2-(tert-ブチル)-7-メチル-6-フェニル-5-(1-ピペラジニル)イミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 16)

2-(tert-ブチル)-5-クロロ-7-メチル-6-フェニルイミダゾ[1,2-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-31) 300 mg (0.93 mmol) をジメチルスルホキシド (3 ml) に懸濁させ、トリエチルアミン 0.34 ml (2.41 mmol) およびピペラジン 104 mg (1.20 mmol) を加え、90℃にて20時間加熱撹拌した。室温に戻した後、反応液に水を加え、酢酸エチルにて抽出し、飽和食塩水にて洗浄した。得られた有機相を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、溶媒を減圧下留去し、酢酸エチル-n-ヘキサンの混合溶媒にて再結晶精製して、標記化合物 30 mg (9%) を赤色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 374 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 1.38 (9H, s), 2.17 (3H, s), 2.71 (4H, br s), 3.10 (4H, br s), 7.29 (2H, d, J = 8.1 Hz), 7.44 (1H, s), 7.46-7.53 (3H, m).

IR (ATR): 2224, 1604, 1485, 1442 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₃H₂₇N₅ · 0.5H₂Oとして

理論値: C, 72.22%; H, 7.38%; N, 18.31%

実測値: C, 71.91%; H, 7.24%; N, 17.83%.

【0276】

【参考例49】

2-アセチルヘキサン酸 ベンジルエステル (I-49)

窒素雰囲気下、アセト酢酸 15.0 g (78.0 mmol) のテトラヒドロフラン (80 ml) 溶液に氷冷下、水素化ナトリウム 1.56 g (39.0 mmol) を加え同温度で30分間撹拌後、1-ヨードブタン 3.40 ml (30.0 mmol) を加え、15時間加熱還流した。放冷後、反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (30:1 v/v) 溶出部より標記化合物 6.40 g (86%) を無色油状物として得た。

MS (FAB) m/z: 249 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 0.87 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.19-1.36 (4H, m), 1.79-1.93 (2H, m), 2.17 (3H, s), 3.44 (1H, t, J = 7.5 Hz), 5.17 (2H, s), 7.26-7.40 (5H, m).

【0277】

【参考例50】

2-アセチルヘキサン酸 N'-ベンゾイルヒドラジド (I-50)

2-アセチルヘキサン酸 ベンジルエステル (I-49) 3.70 g (2.89 mmol)、オルトギ酸トリメチル 3.30 ml (30.0 mmol) およびトシル酸一水和物 0.14 g (0.75 mmol) の混合物を35℃にて21時間撹拌した。減圧濃縮後、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (50:1 v/v) 溶出部より2-(1,1-ジメトキシエチル)-ヘキサン酸 ベンジルエステルを淡黄色結晶として得た (4.0 g、副生成物を含む)。得られた結晶の3.5 gをメタノール (20 ml) に溶解し、5%パラジウム炭素触媒 600 mgを加え、水素雰囲気下、2時間撹拌した。触媒をろ去後、減圧下溶媒を留去し、粗製の2-(1,1-ジメトキシエチル)-ヘキサン酸を得た (2.4 g、副生成物を含む)。この混合物 (2.3 g) をジクロロメタン (35 ml) に溶解し、氷冷下ベンズヒドラジド 2.60 g (19.0 mmol)、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩 3.20 g (16.5 mmol) および1-ヒドロキシベンゾトリアゾール 2.0 g (15.0 mmol) を加えた後、室温にて19時間撹拌した。1規定塩酸を加えた後、30分間撹拌し析出した結晶をろ去した。ろ液を飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄後、有機層を分取し硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物 1.50 g (42%、2-アセチルヘキサン酸 ベンジルエステルからの通算収率) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 277 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 0.85 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.20-1.37 (4H, m), 1.88 (2H, dd, J

= 7.5, 14.7 Hz), 2.24 (3H, s), 3.57 (1H, t, J = 7.5 Hz), 7.38 (2H, m), 7.51 (1H, m), 7.80 (2H, m), 9.86 (1H, d, J = 5.4 Hz), 10.09 (1H, d, J = 5.4 Hz).

【0278】

【参考例51-1】

6-n-ブチル-7-メチル-5-オキソ-2-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-51)

合成例 1

2-アセチルヘキサノ酸 N'-ベンゾイルヒドラジド (1-50) 830 mg (3.00 mmol) のメタノール (5 ml) 懸濁液にマロニトリル 200 mg (3.00 mmol) 及びナトリウムメトキシド 170 mg (3.00 mmol) を加え8時間加熱還流した。反応液を氷水に注ぎ酢酸 0.17 ml (3.00 mmol) を加え数分間攪拌した後、結晶をろ取り乾燥した。次いでこの生成物を酢酸 (3.00 ml) 中、4時間加熱還流した。放冷後、同量の水で希釈し、結晶をろ取後乾燥して標記化合物 754 mg (82%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 307 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 0.89 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.28-1.41 (4H, m), 2.38 (3H, s), 2.54 (2H, t, J = 7.2 Hz), 7.60 (3H, m), 8.15 (2H, m).

【0279】

【参考例52】

メチル ベンズイミデート 塩酸塩 (1-52)

ベンゾニトリル 200 ml (1.96 mol) のメタノール (95.2 ml, 2.36 mol) 溶液に、氷冷下4規定塩酸ジオキサノ酸溶液 734 ml (2.94 mol) を加え、室温にて5時間攪拌後反応液を減圧下濃縮した。得られた残留物にエーテル (500 ml) を加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 107 g (32%) を無色固体として得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 4.58 (3H, s), 7.58 (2H, m), 7.72 (1H, m), 8.41 (2H, m).

【0280】

【参考例53】

5-シアノメチル-3-フェニル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-53)

水酸化ナトリウム 1.40 g (33.3 mmol) をメタノール (60 ml) に溶解し氷冷した。そこにメチル ベンズイミデート 塩酸 (1-52) 5.70 g (33.2 mmol) およびシアノアセトヒドラジド 3.39 g (34.2 mmol) を加え2時間加熱還流した。反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物に飽和食塩水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をエーテルで洗浄し、ろ取、乾燥して標記化合物 4.93 g (81%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 185 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 4.22 (2H, s), 7.50 (3H, m), 7.97 (2H, m).

【0281】

【参考例51-2】

6-n-ブチル-7-メチル-5-オキソ-2-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-51)

合成例 2

5-シアノメチル-3-フェニル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-53) 1.00 g (5.43 mmol)、2-アセチルヘキサノ酸エチルエステル 1.06 g (5.70 mmol) および酢酸アンモニウム 879 mg (11.4 mmol) の混合物を150℃にて1時間加熱した。冷却後、水を加え析出した結晶をろ取り、さらにアセトニトリルで洗浄した。これをろ取、乾燥して標記化合物 1.13 g (68%) を無色固体として得た。機器データは合成例 1 にて得られた標品のそれらと一致した。

【0282】

【参考例51-3】

6-n-ブチル-7-メチル-5-オキソ-2-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-51)

合成例 3

5-シアノメチル-3-フェニル-1H-[1,2,4]トリアゾール (I-53) 2.12 g (12.0 mmol) と2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 4.47 g (24.0 mmol) の混合物を75℃にて10分間攪拌した後、ナトリウムメトキシドの30%メタノール溶液 2.4 g (13.2 mmol) を加え115℃にて6時間攪拌した (この際、メタノールは留去し反応混合物は徐々に固化した)。冷後、水 (6 ml) および濃塩酸 (2.4 ml) を加えた後、10分間加熱還流した。放冷後、析出した結晶をろ取し、アセトニトリルで洗浄後乾燥して標記化合物 2.11 g (57%) を茶色固体として得た。機器データは合成例 1 にて得られた標品のそれらと一致した。

【0283】

【参考例54】

6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-フェニル [1,2,4]トリアゾロ [1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-54)

6-n-ブチル-7-メチル-5-オキソ-2-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ [1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-51) 1.00 g (3.26 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中2時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物 1.01 g (95%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 325 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.01 (3H, d, J = 7.1 Hz), 1.54 (4H, m), 2.74 (3H, s), 2.89 (2H, t, J = 7.8 Hz), 7.50 (3H, m), 8.36 (2H, m).

【0284】

【実施例17】

6-n-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-2-フェニル [1,2,4]トリアゾロ [1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 17)

6-n-ブチル-5-クロロ-8-シアノ-7-メチル-2-フェニル [1,2,4]トリアゾロ [1,5-a]ピリジン (I-54) 500 mg (1.54 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 懸濁液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 215 μl (1.69 mmol) およびトリエチルアミン 429 μl (3.08 mmol) を加え80-90℃にて6.5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (98.5:1.5 v/v) 溶出部より標記化合物 569 mg (92%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 403 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 0.99 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.48 (4H, m), 2.11 (1H, m), 2.33 (1H, m), 2.36 (6H, s), 2.67 (3H, m), 2.78 (2H, m), 3.17 (1H, quint, J = 8.0 Hz), 3.49-3.61 (2H, m), 3.71-3.87 (2H, m), 7.48 (3H, m), 8.33 (2H, m).

IR (ATR): 2224, 1620, 1537, 1504, 1475, 1441, 1342 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₄H₃₀N₆として

理論値: C, 71.61%; H, 7.51%; N, 20.88%

実測値: C, 71.39%; H, 7.53%; N, 20.92%.

【0285】

<参考例55~66、68、71、74、76~125、実施例18~41>

【0286】

【表 1】

置換基R基	x	y	z	γ	ε
Ph		I-53	I-93	I-109	#18
Me	I-55	I-77	I-94	I-110	#19
Et	I-56	I-78	I-95	I-111	#20
Cyclopropyl	I-57	I-79	I-96	I-112	#21
i-Pr	I-58	I-80	I-97	I-113	#22
n-Bu	I-59	I-81	I-98	I-114	#23
i-Bu	I-60	I-82	I-99	I-115	#24
t-Bu	I-61	I-83	I-100	I-116	#25
2-pyridyl	I-62	I-84			
3-pyridyl	I-63	I-85	I-101	I-117	#26
4-pyridyl	I-64	I-86	I-102	I-118	#27
MeOCH ₂	I-65	I-87	I-103	I-119	#28
C(Me) ₂ OH	I-66	I-88	I-104	I-120	#33
CH ₂ CH ₂ OBn (I-67)	I-68	I-89	I-105	I-121	#34
CH ₂ CH ₂ Cl				I-122	#36
C(Me) ₂ COOEtとC(Me) ₂ COOMe の混合物 (I-69)	I-71	I-90	I-106	I-123	#37
C(Me) ₂ CH ₂ OBn (I-73)	I-74	I-91	I-107	I-124	#39
C(Me) ₂ CH ₂ OCH ₂ (p-F-Ph) (I-75)	I-76	I-92	I-108	I-125	#41

【0287】

上記表 1 中、Phはフェニル基、

Meはメチル基、

Etはエチル基、

Prはプロピル基、


Buはブチル基、

Bnはベンジル基を表す。

また上表 1 において、x、y、z、 γ 及び ε は次の化学式に示されるものである。

【0288】

【化 3 7】



【0 2 8 9】

【参考例 55】

エチル アセトイミデート 塩酸塩 (I-55)

アセトニトリル 30.0 ml (0.574 mol) のエタノール 40.0 ml (0.689 mol) 溶液に氷冷下 4 規定塩酸ジオキサン溶液 215 ml (0.86 mol) を加え、室温にて 4.5 時間攪拌後反応液を減圧下濃縮した。得られた残留物にエーテル (200 ml) を加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 40.6 g (57%) を無色固体として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (DMSO-d_6) δ : 1.31 (3H, t, $J = 7.1$ Hz), 2.34 (3H, s), 4.39 (2H, q, $J = 7.1$ Hz).

【0 2 9 0】

【参考例 56】

プロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (I-56)

プロピオニトリル 25.0 ml (0.328 mol) のメタノール (130 ml) 溶液に -10°C にて塩化水素ガスを吹き込みながら 5 時間攪拌後反応液を減圧下濃縮した。得られた残留物にエーテルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 41.7 g (100%) を淡黄色固体として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3OD) δ : 1.26 (3H, t, $J = 7.5$ Hz), 4.16 (3H, s).

【0 2 9 1】

【参考例 57】

シクロプロパンイミド酸メチル 塩酸塩 (I-57)

シクロプロピルシアニド 25.0 ml (0.329 mol) のメタノール (130 ml) 溶液に -10°C にて塩化水素ガスを吹き込みながら 5 時間攪拌後反応液を減圧下濃縮した。得られた残留物にエーテルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 43.2 g (97%) を無色結晶として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.20-1.32 (4H, m), 2.46 (1H, m), 4.24 (1H, m), 11.35 (1H, brs), 12.48 (1H, brs).

【0 2 9 2】

【参考例 58】

イソブチルイミド酸メチル 塩酸塩 (I-58)

イソブチロニトリル 27.0 ml (0.30 mol) のメタノール 15.0 ml (0.36 mol) 溶液に氷冷下 4 規定塩酸ジオキサン溶液 113 ml (0.45 mol) を加え、室温にて 5 時間攪拌後反応液を減圧下濃縮した。得られた残留物にエーテルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 25.8 g (63%) を無色固体として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3OD) δ : 1.29 (6H, d, $J = 6.9$ Hz), 1.94 (1H, sep, $J = 6.9$ Hz), 4.16 (3H, s).

【0 2 9 3】

【参考例 59】

ペンタンイミド酸メチル 塩酸塩 (I-59)

バレロニトリル 30.0 ml (0.287 mol) のメタノール 13.9 ml (0.344 mol) 溶液に氷冷下 4 規定塩酸ジオキサン溶液 108 ml (0.431 mol) を加え、室温にて 5.5 時間攪拌後反応液を減圧下濃縮した。得られた残留物にエーテル (200 ml) を加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 26.0 g (60%) を無色固体として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (DMSO-d_6) δ : 0.86 (3H, t, $J = 7.5$ Hz), 1.29 (1H, sex, $J = 7.5$ Hz), 1.57

(2H, quint, $J = 7.5$ Hz), 2.62 (2H, t, $J = 7.5$ Hz), 4.06 (3H, s), 11.6 (2H, brs).

【0294】

【参考例60】

3-メチルブチルイミド酸メチル 塩酸塩 (I-60)

イソバレロニトリル 25.0 ml (0.24 mol) のメタノール 12.0 ml (0.29 mol) 溶液に氷冷下4規定塩酸ジオキサン溶液 90 ml (0.36 mol) を加え、室温にて5時間攪拌後反応液を減圧下濃縮した。得られた残留物にエーテルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 10.8 g (30%) を無色固体として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3OD) δ : 1.02 (6H, d, $J = 6.6$ Hz), 2.13 (1H, m), 2.53 (2H, d, $J = 7.2$ Hz), 4.16 (3H, s).

【0295】

【参考例61】

2,2-ジメチルプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (I-61)

トリメチルアセトニトリル 30.0 ml (0.271 mol) のメタノール 13.2 ml (0.326 mol) 溶液に氷冷下4規定塩酸ジオキサン溶液 102 ml (0.407 mol) を加え、室温にて7.5時間攪拌後反応液を減圧下濃縮した。得られた残留物にエーテル (100 ml) およびn-ヘキサン (50 ml) を加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 8.06 g (20%) を無色固体として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.25 (9H, s), 4.10 (3H, s), 11.2 (2H, brs).

【0296】

【参考例62】

ピリジン-2-イミド酸エチル 二塩酸塩 (I-62)

2-シアノピリジン 20.5 g (0.197 mol) のエタノール (16 ml) とジクロロメタン (200 ml) の混合溶液に氷冷下塩化水素ガスを1時間吹き込んだ後、室温にて一夜攪拌した (結晶が析出)。反応懸濁液に窒素ガスを1時間吹き込んだ後、結晶をエーテルで洗浄後ろ取、乾燥して標記化合物 40.4 g (92%) を無色結晶として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3OD) δ : 1.64 (3H, t, $J = 7.1$ Hz), 4.72 (2H, q, $J = 7.1$ Hz), 7.74-7.84 (1H, m), 8.07-8.17 (1H, m), 8.19-8.31 (1H, m), 8.81-8.86 (1H, m).

【0297】

【参考例63】

ニコチンイミド酸エチル 二塩酸塩 (I-63)

3-シアノピリジン 20.0 g (0.192 mol) のエタノール (16 ml) とジクロロメタン (200 ml) の混合溶液に氷冷下塩化水素ガスを1時間吹き込んだ後、室温にて一夜攪拌した (結晶が析出)。反応懸濁液に窒素ガスを1時間吹き込んだ後、結晶をエーテルで洗浄後ろ取、乾燥して標記化合物 41.4 g (97%) を無色結晶として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3OD) δ : 1.17 (3H, t, $J = 7.0$ Hz), 3.60 (2H, q, $J = 7.0$ Hz), 8.17-8.38 (1H, m), 8.96-9.24 (2H, m), 9.30-9.52 (1H, m).

【0298】

【参考例64】

イソニコチンイミド酸エチル 二塩酸塩 (I-64)

4-シアノピリジン 20.0 g (0.192 mol) のエタノール (16 ml) とジクロロメタン (200 ml) の混合溶液に氷冷下塩化水素ガスを1時間吹き込んだ後、室温にて一夜攪拌した (結晶が析出)。反応懸濁液に窒素ガスを1時間吹き込んだ後、結晶をエーテルで洗浄後ろ取、乾燥して標記化合物 42.9 g (100%) を無色結晶として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3OD) δ : 1.08 (3H, t, $J = 7.1$ Hz), 3.51 (2H, q, $J = 7.1$ Hz), 8.42-8.51 (2H, m), 8.97-9.02 (1H, m), 9.08-9.15 (1H, m).

【0299】

【参考例65】

2-メトキシアセトイミド酸メチル 塩酸塩 (I-65)

メトキシアセトニトリル 10.0 ml (0.134 mol) のメタノール (100 ml) 溶液に -10°C に

て塩化水素ガスを1時間吹き込んだ（内温は-5℃以下）後、その後1時間かけて内温5℃まで昇温した後さらに2.5時間攪拌した。反応液を濃縮後、得られた残留物にエーテル（100 ml）を加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物17.6 g（94%）を無色結晶として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3OD) δ : 3.34 (3H, s), 3.51 (3H, s), 4.39 (2H, s).

【0300】

【参考例66】

2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (I-66)

シアノヒドリン5.2 ml（97%, 57.0 mmol）のメタノール（150 ml）溶液に内温を3℃以下に維持しながら塩化水素ガスを4時間吹き込みながら攪拌した。反応液を濃縮（約50 mlまで）後、得られた残留物にエーテル（300 ml）を加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物8.12 g（93%）を無色結晶として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CD_3OD) δ : 1.49 (6H, s), 4.12 (3H, s).

【0301】

【参考例67】

3-ベンジルオキシプロピオニトリル (I-67)

水素化ナトリウム12.3 g（0.308 mol）をテトラヒドロフラン（200 ml）に懸濁し、内温を0℃以下に維持しながら3-ヒドロキシプロピオニトリル20.0 ml（0.293 mol）を滴下し同温にて10分間攪拌した。次いでベンジルブロミド36.6 ml（0.308 mol）を滴下した後、N,N-ジメチルホルムアミド（40 ml）を発熱に注意しながら滴下した。0℃にて2時間攪拌後反応液を濃縮し得られた残留物を飽和塩化アンモニウム水溶液に注いだ。クロロホルムで抽出し有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル（5:1 v/v）溶出部より標記化合物33.0 g（70%）を淡黄色油状物として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 2.62 (2H, t, $J = 6.4$ Hz), 3.68 (2H, t, $J = 6.4$ Hz), 4.58 (2H, s), 7.25-7.37 (5H, m).

【0302】

【参考例68】

3-ベンジルオキシプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (I-68)

3-ベンジルオキシプロピオニトリル（I-67）20.0 g（0.124 mol）のメタノール（120 ml）溶液に内温を-5℃以下に維持しながら塩化水素ガスを6時間吹き込んだ後、その後1.5時間かけて内温5℃まで昇温した。反応液を濃縮後、得られた残留物にエーテル（150 ml）を加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物25.0 g（88%）を淡黄色固体として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 3.05 (2H, t, $J = 5.9$ Hz), 3.83 (2H, t, $J = 5.9$ Hz), 4.28 (3H, s), 4.54 (2H, s), 7.26-7.37 (5H, m), 11.7 (1H, brs), 12.5 (1H, brs).

【0303】

【参考例69】

シアノ-ジメチル酢酸エチルエステルとシアノ-ジメチル酢酸メチルエステルの混合物 (I-69)

シアノ酢酸エチル11.3 g（0.10 mol）のN,N-ジメチルホルムアミド（250 ml）溶液に氷冷下水素化ナトリウム8.8 g（0.22 mol）を加え同温にて30分間攪拌した。よう化メチル15.6 ml（0.25 mol）のテトラヒドロフラン（15 ml）溶液を45分かけて滴下した後、室温にて71時間攪拌した。飽和食塩水を加え酢酸エチルで抽出し、有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル（5:1 v/v）溶出部より標記化合物8.27 gを無色油状物として得た。これはそのまま次の反応に用いた。

【0304】

【参考例70】

シアノ-ジメチル酢酸エチルエステル (I-70)

シアノ酢酸エチル 56.6 g (0.50 mol) のジメチルスルホキシド (200 ml) 溶液に炭酸カリウム 242 g (1.75 mol) を加え、氷冷下よう化メチル 109 ml (1.75 mol) を1時間かけて滴下した後、室温にてさらに2時間攪拌した。反応液をろ過し、ろ液に飽和食塩水を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (9:1 v/v) 溶出部より標記化合物 57.6 g (82%) を無色油状物として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.33 (3H, t, $J = 7.2$ Hz), 1.61 (6H, s), 4.27 (2H, q, $J = 7.2$ Hz)。

【0305】

【参考例71】

2-エトキシカルボニドイル-2-メチルプロピオン酸エチルエステル塩酸塩と2-エトキシカルボニドイル-2-メチルプロピオン酸メチルエステル塩酸塩の混合物 (I-71)

シアノ-ジメチル酢酸エチルエステルとシアノ-ジメチル酢酸メチルエステルの混合物 (I-69) 8.00 g のエタノール (50 ml) 溶液に -10°C にて塩化水素ガスを吹き込みながら6時間攪拌した。反応液を濃縮後、得られた残留物にエーテルを加え30分間攪拌後析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 8.2 g を無色固体として得た。これはそのまま次の反応に用いた。

【0306】

【参考例72】

3-ヒドロキシ-2,2-ジメチルプロピオニトリル (I-72)

窒素雰囲気下、水素化ホウ素リチウム 4.8 g (0.22 mol) のテトラヒドロフラン (500 ml) 溶液にシアノ-ジメチル酢酸エチルエステル (I-70) 28.2 g (0.20 mol) のテトラヒドロフラン (200 ml) 溶液を30分間かけて滴下した後、室温にて一夜攪拌した。反応液に6規定塩酸を加え分液し、水層を酢酸エチルで抽出し、先の有機層と合せて飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去し、得られた残留物にエーテルを加え、不溶物をろ去しろ液の溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (2:1 v/v) 溶出部より標記化合物 12.5 g (63%) を無色油状物として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.36 (6H, s), 2.26 (1H, brs), 3.58 (2H, s)。

【0307】

【参考例73】

3-ベンジルオキシ-2,2-ジメチルプロピオニトリル (I-73)

3-ヒドロキシ-2,2-ジメチルプロピオニトリル (I-72) 10.9 g (0.11 mol) のテトラヒドロフラン (330 ml) 溶液にN,N-ジメチルホルムアミド (55 ml) を加え、氷冷下水素化ナトリウム 5.3 g (0.132 mol) を加え室温にて30分間攪拌した。再び氷冷し、ベンジルブロミド 19.6 ml (0.165 mol) およびテトラn-ブチルアンモニウムヨード 4.1 g (11.0 mmol) を加えた後、室温まで昇温させながら一夜攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (9:1 v/v) 溶出部より標記化合物 20.0 g (96%) を無色油状物として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.36 (6H, s), 3.38 (2H, s), 4.62 (2H, s), 7.29-7.37 (5H, m)。

【0308】

【参考例74】

3-ベンジルオキシ-2,2-ジメチルプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (I-74)

3-ベンジルオキシ-2,2-ジメチルプロピオニトリル (I-73) 18.9 g (0.10 mol) のジクロロメタン (200 ml) 溶液にメタノール 8.1 ml (0.20 mol) を加え、 -5°C まで冷却後塩化水素ガスを1時間吹き込んだ。 0°C にて一夜攪拌後、反応液を濃縮し得られた残留物にエーテル (150 ml) を加え30分間攪拌した。析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 15.2 g (59%) を淡黄色固体として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.38 (6H, s), 3.63 (2H, s), 4.33 (3H, s), 4.55 (2H, s), 7.27-7.37 (5H, m).

【0309】

【参考例75】

3-(4-フルオロベンジルオキシ)-2,2-ジメチルプロピオニトリル (I-75)

3-ヒドロキシ-2,2-ジメチルプロピオニトリル (I-72) 2.0 g (20.0 mmol) のテトラヒドロフラン (60 ml) 溶液にN,N-ジメチルホルムアミド (10 ml) を加え、氷冷下水素化ナトリウム1.0 g (24.0 mmol) を加え30分間攪拌した。氷冷下、1-ブromoメチル-4-フルオロベンゼン3.90 ml (24.0 mmol) およびテトラn-ブチルアンモニウムヨード700 mg (2.00 mmol) を加えた後、室温まで昇温させながら一夜攪拌した。反応液に水を加え酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (15:1 v/v) 溶出部より標記化合物2.1 g (50%) を無色油状物として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.36 (6H, s), 3.38 (2H, s), 4.57 (2H, s), 7.04 (2H, m), 7.32 (2H, m).

【0310】

【参考例76】

3-(4-フルオロフェニル)-2,2-ジメチルプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (I-76)

3-(4-フルオロベンジルオキシ)-2,2-ジメチルプロピオニトリル (I-75) 1.90 g (9.20 mmol) のジクロロメタン (20 ml) 溶液にメタノール0.8 ml (20 mmol) を加え、 -10°C まで冷却後塩化水素ガスを1.5時間吹き込んだ。 0°C にて一夜攪拌後、反応液を濃縮し得られた残留物にエーテル (150 ml) を加え30分間攪拌した。析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物1.10 g (42%) を淡黄色固体として得た。

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.19 (6H, s), 3.62 (2H, s), 4.33 (3H, s), 4.52 (2H, s), 7.03 (2H, m), 7.28 (2H, m).

【0311】

【参考例77】

5-シアノメチル-3-メチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (I-77)

水酸化ナトリウム3.39 g (95%, 34.2 mmol) のメタノール (60 ml) 溶液にエチル アセトイミデート 塩酸塩 (I-55) 4.10 g (33.2 mmol) およびシアノアセトヒドラジド3.39 g (34.2 mmol) を加え2時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物にエタノールを加え不溶物をろ去しろ液の溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (30:1 v/v) 溶出部より標記化合物3.01 g (74%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 123 ($M+1$)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) δ : 2.32 (3H, s), 4.03 (2H, s).

【0312】

【参考例78】

(5-エチル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-アセトニトリル (I-78)

水酸化ナトリウム2.04 g (51.0 mmol) のメタノール (100 ml) 溶液にプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (I-56) 6.18 g (50.0 mmol) およびシアノアセトヒドラジド5.46 g (51.5 mmol) を加え2.5時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物6.00 g (88%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 137 ($M+1$)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.37 (3H, t, $J = 7.5$ Hz), 2.86 (2H, q, $J = 7.5$ Hz), 3.88 (2H, s), 11.61 (1H, brs).

【0313】

【参考例79】

(5-シクロプロピル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-アセトニトリル (I-79)

水酸化ナトリウム 2.04 g (51.0 mmol) のメタノール (100 ml) 溶液にシクロプロパンイミド酸メチル 塩酸塩 (1-57) 6.78 g (50.0 mmol) およびシアノアセトヒドラジド 5.46 g (51.5 mmol) を加え 2.5 時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物 3.69 g (53%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 149 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.04-1.15 (4H, m), 2.02 (1H, m), 3.83 (2H, s), 11.60 (1H, brs).

【0314】

【参考例80】

5-イソプロピル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-アセトニトリル (1-80)

水酸化ナトリウム 2.04 g (51.0 mmol) のメタノール (100 ml) 溶液にイソブチルイミド酸メチル 塩酸塩 (1-58) 6.88 g (50.0 mmol) およびシアノアセトヒドラジド 5.46 g (51.5 mmol) を加え 2.5 時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (75:1 v/v) 溶出部より標記化合物 5.85 g (76%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 151 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.39 (6H, d, J = 6.9 Hz), 3.16 (1H, sep, J = 6.9 Hz), 3.89 (2H, s), 11.04 (1H, brs).

【0315】

【参考例81】

3-n-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-81)

水酸化ナトリウム 1.40 g (33.3 mmol) のメタノール (60 ml) 溶液にペンタンイミド酸メチル 塩酸塩 (1-59) 5.03 g (33.2 mmol) およびシアノアセトヒドラジド 3.39 g (34.2 mmol) を加え 2 時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物にクロロホルムを加え不溶物をろ去し、ろ液の溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (99:1 v/v) 溶出部より標記化合物 4.11 g (76%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 165 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.94 (3H, t, J = 7.4 Hz), 1.04 (2H, sex, J = 7.4 Hz), 1.69-1.80 (2H, m), 2.80 (2H, t, J = 7.8 Hz), 3.88 (2H, s), 11.6 (1H, brs).

【0316】

【参考例82】

5-イソブチル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-アセトニトリル (1-82)

水酸化ナトリウム 2.04 g (51.0 mmol) のメタノール (100 ml) 溶液に 3-メチルブチルイミド酸メチル 塩酸塩 (1-60) 7.58 g (50.0 mmol) およびシアノアセトヒドラジド 5.46 g (51.5 mmol) を加え 2.5 時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物 7.36 g (90%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 165 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.89 (6H, d, J = 6.6 Hz), 2.11 (1H, m), 2.69 (2H, d, J = 7.5 Hz), 3.89 (2H, s), 11.65 (1H, brs).

【0317】

【参考例83】

3-tert-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-83)

水酸化ナトリウム 1.95 g (46.3 mmol) のメタノール (84 ml) 溶液に 2,2-ジメチルプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (1-61) 7.00 g (46.2 mmol) およびシアノアセトヒドラジド 4.72 g (47.6 mmol) を加え 2 時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物にクロロホルムを加え不溶物をろ去し、ろ液の溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (99:1 v/v)

) 溶出部より標記化合物4.74 g (63%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 165 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.42 (9H, s), 3.87 (2H, s), 11.0 (1H, brs).

【0318】

【参考例84】

5-(2-ピリジル)-2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (1-84)

0.554規定水酸化ナトリウムメタノール溶液 (77 ml) にピリジン-2-イミド酸エチル二塩酸塩 (1-62) 6.69 g (30.0 mmol) およびシアノアセトヒドラジド3.82 g (38.5 mmol) を加え2時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物に水を加え不溶物をろ取して標記化合物の粗晶を得た。これをフラッシュシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (30:1 → 20:1 v/v) 溶出部より標記化合物1.06 g (19%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 186 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ : 4.22 (2H, s), 7.48-7.60 (1H, m), 7.93-8.15 (2H, m), 8.66-8.75 (1H, m).

【0319】

【参考例85】

5-(3-ピリジル)-2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (1-85)

0.554規定水酸化ナトリウムメタノール溶液 (77 ml) にニコチンイミド酸エチル二塩酸塩 (1-63) 6.69 g (30.0 mmol) およびシアノアセトヒドラジド3.82 g (38.5 mmol) を加え2時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物に水を加え不溶物をろ取して標記化合物の粗晶を得た。これをフラッシュシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (30:1 v/v) 溶出部より標記化合物2.24 g (40%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 186 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ : 4.29 (2H, s), 7.47-7.65 (1H, m), 8.25-8.40 (1H, m), 8.58-8.78 (1H, m), 9.10-9.26 (1H, m).

【0320】

【参考例86】

5-(4-ピリジル)-2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (1-86)

0.554規定水酸化ナトリウムメタノール溶液 (77 ml) にイソニコチンイミド酸エチル二塩酸塩 (1-64) 6.69 g (30.0 mmol) およびシアノアセトヒドラジド3.82 g (38.5 mmol) を加え2.5時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物に水を加え不溶物をろ取して標記化合物の粗晶を得た。これをフラッシュシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (30:1 → 20:1 v/v) 溶出部より標記化合物1.86 g (34%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 186 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ : 4.31 (2H, s), 7.86-7.93 (1H, m), 8.67-8.77 (2H, m).

【0321】

【参考例87】

5-シアノメチル-3-メトキシメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-87)

水酸化ナトリウム5.13 g (0.122 mol) のメタノール (220 ml) 溶液に2-メトキシアセトイミド酸メチル 塩酸塩 (1-65) 17.0 g (0.122 mol) およびシアノアセトヒドラジド12.4 g (0.125 mol) を加え2.5時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物にクロロホルムを加え不溶物をろ去した。ろ液の溶媒を留去し得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (200:3 → 50:1 v/v) 溶出部より標記化合物14.3 g (77%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 153 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 3.52 (3H, s), 3.88 (2H, s), 4.67 (2H, s), 11.18 (1H, brs).

【0322】

【参考例88】

5-(1-ヒドロキシ-1-メチルエチル)-2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (1-88)

0.554規定水酸化ナトリウムメタノール溶液 (54.2 ml) に2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (1-66) 4.61 g (30.0 mmol) およびシアノアセトヒドラジド3.82 g (30.9 mmol) を加え2.5時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物に水を加え不溶物をろ取して標記化合物の粗晶を得た。これをフラッシュシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (30:1 → 10:1 v/v) 溶出部より標記化合物4.10 g (82%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 167 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CD₃OD) δ: 1.56 (6H, s), 3.96 (2H, s).

【0323】

【参考例89】

3-(2-ベンジルオキシエチル)-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-89)

水酸化ナトリウム1.83 g (43.5 mmol) のメタノール (80 ml) 溶液に氷冷下、3-ベンジルオキシプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (1-68) 10.0 g (43.5 mmol) およびシアノアセトヒドラジド4.44 g (44.8 mmol) を加え2時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (1:0 → 100:1 → 50:1 v/v) 溶出部より標記化合物9.39 g (89%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 243 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 3.08 (2H, t, J = 5.7 Hz), 3.79 (2H, t, J = 5.7 Hz), 3.81 (2H, s), 4.55 (2H, s), 7.26-7.40 (5H, m), 11.50 (1H, brs).

【0324】

【参考例90】

2-(5-シアノメチル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-2-メチルプロピオン酸エチルエステルと2-(5-シアノメチル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-2-メチルプロピオン酸メチルエステルの混合物 (1-90)

水酸化ナトリウム0.91 g (38.0 mmol) のメタノール (75 ml) 溶液に2-エトキシカルボニドイル-2-メチルプロピオン酸エチルエステル塩酸塩と2-エトキシカルボニドイル-2-メチルプロピオン酸メチルエステル塩酸塩の混合物 (1-71) 8.0 g およびシアノアセトヒドラジド3.96 g (40.0 mmol) を加え2.5時間加熱還流した。冷却後、不溶物をろ去後ろ液を減圧下濃縮し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付した。クロロホルム-メタノール (75:1 v/v) 溶出部より標記化合物1.32 g を無色結晶として得た。これはこのまま次の反応に用いた。

【0325】

【参考例91】

5-(2-ベンジルオキシ-1,1-ジメチル-エチル)-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (1-91)

水酸化ナトリウム2.30 g (57.0 mmol) のメタノール (114 ml) 溶液に3-ベンジルオキシ-2,2-ジメチルプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (1-74) 14.0 g (54.3 mmol) およびシアノアセトヒドラジド5.90 g (59.0 mmol) を加え3時間加熱還流した。冷却後、不溶物をろ去後ろ液を減圧下濃縮し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (40:1 v/v) 溶出部より標記化合物10.0 g (68%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 271 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.39 (6H, s), 3.53 (2H, s), 3.82 (2H, s), 4.59 (2H, s), 7.29-7.41 (5H, m), 11.23 (1H, brs).

【0326】

【参考例92】

{5-[2-(4-フルオロベンジルオキシ)-1,1-ジメチル-エチル]-4H-[1,2,4]トリアゾロ-3-イル}-アセトニトリル (1-92)

水酸化ナトリウム 170 mg (4.30 mmol) のメタノール (10 ml) 溶液に 3-(4-フルオロフェニル)-2,2-ジメチルプロピオンイミド酸メチル 塩酸塩 (1-76) 1.07 g (3.90 mmol) およびシアノアセトヒドラジド 450 mg (4.50 mmol) を加え 3.5 時間加熱還流した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物を水に溶かしてクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物 406 mg (36%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 271 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.38 (6H, s), 3.51 (2H, s), 3.83 (2H, s), 4.56 (2H, s), 7.06 (2H, m), 7.29 (2H, m), 11.11 (1H, brs).

【0327】

【参考例 93】

7-メチル-5-オキソ-2,6-ジフェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-93)

5-シアノメチル-3-フェニル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-53) 1.00 g (5.43 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 1.18 g (5.72 mmol) および酢酸アンモニウム 879 mg (11.4 mmol) の混合物を 150℃ にて 3 時間加熱した。冷却後、水を加え析出した結晶をろ取し、さらにアセトニトリルで洗浄した。これをろ取、乾燥して標記化合物 885 mg (50%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 327 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ : 2.13 (3H, s), 7.13 (1H, brs), 7.24 (3H, m), 7.36 (2H, m), 7.46 (3H, m), 8.15 (2H, m).

【0328】

【参考例 94】

2,7-ジメチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-94)

5-シアノメチル-3-メチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-77) 730 mg (6.00 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 1.28 g (6.20 mmol) および酢酸アンモニウム 960 mg (12.4 mmol) の混合物を 150℃ にて 2.5 時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (5:1 v/v) にて溶出し、溶媒留去後得られた残留物にアセトニトリルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 183 mg (12%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 265 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ : 2.16 (3H, s), 2.51 (3H, s), 7.23 (2H, m), 7.38 (3H, m).

【0329】

【参考例 95】

2-エチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-95)

(5-エチル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-アセトニトリル (1-78) 820 mg (6.00 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 1.28 g (6.20 mmol) および酢酸アンモニウム 960 mg (12.4 mmol) の混合物を 150℃ にて 4.5 時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (25:1 v/v) にて溶出し、溶媒留去後得られた残留物にアセトニトリルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 350 mg (21%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 279 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ : 1.26 (3H, t, J = 7.5 Hz), 2.13 (3H, s), 2.76 (2H, q, J = 7.5 Hz), 7.20 (2H, m), 7.29 (1H, m), 7.39 (2H, m).

【0330】

【参考例96】

2-シクロプロピル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-96)

(5-シクロプロピル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-アセトニトリル (1-79) 890 mg (6.00 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 1.28 g (6.20 mmol) および酢酸アンモニウム 960 mg (12.4 mmol) の混合物を150℃にて5時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (25:1 v/v) にて溶出し、溶媒留去後得られた残留物にアセトニトリルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 366 mg (21%) を黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 291 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 1.01 (4H, m), 2.11 (3H, s), 2.17 (1H, m), 7.19 (2H, m), 7.29 (1H, m), 7.38 (2H, m).

【0331】

【参考例97】

7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-2-イソプロピル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-97)

(5-イソプロピル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-アセトニトリル (1-80) 900 mg (6.00 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 1.28 g (6.20 mmol) および酢酸アンモニウム 960 mg (12.4 mmol) の混合物を150℃にて6時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (25:1 v/v) にて溶出し、溶媒留去後得られた残留物にアセトニトリルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 780 mg (45%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 293 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 1.33 (6H, d, J = 6.9 Hz), 1.13 (3H, s), 3.15 (1H, sep, J = 6.9 Hz), 7.19 (2H, m), 7.28-7.42 (3H, m).

【0332】

【参考例98】

2-n-ブチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-98)

3-n-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-81) 1.00 g (6.09 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 1.32 g (6.39 mmol) および酢酸アンモニウム 986 mg (12.8 mmol) の混合物を150℃にて2.5時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (98:2 v/v) にて溶出し、溶媒留去後得られた残留物にアセトニトリルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 311 mg (17%) を淡黄色固体として得た (さらに母液より 148 mg (7.9%) 得られた)。

MS (FAB) m/z: 307 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 0.92 (3H, t, J = 7.5 Hz), 1.36 (2H, sex, J = 7.5 Hz), 1.74 (2H, quint, J = 7.5 Hz), 2.14 (3H, s), 2.81 (2H, t, J = 7.5 Hz), 7.19-7.22 (2H, m), 7.30-7.43 (3H, m).

【0333】

【参考例99】

2-イソブチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-99)

(5-イソブチル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-アセトニトリル (1-82) 990 mg (6.00 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 1.28 g (6.20 mmol) および酢酸アンモニウム 960 mg (12.4 mmol) の混合物を150℃にて6時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (98:2 v/v) にて溶出し、溶媒留去後得られた残留物にアセトニトリルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 363 mg (20%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 307 (M+1)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) δ : 0.96 (6H, t, $J = 6.6$ Hz), 2.14 (3H, s), 2.16 (1H, m), 2.69 (2H, d, $J = 7.2$ Hz), 7.19-7.29 (2H, m), 7.30-7.43 (3H, m).

【0334】

【参考例100】

2-tert-ブチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-100)

3-tert-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-83) 1.00 g (6.09 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 1.32 g (6.39 mmol) および酢酸アンモニウム 986 mg (12.8 mmol) の混合物を 150°C にて 3.5 時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:0 \rightarrow 99:1 \rightarrow 95:5 v/v) にて溶出し、溶媒留去後得られた残留物にアセトニトリルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 621 mg (33%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 307 ($M+1$) $^+$.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.38 (9H, s), 2.24 (3H, s), 7.26-7.43 (5H, m).

【0335】

【参考例101】

7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-2-(3-ピリジル)-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-101)

[5-(3-ピリジル)-2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (1-85) 1.00 g (5.40 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 1.23 g (5.96 mmol) および酢酸アンモニウム 866 mg (11.2 mmol) の混合物を 150°C にて 2 時間加熱した。冷却後、水を加え固形物を粉砕した後デカンテーションし、次いでアセトニトリルおよびエタノールで固体を洗浄した。得られた個体をろ取、乾燥して標記化合物 883 mg (50%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 328 ($M+1$) $^+$.

$^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) δ : 2.14 (3H, s), 7.20-7.42 (5H, m), 7.47-7.55 (1H, m), 8.43-8.49 (1H, m), 8.61-8.67 (1H, s), 9.28-9.32- (1H, m).

【0336】

【参考例102】

7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-2-(4-ピリジル)-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-102)

[5-(4-ピリジル)-2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (1-86) 800 mg (4.32 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 927 mg (4.49 mmol) および酢酸アンモニウム 693 mg (8.99 mmol) の混合物を 150°C にて 3 時間加熱した。冷却後、水を加え固形物を粉砕した後デカンテーションし、次いでアセトニトリルおよびエタノールで固体を洗浄した。得られた個体をろ取、乾燥して標記化合物 971 mg (69%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 328 ($M+1$) $^+$.

$^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) δ : 2.14 (3H, s), 7.10-7.43 (5H, m), 8.03-8.12 (2H, m), 8.15-8.64 (2H, m).

【0337】

【参考例103】

2-メトキシメチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-103)

5-シアノメチル-3-メトキシメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-87) 7.00 g (46.0 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 9.96 g (48.3 mmol) および酢酸アンモニウム 7.45 g (96.6 mmol) の混合物を 150°C にて 4 時間加熱した。冷却後、水を加えた後トルエン共沸し析出した固体をクロロホルムで洗浄した。得られた個体をろ取、乾燥して標記化合物 4.80 g (35%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 295 ($M+1$) $^+$.

$^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) δ : 2.22 (3H, s), 3.43 (3H, s), 4.59 (2H, s), 7.23-7.43 (5H, m).

【0338】

【参考例104】

2-(1-ヒドロキシ-1-メチルエチル)-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-104)

[5-(1-ヒドロキシ-1-メチルエチル)-2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (1-88) 2.00 g (12.0 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 2.72 g (13.2 mmol) および酢酸アンモニウム 2.07 g (26.5 mmol) の混合物を150℃にて3.5時間加熱した。冷却後、水を加えた後1規定塩酸にて酸性とし、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水および水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥した。濃縮し析出した固体をろ取、乾燥して標記化合物 389 mg (11%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 309 ($M+1$)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) δ : 1.59 (6H, s), 2.14 (3H, s), 7.16-7.24 (2H, m), 7.28-7.46 (3H, m).

【0339】

【参考例105】

2-(2-ベンジルオキシエチル)-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-105)

3-(2-ベンジルオキシエチル)-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-89) 5.00 g (20.6 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 4.47 g (21.7 mmol) および酢酸アンモニウム 3.34 g (43.3 mmol) の混合物を150℃にて4.5時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:0 \rightarrow 50:1 \rightarrow 25:1 v/v) にて溶出し、溶媒留去後得られた残留物にアセトニトリルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 2.04 g (26%) を淡黄土色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 385 ($M+1$)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$) δ : 2.23 (3H, s), 3.05 (2H, t, $J = 6.5$ Hz), 3.81 (2H, t, $J = 6.5$ Hz), 4.48 (2H, s), 7.20-7.45 (10H, m).

【0340】

【参考例106】

2-(8-シアノ-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-2-メチルプロピオン酸エチルエステルと2-(8-シアノ-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-2-メチルプロピオン酸メチルエステルの混合物 (1-106)

2-(5-シアノメチル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-2-メチルプロピオン酸エチルエステルと2-(5-シアノメチル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-2-メチルプロピオン酸メチルエステルの混合物 (1-90) 1.07 g (5.00 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 1.07 g (5.20 mmol) および酢酸アンモニウム 800 mg (10.4 mmol) の混合物を150℃にて4時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) にて溶出し、溶媒留去後得られた残留物にアセトニトリル-エーテルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 202 mg を無色結晶として得た。これはこのまま次の反応に用いた。

【0341】

【参考例107】

2-(2-ベンジルオキシ-1,1-ジメチルエチル)-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-107)

[5-(2-ベンジルオキシ-1,1-ジメチルエチル)-4H-[1,2,4]トリアゾロ-3-イル]-アセトニトリル (1-91) 5.00 g (18.5 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 3.90 g (18.8 mmol) および酢酸アンモニウム 2.90 g (37.6 mmol) の混合物を150℃にて6.5時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) にて溶出し、溶媒留去後得られた残留物にアセトニトリルを加え析出した

結晶をろ取、乾燥して標記化合物2.00 g (26%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 413 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.35 (6H, s), 2.21 (3H, s), 3.56 (2H, s), 4.42 (2H, s), 7.18-7.42 (10H, m).

【0342】

【参考例108】

2-[2-(4-フルオロベンジルオキシ)-1,1-ジメチルエチル]-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-108)

{5-[2-(4-フルオロベンジルオキシ)-1,1-ジメチル-エチル]-4H-[1,2,4]トリアゾロ-3-イル}-アセトニトリル (1-92) 380 mg (1.30 mmol)、2-フェニルアセト酢酸エチルエステル 290 mg (1.40 mmol) および酢酸アンモニウム 220 mg (2.80 mmol) の混合物を150℃にて6時間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) にて溶出して粗製の標記化合物369 mgを黄色油状物として得た。

MS (FAB) m/z : 431 (M+1)⁺.

【0343】

【参考例109】

5-クロロ-7-メチル-2,6-ジフェニル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-109)

7-メチル-5-オキソ-2,6-ジフェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-93) 813 mg (2.49 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中2.5時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物815 mg (95%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 345 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.45 (3H, s), 7.26 (2H, m), 7.54 (6H, m), 8.39 (2H, m).

【0344】

【参考例110】

5-クロロ-2,7-ジメチル-6-フェニル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-110)

2,7-ジメチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-94) 120 mg (0.45 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中2時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物120 mg (93%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 283 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.43 (3H, s), 2.71 (3H, s), 7.24 (2H, m), 7.55 (3H, m).

【0345】

【参考例111】

5-クロロ-2-エチル-7-メチル-6-フェニル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-111)

2-エチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-95) 250 mg (0.90 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中2時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物257 mg (96%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 297 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.46 (3H, t, J = 7.5 Hz), 2.43 (3H, s), 3.05 (2H, q, J = 7.5 Hz), 7.23 (2H, m), 7.49-7.58 (3H, m).

【0346】

【参考例112】

5-クロロ-2-シクロプロピル-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-112)

2-シクロプロピル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-96) 250 mg (0.86 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中3時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物205 mg (77%) を淡褐色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 309 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.12-1.19 (2H, m), 1.24-1.29 (2H, m), 2.31 (1H, m), 2.41 (3H, s), 7.20-7.26 (2H, m), 7.48-7.58 (3H, m).

【0347】

【参考例113】

5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-2-*i*-プロピル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-113)

7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-2-*i*-プロピル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-97) 500 mg (1.70 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中1時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物478 mg (91%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 311 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.48 (6H, d, J = 6.9 Hz), 2.42 (3H, s), 3.37 (1H, sep, J = 6.9 Hz), 7.23 (2H, m), 7.48-7.59 (3H, m).

【0348】

【参考例114】

2-*n*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-114)

2-*n*-ブチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-98) 300 mg (0.98 mmol) を塩化ホスホリル (2 ml) 中1.5時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物319 mg (100%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 325 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.97 (3H, t, J = 7.4 Hz), 1.46 (2H, sex, J = 7.4 Hz), 1.83-1.93 (2H, m), 2.43 (3H, s), 3.01 (2H, t, J = 7.8 Hz), 7.22-7.26 (2H, m), 7.50-7.58 (3H, m).

【0349】

【参考例115】

2-*i*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-115)

2-*i*-ブチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-99) 250 mg (0.82 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中3時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物271 mg (100%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 325 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.03 (6H, d, J = 6.9 Hz), 2.33 (3H, s), 2.89 (2H, d, J = 7.2 Hz), 7.26 (2H, m), 7.54 (3H, m).

【0350】

【参考例116】

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-116)

2-tert-ブチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-100) 676 mg (2.21 mmol) を塩化ホスホリル (4 ml) 中2.5時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物716 mg (100%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 325 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.52 (9H, s), 2.41 (3H, s), 7.20-7.24 (2H, m), 7.50-7.57 (3H, m).

【0351】

【参考例117】

5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-2-(3-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-117)

7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-2-(3-ピリジル)-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-101) 750 mg (2.29 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中2.5時間加熱還流した (途中、塩化ホスホリル (5 ml) を追加した)。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に飽和重曹水を加えてpH 7としてクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去して標記化合物599 mg (76%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 346 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.40 (3H, s), 7.16-7.24 (2H, m), 7.35-7.43 (1H, m), 7.45-7.56 (3H, m), 8.55-8.61 (1H, m), 8.66-8.70 (1H, m), 9.49-9.53 (1H, m).

【0352】

【参考例118】

5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-2-(4-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-118)

7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-2-(4-ピリジル)-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-102) 900 mg (2.75 mmol) を塩化ホスホリル (10 ml) 中3.5時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に飽和重曹水を加えてpH 8としてクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去して粗製の標記化合物1.00 gを得た。これはこのまま次の反応に用いた。

MS (FAB) m/z : 346 (M+1)⁺.

【0353】

【参考例119】

5-クロロ-2-メトキシメチル-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-119)

2-メトキシメチル-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-103) 4.98 g (16.9 mmol) を塩化ホスホリル (50 ml) 中2時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物4.87 g (92%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 313 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.45 (3H, s), 3.57 (3H, s), 4.83 (2H, s), 7.22-7.30 (2H, m), 7.49-7.60 (3H, m).

【0354】

【参考例120】

5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-2-*i*-プロペニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-120)

2-(1-ヒドロキシ-1-メチルエチル)-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-104) 230 mg (0.75 mmol) を塩化ホスホリル (4 ml) 中2時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物 224 mg (97%) を淡褐色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 309 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.32 (3H, s), 2.43 (3H, s), 5.56 (1H, m), 6.44 (1H, s), 7.21-7.30 (2H, m), 7.53-7.62 (3H, m).

【0355】

【参考例121, 122】

2-(2-ベンジルオキシエチル)-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-121) および 5-クロロ-2-(2-クロロエチル)-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-122)

2-(2-ベンジルオキシエチル)-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-105) 1.98 g (5.15 mmol) を塩化ホスホリル (10 ml) 中2時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し n-ヘキサン-酢酸エチル (9:2 v/v) にて溶出し、標記化合物 98 mg (6%: I-122)、1.19 g (57%: I-121) をそれぞれ淡黄色固体として得た。

I-121:

MS (FAB) m/z : 403 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.42 (3H, s), 3.33 (2H, t, J = 6.8 Hz), 4.03 (2H, t, J = 6.8 Hz), 4.59 (2H, s), 7.21-7.37 (7H, m), 7.49-7.58 (3H, m).

I-122:

MS (FAB) m/z : 331 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.44 (3H, s), 3.48 (2H, t, J = 6.9 Hz), 4.06 (2H, t, J = 6.9 Hz), 7.21-7.27 (2H, m), 7.50-7.58 (3H, m).

【0356】

【参考例123】

2-[5-クロロ-8-シアノ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル]-2-メチルプロピオン酸メチルエステル (I-123)

2-(8-シアノ-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-2-メチルプロピオン酸エチルエステルと 2-(8-シアノ-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-2-メチルプロピオン酸メチルエステルの混合物 (I-106) 177 mg (0.50 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中3時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し n-ヘキサン-酢酸エチル (9:1 v/v) にて溶出し、標記化合物 87 mg を無色結晶として得た (標記化合物およびそのエチルエステルとの混合物も 91 mg (I-123-1) 得た)。

MS (FAB) m/z : 369 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.78 (6H, s), 2.42 (3H, s), 3.72 (3H, s), 7.21-7.24 (2H, m), 7.51-7.57 (3H, m).

【0357】

【参考例124】

2-(2-ベンジルオキシ-1,1-ジメチルエチル)-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-124)

2-(2-ベンジルオキシ-1,1-ジメチルエチル)-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-107) 1.80 g (4.40 mmol)

) を塩化ホスホリル (10 ml) 中2.5時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付しn-ヘキサン-酢酸エチル (4:1 v/v) にて溶出し、標記化合物1.76 g (93%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 431 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.53 (6H, s), 2.41 (3H, s), 3.80 (2H, s), 4.56 (2H, s), 7.20-7.32 (7H, m), 7.50-7.56 (3H, m).

【0358】

【参考例125】

5-クロロ-2-[2-(4-フルオロベンジルオキシ)-1,1-ジメチルエチル]-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-125)

2-[2-(4-フルオロベンジルオキシ)-1,1-ジメチルエチル]-7-メチル-5-オキソ-6-フェニル-1,5-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-108) 369 mg を塩化ホスホリル (10 ml) 中2時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付しn-ヘキサン-酢酸エチル (10:1 v/v) にて溶出し、標記化合物216 mg (37%、I-92からの収率) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 449 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.52 (6H, s), 2.41 (3H, s), 3.79 (2H, s), 4.51 (2H, s), 6.94-7.00 (2H, m), 7.21-7.29 (4H, m), 7.50-7.57 (3H, m).

【0359】

【実施例18】

7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-2,6-ジフェニル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 18)

5-クロロ-7-メチル-2,6-ジフェニル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-109) 500 mg (1.45 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン202 μl (1.60 mmol) およびトリエチルアミン404 μl (2.90 mmol) を加え80-90℃にて4時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (99:1 v/v) 溶出部より標記化合物559 mg (91%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 423 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 1.60-1.74 (1H, m), 1.95-2.08 (1H, m), 2.18 (6H, s), 2.23 (4H, s), 2.59-2.70 (1H, m), 3.31 (1H, t, J = 9.3 Hz), 3.40 (1H, m), 3.52 (1H, dd, J = 6.9, 9.9 Hz), 3.61-3.70 (1H, m), 7.14-7.19 (1H, m), 7.26-7.30 (1H, m), 7.40-7.53 (6H, m), 8.30-8.37 (2H, m).

IR (KBr): 2962, 2766, 2218, 1610, 1508, 1442 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₆H₂₆N₆ · 0.25H₂Oとして

理論値: C, 73.13%; H, 6.25%; N, 19.68%

実測値: C, 72.99%; H, 6.11%; N, 19.74%.

【0360】

【実施例19】

2,7-ジメチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 19)

5-クロロ-2,7-ジメチル-6-フェニル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-110) 94 mg (0.33 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン51 μl (0.40 mmol) およびトリエチルアミン112 μl (0.80 mmol)

を加え80-90℃にて5.5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物49 mg (41%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 361 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.63 (1H, quint, J = 9.9 Hz), 1.74 (1H, brs), 1.98 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.26 (3H, s), 2.60 (3H, s), 3.16 (1H, t, J = 9.6 Hz), 3.31 (1H, dt, J = 2.4, 9.3 Hz), 3.42 (1H, dd, J = 6.9, 9.9 Hz), 3.62 (1H, dd, J = 7.2, 10.2 Hz), 7.13 (1H, d, J = 6.6 Hz), 7.25 (1H, m), 7.44 (3H, m).

IR (KBr): 2768, 2216, 1607, 1541, 1510, 1485, 1351 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₁H₂₄N₆として

理論値: C, 69.97%; H, 6.71%; N, 23.32%.

実測値: C, 69.70%; H, 6.73%; N, 23.02%.

【0361】

【実施例20】

2-エチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル [1,2,4]トリアゾロ [1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 20)

5-クロロ-2-エチル-7-メチル-6-フェニル [1,2,4]トリアゾロ [1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-111) 180 mg (0.61 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン120 μ l (0.93 mmol) およびトリエチルアミン240 μ l (1.70 mmol) を加え80-90℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物224 mg (98%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 375 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.42 (3H, t, J = 7.5 Hz), 1.63 (1H, m), 1.98 (1H, m), 2.15 (6H, s), 2.26 (3H, s), 2.61 (1H, m), 2.95 (2H, q, J = 7.5 Hz), 3.21 (1H, dd, J = 8.7, 9.9 Hz), 3.32 (1H, m), 3.45 (1H, dd, J = 7.2, 9.6 Hz), 3.60 (1H, dt, J = 6.9, 10.2 Hz), 7.13 (1H, m), 7.24 (1H, m), 7.34-7.49 (3H, m).

IR (KBr): 2770, 2211, 1603, 1541, 1508, 1480, 1358, 1268 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₂H₂₆N₆ · 0.25H₂Oとして

理論値: C, 69.72%; H, 7.05%; N, 22.17%

実測値: C, 70.15%; H, 6.99%; N, 21.97%.

【0362】

【実施例21】

2-シクロプロピル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル [1,2,4]トリアゾロ [1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 21)

5-クロロ-2-シクロプロピル-7-メチル-6-フェニル [1,2,4]トリアゾロ [1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-112) 150 mg (0.49 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン100 μ l (0.79 mmol) およびトリエチルアミン200 μ l (1.40 mmol) を加え80-90℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物188 mg (98%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 387 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.03-1.09 (2H, m), 1.14-1.19 (2H, m), 1.58-1.68 (1H, m), 1.96 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.22 (1H, m), 2.24 (3H, s), 2.60 (1H, m), 3.17 (1H, dd,

J = 8.7, 9.9 Hz), 3.29 (1H, m), 3.42 (1H, dd, J = 7.2, 9.9 Hz), 3.57 (1H, dt, J = 6.9, 10.2 Hz), 7.12 (1H, m), 7.24 (1H, m), 7.38-7.49 (3H, m).

IR (KBr): 2771, 2210, 1606, 1542, 1508, 1477, 1360, 1270 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{N}_6 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 69.85%; H, 6.88%; N, 21.25%

実測値: C, 69.92%; H, 6.68%; N, 21.19%.

【0363】

【実施例22】

7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-2-*i*-プロピル [1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (# 22)

5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-2-*i*-プロピル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-113) 311 mg (1.00 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン190 μl (1.50 mmol) およびトリエチルアミン420 μl (3.00 mmol) を加え80-90℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物360 mg (93%) を黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 389 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl_3) δ : 1.44 (6H, d, J = 6.9 Hz), 1.63 (1H, m), 1.98 (1H, m), 2.15 (6H, s), 2.25 (3H, s), 2.63 (1H, m), 3.21-3.36 (3H, m), 3.48 (1H, dd, J = 6.9, 9.9 Hz), 3.57 (1H, dt, J = 6.9, 10.2 Hz), 7.13 (1H, m), 7.24 (1H, m), 7.38-7.49 (3H, m).

IR (KBr): 2770, 2213, 1607, 1539, 1512, 1481, 1359 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{23}\text{H}_{28}\text{N}_6$ として

理論値: C, 71.10%; H, 7.26%; N, 21.63%

実測値: C, 71.01%; H, 7.25%; N, 21.63%.

【0364】

【実施例23】

2-*n*-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル [1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (# 23)

2-*n*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-114) 250 mg (0.77 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (2.5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン107 μl (0.85 mmol) およびトリエチルアミン215 μl (1.54 mmol) を加え80-90℃にて3.5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物277 mg (89%) を黄土色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 403 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl_3) δ : 0.97 (3H, t, J = 7.4 Hz), 1.46 (2H, sex, J = 7.4 Hz), 1.56-1.69 (1H, m), 1.80-1.90 (2H, m), 1.93-2.02 (1H, m), 2.15 (6H, s), 2.25 (3H, s), 2.55-2.66 (1H, m), 2.92 (2H, t, J = 7.8 Hz), 3.21 (1H, t, J = 9.3 Hz), 3.28-3.35 (1H, m), 3.45 (1H, dd, J = 6.6, 9.9 Hz), 3.54-3.63 (1H, m), 7.11-7.15 (1H, m), 7.23-7.26 (1H, m), 7.40-7.60 (3H, m).

IR (KBr): 2956, 2771, 2209, 1610, 1508 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{24}\text{H}_{30}\text{N}_6$ として

理論値: C, 71.61%; H, 7.51%; N, 20.88%

実測値: C, 71.49%; H, 7.48%; N, 20.70%.

【0365】

【実施例24】

2-*i*-ブチル-7-メチル-5-[(3*S*)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル [1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (# 24)

2-*i*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-115) 200 mg (0.62 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に (3*S*)-ジメチルアミノピロリジン 120 μ l (0.93 mmol) およびトリエチルアミン 240 μ l (1.70 mmol) を加え80-90℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物 226 mg (91%) を黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 403 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.02 (6H, d, J = 6.6 Hz), 1.63 (1H, m), 1.97 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.26 (1H, m), 2.61 (1H, m), 2.79 (2H, d, J = 7.2 Hz), 3.22 (1H, dd, J = 8.7, 9.9 Hz), 3.33 (1H, m), 3.45 (1H, dd, J = 6.6, 9.9 Hz), 3.58 (1H, dt, J = 6.9, 10.2 Hz), 7.14 (1H, m), 7.25 (1H, m), 7.39-7.50 (3H, m).

IR (KBr): 2766, 2211, 1602, 1537, 1504, 1474, 1361 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₄H₃₀N₆として

理論値: C, 71.61%; H, 7.51%; N, 20.88%

実測値: C, 71.68%; H, 7.67%; N, 20.43%.

【0366】

【実施例25】

2-*tert*-ブチル-7-メチル-5-[(3*S*)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル [1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (# 25)

2-*tert*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-116) 400 mg (1.23 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (4 ml) 溶液に (3*S*)-ジメチルアミノピロリジン 172 μ l (1.35 mmol) およびトリエチルアミン 343 μ l (2.46 mmol) を加え80-90℃にて2.5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (99:1 v/v) 溶出部より標記化合物 479 mg (99%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 403 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.47 (9H, s), 1.56-1.69 (1H, m), 1.92-2.00 (1H, m), 2.16 (6H, s), 2.24 (3H, s), 2.57-2.67 (1H, m), 3.23-3.36 (2H, m), 3.50-3.59 (2H, m), 7.11-7.15 (1H, m), 7.22-7.26 (1H, m), 7.38-7.49 (3H, m).

IR (KBr): 2964, 2772, 2210, 1606, 1508 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₄H₃₀N₆として

理論値: C, 71.61%; H, 7.51%; N, 20.88%

実測値: C, 71.44%; H, 7.49%; N, 21.01%.

【0367】

【実施例26】

7-メチル-5-[(3*S*)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-2-(3-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (# 26)

5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-2-(3-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-117) 500 mg (1.45 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (10 ml) 溶液に (3*S*)-ジメチルアミノピロリジン 199 mg (1.74 mmol) およびトリエチルアミン 385 μ l (2.90 mmol) を加え80-90℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロ

マトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 → 97:3 v/v) 溶出部より標記化合物 532 mg (87%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 424 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.59-1.82 (2H, m), 1.94-2.09 (1H, m), 2.18 (6H, s), 2.30 (3H, s), 2.59-2.73 (1H, m), 3.24-3.35 (1H, m), 3.37-3.48 (1H, m), 3.49-3.58 (1H, m), 3.61-3.73 (1H, m), 7.13-7.22 (1H, m), 7.24-7.33 (1H, m), 7.38-7.55 (4H, m), 8.57-8.64 (1H, m), 8.68-8.76 (1H, m), 9.48-9.55 (1H, m).

IR (KBr): 2951, 2820, 2770, 2206, 1612, 1596, 1573, 1538, 1508, 1473 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₅H₂₅N₇ · 0.5H₂Oとして

理論値: C, 69.42%; H, 6.06%; N, 22.67%

実測値: C, 69.10%; H, 5.94%; N, 22.55%.

【0368】

【実施例27】

7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-2-(4-ピリジル)-[1, 2, 4]トリアゾロ[1, 5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 27)

5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-2-(4-ピリジル)-[1, 2, 4]トリアゾロ[1, 5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-118) 1.00 g のN,N-ジメチルホルムアミド (20 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 377 mg (3.30 mmol) およびトリエチルアミン 730 μ l (5.50 mmol) を加え80-90℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 → 97:3 v/v) 溶出部より標記化合物 300 mg (26%、I-102からの収率) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 424 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.60-1.77 (1H, m), 1.94-2.10 (1H, m), 2.19 (6H, s), 2.29 (3H, s), 2.57-2.72 (1H, m), 3.27-3.71 (4H, m), 7.10-7.22 (1H, m), 7.22-7.34 (1H, m), 7.40-7.58 (3H, m), 8.13-8.22 (2H, m), 8.71-8.81 (2H, m).

IR (KBr): 2982, 2950, 2815, 2770, 2214, 1610, 1532, 1511, 1470, 1450 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₅H₂₅N₇ · 0.25H₂Oとして

理論値: C, 70.15%; H, 6.00%; N, 22.91%

実測値: C, 70.15%; H, 5.84%; N, 22.93%.

【0369】

【実施例28】

2-メトキシメチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1, 2, 4]トリアゾロ[1, 5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 28)

5-クロロ-2-メトキシメチル-7-メチル-6-フェニル-[1, 2, 4]トリアゾロ[1, 5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-119) 2.00 g (6.39 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (20 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 893 μ l (7.03 mmol) およびトリエチルアミン 1.78 ml (12.8 mmol) を加え80-90℃にて2.5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (1:0 → 100:1 → 20:1 v/v) 溶出部より粗製の標記化合物 1.20 gを得た。これを再度、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (1:0 → 100:1 → 100:3 v/v) 溶出部より標記化合物 1.11 g (44%) を橙色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 391 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.56-1.69 (1H, m), 1.90-2.03 (1H, m), 2.13 (6H, s), 2.28 (3H, s), 2.54-2.65 (1H, m), 3.14 (1H, t, J = 9.3 Hz), 3.34-3.44 (2H, m), 3.56 (3H, s), 3.65-3.74 (1H, m), 4.74 (2H, s), 7.12-7.15 (1H, m), 7.23-7.27 (1H, m), 7.40-7.51 (3H, m).

IR (KBr): 2952, 2816, 2770, 2210, 1608, 1538, 1507, 1456, 1106 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{22}\text{H}_{26}\text{N}_6\text{O} \cdot 0.25\text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 66.90%; H, 6.76%; N, 21.28%

実測値: C, 67.09%; H, 6.67%; N, 21.26%.

【0370】

【実施例29】

2-ヒドロキシメチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 29)

2-メトキシメチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 28) 500 mg (1.28 mmol) のクロロホルム (5 ml) 溶液にヨードトリメチルシラン 1.82 ml (12.8 mmol) を加えた後、室温にて5.5時間攪拌した。反応液を2規定水酸化ナトリウム水溶液に注ぎ飽和食塩水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を1規定塩酸、2規定水酸化ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 \rightarrow 50:1 \rightarrow 25:1 v/v) 溶出部より標記化合物 246 mg (51%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 377 ($M+1$)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.60-1.73 (1H, m), 1.93-2.03 (1H, m), 2.15 (6H, s), 2.27 (3H, s), 2.55-2.65 (1H, m), 3.27 (1H, t, $J = 9.3$ Hz), 3.34-3.44 (2H, m), 3.53-3.62 (1H, m), 4.93 (2H, s), 7.12-7.15 (1H, m), 7.26-7.31 (1H, m), 7.40-7.51 (3H, m).

IR (KBr): 3350, 2972, 2869, 2773, 2218, 1610, 1540, 1507, 1487 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{N}_6\text{O} \cdot 0.25\text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 66.21%; H, 6.48%; N, 22.06%

実測値: C, 66.42%; H, 6.42%; N, 21.83%.

【0371】

【実施例30】

2-ベンジルオキシメチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 30)

2-ヒドロキシメチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 29) 150 mg (0.40 mmol) のテトラヒドロフラン (3 ml) 溶液に -15°C にて水素化ナトリウム 17.5 mg (60%, 0.44 mmol) を加え同温にて5分間攪拌した。次いでベンジルブロミド $56.9 \mu\text{l}$ (0.48 mmol) を加えた後、室温にて4時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物をクロロホルムに溶解後、有機層を水および飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (1:0 \rightarrow 100:1 v/v) 溶出部より標記化合物 75 mg (40%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 467 ($M+1$)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.56-1.70 (1H, m), 1.91-2.01 (1H, m), 2.13 (6H, s), 2.28 (3H, s), 2.54-2.67 (1H, m), 3.16 (1H, t, $J = 9.5$ Hz), 3.32-3.46 (2H, m), 3.61-3.71 (1H, m), 4.76 (2H, s), 4.83 (2H, s), 7.10-7.18 (1H, m), 7.23-7.51 (9H, m).

IR (KBr): 2944, 2866, 2214, 1609, 1508, 1093 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{28}\text{H}_{30}\text{N}_6\text{O}$ として

理論値: C, 72.08%; H, 6.48%; N, 18.01%

実測値: C, 72.02%; H, 6.54%; N, 17.52%.

【0372】

【実施例31】

2-フルオロメチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 31)

ジエチルアミノ硫黄トリフロリド 53.3 mg (0.33 mmol) のジクロロメタン (5 ml) 溶液

に -10°C にて2-ヒドロキシメチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 29) 100 mg (0.27 mmol) のジクロロメタン (5 ml) 溶液を滴下した。 -10°C にて1時間攪拌後、反応液に水 (1 ml) を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去し得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (10:1 v/v) 溶出部より標記化合物 25 mg (20%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 379 (M+1)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.57-1.71 (1H, m), 1.93-2.04 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.29 (3H, s), 2.55-2.67 (1H, m), 3.18 (1H, t, $J = 9.5$ Hz), 3.34-3.45 (2H, m), 3.61-3.71 (1H, m), 5.54 (1H, s), 5.70 (1H, s), 7.12-7.17 (1H, m), 7.23-7.30 (1H, m), 7.42-7.53 (3H, m).

IR (KBr): 2946, 2770, 2216, 1608, 1514, 1372 cm^{-1} .

【0373】

【実施例32】

2-シアノメチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 32)

2-ヒドロキシメチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 29) 186 mg (0.49 mmol) に4規定塩酸のジオキサン溶液 1.24 ml (4.94 mmol) を加え、さらにクロロホルムおよびメタノールを加えて溶解した。室温で10分間攪拌後減圧下濃縮し、得られた残留物に塩化チオニル 10 ml を加えて40分間加熱還流した。放冷後、減圧下乾固した。得られた残留物のエタノール (3 ml) 溶液を、シアン化カリウム 225 mg (3.46 mmol) の水 (0.5 ml) 溶液に氷冷下滴下し、同温にて1時間攪拌した後室温まで昇温し一晩攪拌した (途中、水 (0.5 ml) を加えた)。さらに 60°C にて6時間攪拌した (途中、シアン化カリウム 96.5 mg (1.48 mmol) を追加した)。水素化ナトリウム 17.5 mg (60%, 0.44 mmol) を加え同温にて5分間攪拌した。放冷後、反応液を減圧下留去し得られた残留物にクロロホルム-メタノールの混合溶液 (10:1 v/v) で洗浄し、ろ液を減圧下濃縮した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し (2回)、クロロホルム-メタノール (200:1 \rightarrow 100:1 \rightarrow 50:1 v/v) さらにクロロホルム-メタノール (100:1 v/v) で溶出し、次いでプレパラティブ TLC (クロロホルム-メタノール (10:1 v/v) にて展開) にて分離精製して標記化合物 66 mg (35%) を得た。

MS (FAB) m/z : 386 (M+1)⁺.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) δ : 1.50-1.64 (1H, m), 1.88-1.99 (1H, m), 2.07 (6H, s), 2.21 (3H, s), 2.49-2.60 (1H, m), 3.08 (1H, t, $J = 9.5$ Hz), 3.31-3.40 (2H, m), 3.59-3.69 (1H, m), 3.99 (2H, s), 7.05-7.09 (1H, m), 7.16-7.22 (1H, m), 7.34-7.45 (3H, m).

IR (KBr): 2950, 2769, 2210, 1607, 1517, 1365 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{22}\text{H}_{23}\text{N}_7 \cdot 0.25\text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 67.76%; H, 6.07%; N, 25.14%

実測値: C, 67.86%; H, 5.96%; N, 24.82%.

【0374】

【実施例33】

7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-2-*i*-プロペニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 33)

5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-2-*i*-プロペニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-120) 200 mg (0.648 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (3 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 81.4 mg (0.713 mmol) およびトリエチルアミン 173 μl (1.30 mmol) を加え $80-90^{\circ}\text{C}$ にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムク

ロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物 195 mg (78%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 387 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.55-1.71 (1H, m), 1.92-2.03 (1H, m), 2.15 (6H, s), 2.27 (6H, s), 2.56-2.67 (1H, m), 3.22-3.37 (2H, m), 3.47-3.61 (2H, m), 5.46 (1H, m), 6.36 (1H, m), 7.12-7.18 (1H, m), 7.23-7.30 (1H, m), 7.39-7.50 (3H, m).

IR (KBr): 3055, 2978, 2950, 2867, 2817, 2768, 2211, 1610, 1538, 1509, 1476 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₃H₂₆N₆ · 0.25H₂O

理論値: C, 70.65%; H, 6.83%; N, 21.49%

実測値: C, 71.01%; H, 6.74%; N, 21.73%.

【0375】

【実施例34】

2-(2-ベンジルオキシエチル)-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 34)

2-(2-ベンジルオキシエチル)-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-121) 250 mg (0.621 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (2.5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン 86.6 μ l (0.683 mmol) およびトリエチルアミン 173 μ l (1.24 mmol) を加え80-90℃にて1時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物 256 mg (86%) を黄土色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 481 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.54-1.68 (1H, m), 1.91-2.00 (1H, m), 2.13 (6H, s), 2.26 (3H, s), 2.54-2.64 (1H, m), 3.15 (1H, t, J = 9.5 Hz), 3.25 (2H, t, J = 6.9 Hz), 3.28-3.36 (1H, m), 3.42 (1H, dd, J = 6.6, 9.9 Hz), 3.57-3.64 (1H, m), 4.01 (2H, t, J = 6.9 Hz), 4.59 (2H, s), 7.10-7.15 (1H, m), 7.23-7.50 (9H, m).

IR (KBr): 2970, 2779, 2210, 1606, 1505 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₉H₃₂N₆O · 0.25H₂Oとして

理論値: C, 71.80%; H, 6.75%; N, 17.32%

実測値: C, 71.91%; H, 6.65%; N, 17.32%.

【0376】

【実施例35】

2-(2-ヒドロキシエチル)-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 35)

2-(2-ベンジルオキシエチル)-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 34) 900 mg (1.87 mmol) のメタノール (9 ml) とテトラヒドロフラン (9 ml) の混合溶液に4規定塩酸のジオキサン溶液 2.81 ml (11.2 mmol) を加え5分間攪拌後、減圧下濃縮した。得られた残留物をメタノール (8 ml) に溶解し、5%パラジウム炭素触媒 360 mgを加え、水素雰囲気 (4.5 atm) 下、室温にて1.25時間攪拌した。触媒をろ去後、減圧下溶媒を留去し、得られた残留物をクロロホルムに溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 → 50:1 → 20:1 v/v) 溶出部より標記化合物 383 mg (53%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 391 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.54-1.69 (1H, m), 1.91-2.02 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.27 (3H, s), 2.54-2.65 (1H, m), 3.12-3.19 (1H, m), 3.17 (2H, t, J = 5.6 Hz), 3.31-3.38 (1H, m), 3.43 (1H, dd, J = 6.9, 9.9 Hz), 3.57-3.66 (1H, m), 4.09 (2H, t, J = 5.6 Hz), 7.11-7.15 (1H, m), 7.23-7.26 (1H, m), 7.40-7.51 (3H, m).

IR (KBr): 3145, 2957, 2877, 2213, 1608, 1508 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{22}\text{H}_{26}\text{N}_6\text{O} \cdot 1.25\text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 63.98%; H, 6.96%; N, 20.35%

実測値: C, 64.06%; H, 6.46%; N, 20.13%.

【0377】

【実施例36】

2-(2-ベンジルオキシエチル)-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 36)

5-クロロ-2-(2-クロロエチル)-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-122) 36 mg (0.11 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (0.4 ml) 溶液に (3S)-ジメチルアミノピロリジン $15.2 \mu\text{l}$ (0.12 mmol) およびトリエチルアミン $30.3 \mu\text{l}$ (0.22 mmol) を加え80-90℃にて40分間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:3 v/v) 溶出部より標記化合物 26 mg (59%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 409 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl_3) δ : 1.54-1.70 (1H, m), 1.91-2.03 (1H, m), 2.15 (6H, s), 2.26 (3H, s), 2.55-2.66 (1H, m), 3.22 (1H, t, J = 9.5 Hz), 3.30-3.48 (2H, m), 3.39 (2H, t, J = 6.9 Hz), 3.28-3.36 (1H, m), 3.42 (1H, dd, J = 6.6, 9.9 Hz), 3.57-3.64 (1H, m), 4.01 (2H, t, J = 6.9 Hz), 3.53-3.64 (1H, m), 4.03 (2H, t, J = 6.9 Hz), 7.10-7.16 (1H, m), 7.23-7.26 (1H, m), 7.40-7.53 (3H, m).

IR (KBr): 2958, 2769, 2211, 1607, 1508, 1271, 702 cm^{-1} .

【0378】

【実施例37】

2-{5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-8-シアノ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル}-2-メチルプロピオン酸メチルエステル (# 37)

2-[5-クロロ-8-シアノ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル]-2-メチルプロピオン酸メチルエステル (1-123) 70 mg (0.19 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に (3S)-ジメチルアミノピロリジン $60 \mu\text{l}$ (0.45 mmol) を加え80-90℃にて5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物 76 mg (90%) を黄土色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 447 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl_3) δ : 1.60 (1H, m), 1.75 (6H, s), 1.97 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.24 (3H, s), 2.60 (1H, m), 3.20 (1H, dd, J = 8.7, 9.9 Hz), 3.36 (1H, m), 3.46-3.61 (2H, m), 3.72 (3H, s), 7.13 (1H, m), 7.24 (1H, m), 7.38-7.49 (3H, m).

IR (KBr): 2765, 2215, 1734, 1607, 1508, 1475, 1355, 1266, 1145 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{25}\text{H}_{30}\text{N}_6\text{O}_2$ として

理論値: C, 67.24%; H, 6.77%; N, 18.82%

実測値: C, 67.14%; H, 6.77%; N, 18.74%.

【0379】

【実施例38】

2-{5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-8-シアノ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル}-2-メチルプロピオン酸 (# 38)

2-[5-クロロ-8-シアノ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル]-2-メチルプロピオン酸のメチルエステルとエチルエステルの混合物 (1-123) 82 mg (0.22 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に (3S)-ジメチルアミノピロリジン

70 μ l (0.55 mmol) を加え80-90℃にて5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物のエステル体 (エチルエステルとメチルエステルの混合物) 108 mgを淡褐色結晶として得た。このうち90 mgをメタノール (4 ml) に溶解し水 (1 ml) を加えた後1時間加熱還流した。放冷後、室温にて水酸化ナトリウム54 mg (1.35 mmol) を加え同温で5日間攪拌した。減圧下濃縮後、得られた残留物を水に溶解しエーテルで洗浄し、ついで水層を1規定塩酸にてpH 7.0に調製しこれをクロロホルムで抽出した。硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物81 mgを無色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 433 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.58 (3H, s), 1.64 (3H, s), 1.74 (1H, m), 1.94 (1H, m), 2.20 (3H, s), 2.43 (6H, s), 2.97 (1H, m), 3.23 (2H, m), 3.50 (1H, dd, J = 7.2, 11.7 Hz), 4.00 (4H, brs), 4.09 (1H, dd, J = 6.0, 11.7 Hz), 7.21-7.25 (2H, m), 7.42-7.50 (3H, m).

IR (KBr): 3434, 2976, 2216, 1606, 1536, 1508, 1481, 1351, 1267 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₄H₂₈N₆O₂ · 1.25H₂Oとして

理論値: C, 63.35%; H, 6.76%; N, 18.47%

実測値: C, 63.58%; H, 6.42%; N, 18.24%.

【0380】

【実施例39】

2-(2-ベンジルオキシ-1,1-ジメチルエチル)-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 39)

2-(2-ベンジルオキシ-1,1-ジメチルエチル)-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-124) 1.60 g (3.70 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (15 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン600 μ l (4.6 mmol) およびトリエチルアミン1.3 ml (9.20 mmol) を加え80-90℃にて4時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物1.78 g (95%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 509 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.49 (6H, s), 1.61 (1H, m), 1.93 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.41 (3H, s), 2.60 (1H, m), 3.23 (1H, dd, J = 9.0, 9.9 Hz), 3.31 (1H, m), 3.48-3.59 (2H, m), 3.78 (2H, s), 4.55 (2H, m), 7.10-7.48 (10H, m).

IR (KBr): 2869, 2207, 1604, 1537, 1504, 1468, 1349, 1091 cm⁻¹.

元素分析値: C₃₁H₃₆N₆Oとして

理論値: C, 73.20%; H, 7.13%; N, 16.52%

実測値: C, 73.04%; H, 7.11%; N, 16.38%.

【0381】

【実施例40】

2-(2-ヒドロキシ-1,1-ジメチルエチル)-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 40)

2-(2-ベンジルオキシ-1,1-ジメチルエチル)-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 39) 1.40 g (2.80 mmol) をメタノール (14 ml) とテトラヒドロフラン (14 ml) の混合液に溶解し、4規定塩酸のジオキサン溶液4.1 ml (16.4 mmol) を加え室温にて10分間攪拌後、減圧下濃縮した (トルエン共沸を2回実施した)。得られた残留物をメタノール (30 ml) に溶解し、5%パラジウム炭素触媒560 mgを加え、水素雰囲気 (4.5 atm) 下、室温にて30分間攪拌した。触媒をろ去後、減圧下溶媒を留去し、得られた残留物をクロロホルムに

溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物1.0 g (87%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 419 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.44 (6H, s), 1.63 (1H, m), 1.98 (1H, m), 2.15 (6H, s), 2.25 (3H, s), 2.61 (1H, m), 3.22 (1H, dd, J = 8.7, 10.2 Hz), 3.35 (1H, m), 3.44-3.60 (2H, m), 3.76 (1H, s), 3.86 (1H, brs), 7.11-7.14 (1H, m), 7.23-7.26 (1H, m), 7.39-7.50 (3H, m).

IR (KBr): 3155, 2965, 2214, 1603, 1536, 1503, 1469, 1347, 1065 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₄H₃₀N₆O · 0.25H₂Oとして

理論値: C, 68.14%; H, 7.27%; N, 19.87%

実測値: C, 68.17%; H, 7.21%; N, 19.39%.

【0382】

【実施例41】

2-[2-(4-フルオロベンジルオキシ)-1,1-ジメチルエチル]-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#41)

5-クロロ-2-[2-(4-フルオロベンジルオキシ)-1,1-ジメチルエチル]-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-125) 170 mg (0.38 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン120 μ l (0.95 mmol) を加え70-80℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物170 mg (85%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 527 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.49 (6H, s), 1.61 (1H, m), 1.95 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.25 (3H, s), 2.59 (1H, m), 3.24 (1H, m), 3.32 (1H, m), 3.47-3.57 (2H, m), 3.76 (2H, s), 4.50 (2H, m), 6.95-7.02 (2H, m), 7.10-7.14 (1H, m), 7.21-7.29 (3H, m), 7.40-7.49 (3H, m).

IR (KBr): 2969, 2210, 1604, 1537, 1508, 1476, 1350, 1086 cm⁻¹.

元素分析値: C₃₁H₃₅FN₆Oとして

理論値: C, 70.70%; H, 6.70%; N, 15.96%

実測値: C, 70.54%; H, 6.70%; N, 15.87%.

【0383】

【参考例126】

2-(4-フルオロフェニル)-3-オキソブチロニトリル (1-126)

エタノール (130 ml) および金属ナトリウム5.68 g (0.247 mol) から調製したナトリウムエトキシドのエタノール溶液に4-フルオロフェニルアセトニトリル22.8 ml (0.19 mol) および酢酸エチル29.7 mlを加えた後6時間加熱還流した。放冷後、減圧下濃縮し得られた残留物に飽和食塩水およびクロロホルムを加え有機層を分取した。1規定塩酸および飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去した。得られた残留物にn-ヘキサン-イソプロピルエーテル (1:1 v/v) を加え析出した結晶をろ取して標記化合物9.83 g (29%) を淡黄色固体として得た。まろ液の溶媒を留去して得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム溶出部より標記化合物5.11 g (15%) を淡橙色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 178 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.29 (3H, s), 4.67 (1H, s), 7.10-7.17 (2H, m), 7.35-7.42 (2H, m).

【0384】

【参考例127】

2-(4-フルオロフェニル)-3-メトキシブト-2-エンニトリル (I-127)

2-(4-フルオロフェニル)-3-オキシブチロニトリル (I-126) 1.0 g (5.64 mmol) のオルト酢酸トリメチル (20 ml) 溶液を7時間加熱還流した (途中、オルト酢酸トリメチル (20 ml) 追加した)。放冷後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、*n*-ヘキサン-酢酸エチル (5:1 → 4:1 v/v) 溶出部より標記化合物809 mg (75%) を黄色油状物として得た。

MS (FAB) m/z : 192 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.05 (0.6H, s), 2.45 (2.4H, s), 3.87 (3H, s), 3.92 (3H, s), 6.98-7.09 (2H, m), 7.21-7.28 (0.4H, m), 7.54-7.61 (1.6H, m).

【0385】

【参考例128】

5-アミノ-2-tert-ブチル-6-(4-フルオロフェニル)-7-メチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-128)

3-tert-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (I-83) 500 mg (3.04 mmol) のテトラヒドロフラン (50 ml) 溶液を-30℃に冷却し、2.0Mのリチウムジイソプロピルアミドのヘプタン-テトラヒドロフラン-エチルベンゼンの混合溶液 3.35 ml (6.70 mmol) を滴下した。同温にて30分間攪拌した後、2-(4-フルオロフェニル)-3-メトキシブト-2-エンニトリル (I-127) 582 mg (3.04 mmol) のテトラヒドロフラン (10 ml) 溶液を滴下し、そのまま-30℃にて一晩攪拌した。反応液を飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム溶出部より標記化合物175 mg (17%) を黄褐色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 324 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.47 (9H, s), 2.30 (3H, s), 5.44 (2H, brs), 7.21-7.32 (4H, m).

【0386】

【参考例129】

2-tert-ブチル-5-クロロ-6-(4-フルオロフェニル)-7-メチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-129)

アセトニトリル (3 ml) に亜硝酸tert-ブチル93.8 μ l (0.789 mmol) および塩化銅(II) 84.8 mg (0.631 mmol) を加えて75℃にて5分間攪拌した。これに5-アミノ-2-tert-ブチル-6-(4-フルオロフェニル)-7-メチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-128) 170 mg (0.526 mmol) を加え75℃にて1時間攪拌した。放冷後、減圧下濃縮し得られた残留物に0.5規定塩酸を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-*n*-ヘキサン (10:1 v/v) より標記化合物99 mg (55%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 343 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.51 (9H, s), 2.41 (3H, s), 7.17-7.29 (4H, m).

【0387】

【実施例42】

2-tert-ブチル-5-クロロ-6-(4-フルオロフェニル)-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 42)

2-tert-ブチル-5-クロロ-6-(4-フルオロフェニル)-7-メチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-129) 92 mg (0.268 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (1 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン37.5 μ l (0.295 mmol) およびトリエチルアミン74.8 μ l (0.537 mmol) を加え80-90℃にて30分間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した

。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (1:0 → 100:1 v/v) 溶出部より標記化合物 97 mg (86%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 403 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.47 (9H, s), 1.56-1.71 (1H, m), 1.93-2.04 (1H, m), 2.18 (6H, s), 2.23 (3H, s), 2.58-2.69 (1H, m), 3.27-3.36 (2H, m), 3.49-3.60 (2H, m), 7.07-7.26 (4H, m).

IR (KBr): 2965, 2209, 1606, 1494, 1225 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₄H₂₉FN₆

理論値: C, 68.55%; H, 6.95%; N, 19.98%

実測値: C, 68.45%; H, 6.98%; N, 19.78%.

【0388】

【参考例130 & 131】

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-(4-ニトロフェニル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-130) および 2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-(3-ニトロフェニル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-131)

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-116) 510 mg (1.57 mmol) の四塩化炭素 (1 ml) 懸濁液に無水酢酸 163 μ l (1.73 mmol) を加え 0℃ に冷却した。激しく攪拌しながら発煙硝酸 510 μ l をゆっくり滴下した (途中、四塩化炭素 (2 ml) を追加した)。滴下後、0℃ にて 20 分間攪拌した後、室温にて 15 分間攪拌した。発煙硝酸 510 μ l を室温にて追加しそのまま 10 分間攪拌後、反応液を氷水に注いだ。飽和重曹水で中和した後クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (2回実施) に付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (5:1 v/v) 溶出部より標記化合物 (I-130) 185 mg (32%) および (I-131) 286 mg (49%) をそれぞれ淡黄色固体として得た。

(I-130)

MS (FAB) m/z : 370 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.52 (9H, s), 2.42 (3H, s), 7.44-7.50 (4H, m), 8.40-8.47 (2H, m).

(I-131)

MS (FAB) m/z : 370 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.52 (9H, s), 2.43 (3H, s), 7.60 (1H, dt, J = 1.4, 8.0 Hz), 7.78 (1H, t, J = 8.0 Hz), 8.16 (1H, t, J = 1.8 Hz), 8.39-8.43 (1H, m).

【0389】

【実施例43】

2-tert-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-(4-ニトロフェニル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#43)

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-(4-ニトロフェニル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-130) 170 mg (0.46 mmol) の N,N-ジメチルホルムアミド (2 ml) 溶液に (3S)-ジメチルアミノピロリジン 64.2 μ l (0.506 mmol) およびトリエチルアミン 128 μ l (0.919 mmol) を加え 80-90℃ にて 45 分間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (1:0 → 100:1 v/v) 溶出部より標記化合物 175 mg (85%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 448 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.47 (9H, s), 1.60-1.75 (1H, m), 1.95-2.04 (1H, m), 2.18 (6H, s), 2.24 (3H, s), 2.60-2.70 (1H, m), 3.27-3.53 (3H, m), 3.61 (1H, dd, J = 6.6, 9.9 Hz), 7.34-7.39 (1H, m), 7.47-7.51 (1H, m), 8.30-8.40 (2H, m).

IR (KBr): 2968, 2212, 1606, 1514, 1493, 1455, 1350 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{24}\text{H}_{29}\text{N}_7\text{O}_2$ として

理論値: C, 64.41%; H, 6.53%; N, 21.91%

実測値: C, 64.33%; H, 6.55%; N, 21.57%.

【0390】

【実施例44】

2-tert-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-(3-ニトロフェニル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#44)

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-(3-ニトロフェニル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-131) 256 mg (0.692 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (2.5 ml) 溶液に (3S)-ジメチルアミノピロリジン 96.6 μl (0.761 mmol) およびトリエチルアミン 193 μl (1.38 mmol) を加え 80-90°C にて 40 分間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (1:0 \rightarrow 100:1 v/v) 溶出部より標記化合物 289 mg (93%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 448 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl_3) δ : 1.47 (9H, s), 1.60-1.75 (1H, m), 1.93-2.04 (1H, m), 2.15 (3H, s), 2.17 (3H, s), 2.24 (1.5H, s), 2.25 (1.5H, s), 2.58-2.71 (1H, m), 3.24-3.37 (2H, m), 3.43-3.55 (1H, m), 3.57-3.69 (1H, m), 7.50-7.55 (0.5H, m), 7.63-7.73 (1.5H, m), 8.05 (0.5H, t, J = 1.8 Hz), 8.16 (0.5H, t, J = 1.8 Hz), 8.27-8.35 (1H, m).

IR (KBr): 2963, 2211, 1605, 1530, 1513, 1495, 1351 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{24}\text{H}_{29}\text{N}_7\text{O}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 61.92%; H, 6.71%; N, 21.06%

実測値: C, 62.05%; H, 6.28%; N, 20.97%.

【0391】

【実施例45】

6-(4-アミノフェニル)-2-tert-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#45)

2-tert-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-(4-ニトロフェニル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#43) 90 mg (0.201 mmol) を4規定塩酸のジオキサン溶液 (1 ml) 中数分間超音波処理し溶解した。減圧下濃縮し得られた残留物をメタノール (5 ml) に溶解し、5%パラジウム炭素触媒 26 mgを加え水素雰囲気下、常圧、室温にて1.5時間攪拌した。触媒をろ去後、減圧下溶媒を留去し、得られた残留物に酢酸エチルを加え、10%炭酸ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 \rightarrow 50:1 v/v) 溶出部より標記化合物 61 mg (73%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 418 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl_3) δ : 1.47 (9H, s), 1.54-1.70 (1H, m), 1.92-2.03 (1H, m), 2.19 (6H, s), 2.26 (3H, s), 2.57-2.68 (1H, m), 3.28-3.56 (4H, m), 3.80 (2H, brs), 6.68-6.77 (2H, m), 6.84-6.88 (1H, m), 6.93-6.98 (1H, m).

IR (KBr): 3462, 3356, 3223, 2964, 2866, 2819, 2771, 2217, 1628, 1602, 1535, 1507, 1474, 1458 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{24}\text{H}_{31}\text{N}_7 \cdot 0.75\text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 66.87%; H, 7.60%; N, 22.75%

実測値: C, 66.80%; H, 7.27%; N, 22.48%.

【0392】

【実施例46】

6-(3-アミノフェニル)-2-tert-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 46)

2-tert-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-(3-ニトロフェニル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 44) 58 mg (0.13 mmol) を4規定塩酸のジオキサン溶液 (1 ml) 中数分間超音波処理し溶解した。減圧下濃縮し得られた残留物をメタノール (5 ml) に溶解し、5%パラジウム炭素触媒16 mgを加え水素雰囲気下、常圧、室温にて2.5時間攪拌した。触媒をろ去後、減圧下溶媒を留去し、得られた残留物に酢酸エチルを加え、10%炭酸ナトリウム水溶液および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 → 50:1 v/v) 溶出部より標記化合物33.2 mg (61%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 418 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.47 (9H, s), 1.58-1.73 (1H, m), 1.94-2.05 (1H, m), 2.18 (3H, s), 2.20 (3H, s), 2.27 (1.5H, s), 2.28 (1.5H, s), 2.59-2.72 (1H, m), 3.34-3.68 (4H, m), 3.77 (2H, brs), 6.41-6.44 (0.5H, m), 6.47-6.53 (1H, m), 6.58-6.62 (0.5H, m), 6.68-6.73 (1H, m), 7.16-7.24 (1H, m).

IR (KBr): 3468, 3365, 3229, 2966, 2775, 2217, 1631, 1602, 1535, 1508, 1475, 1453 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₄H₃₁N₇ · H₂Oとして

理論値: C, 66.18%; H, 7.64%; N, 22.51%

実測値: C, 66.62%; H, 7.28%; N, 22.19%.

【0393】

【実施例47】

2-tert-ブチル-5-[(2-N',N'-ジエチルアミノ)エチルアミノ]-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 47)

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-116) 200 mg (0.62 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (2 ml) 溶液にN,N-ジエチルエチレンジアミン143 mg (1.23 mmol) を加え80-90℃にて2.5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (200:1 v/v) 溶出部より標記化合物160 mg (64%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 405 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.96 (6H, t, J = 7.2 Hz), 1.47 (9H, s), 2.22 (3H, s), 2.38-2.45 (6H, m), 2.85 (2H, q, J = 5.3 Hz), 7.19 (1H, brs), 7.23-7.27 (2H, m), 7.43-7.48 (3H, m).

IR (KBr): 2964, 2816, 2215, 1614, 1556 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₄H₃₂N₆として

理論値: C, 71.25%; H, 7.97%; N, 20.77%

実測値: C, 71.07%; H, 8.01%; N, 20.68%.

【0394】

【実施例48】

2-tert-ブチル-7-メチル-5-(ピペラジン-1-イル)-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 48)

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-116) 400 mg (1.23 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (40 ml) 溶液にピペラジン530 mg (6.16 mmol) およびトリエチルアミン343 μ l (2.46 mmol) を加え80-90℃にて2.5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付

し、クロロホルム-メタノール (1:0 → 100:1 → 100:3 v/v) 溶出部より標記化合物432 mg (94%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 375 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.48 (9H, s), 2.23 (3H, s), 2.85-2.90 (4H, m), 3.00-3.05 (4H, m), 7.16-7.19 (2H, m), 7.38-7.51 (3H, m).

IR (KBr): 2965, 2219, 1607, 1512, 1440, 1204 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₂H₂₆N₆ · 1.5H₂Oとして

理論値: C, 65.81%; H, 7.28%; N, 20.93%

実測値: C, 65.25%; H, 6.48%; N, 20.54%.

【0395】

【実施例49】

2-tert-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-メチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル [1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#49)

2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-116) 150 mg (0.461 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (10 ml) 溶液に(3S)-メチルアミノピロリジン51 mg (0.507 mmol) およびトリエチルアミン122 μ l (0.922 mmol) を加え80-90℃にて3時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 → 30:1 v/v) 溶出部より標記化合物95 mg (53%) を淡緑色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 389 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.47 (9H, s), 1.57-1.70 (1H, m), 1.78-2.03 (2H, m), 2.16 (6H, s), 2.25 (3H, s), 2.37 (3H, s), 3.10-3.19 (1H, m), 3.23-3.34 (2H, m), 3.37-3.50 (2H, m), 7.12-7.22 (2H, m), 7.36-7.50 (3H, m).

IR (KBr): 2967, 2206, 1606, 1537, 1509, 1495, 1458, 1440 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₃H₂₈N₆ · 0.5H₂Oとして

理論値: C, 69.49%; H, 7.35%; N, 21.14%

実測値: C, 69.71%; H, 7.17%; N, 21.07%.

【0396】

<参考例132～147、実施例50～57>

【0397】

【表2】

置換基R基	γ	ϕ	δ	ϵ
Me	I-77	I-132	I-140	#50
i-Pr	I-80	I-133	I-141	#51
n-Bu	I-81	I-134	I-142	#52
i-Bu	I-82	I-135	I-143	#53
t-Bu	I-83	I-136	I-144	#54
2-pyridyl	I-84	I-137	I-145	#55
3-pyridyl	I-85	I-138	I-146	#56
4-pyridyl	I-86	I-139	I-147	#57

【0398】

上記表2中、Meはメチル基、


Prはプロピル基、

Buはブチル基を表す。

また表1において、 γ 、 θ 、 δ 及び ϵ は次の化学式に示されるものである。

【0399】

【化 3 8】



【0 4 0 0】

【参考例 132】

6-n-ブチル-5-ヒドロキシ-2,7-ジメチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-132)

5-シアノメチル-3-メチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (I-77) 1.00 g (8.19 mmol)、2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 1.59 g (8.52 mmol) および酢酸アンモニウム 1.31 g (17.0 mmol) の混合物を 150℃ にて 1 時間加熱した。冷却後、水を加え析出した結晶をろ取り、さらにアセトニトリルで洗浄した。これをろ取、乾燥して標記化合物 884 mg (44%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 245 ($M+1$)⁺.

¹H-NMR (CD₃OD) δ : 0.95 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.32-1.54 (4H, m), 2.41 (3H, s), 2.43 (3H, s), 2.61 (2H, t, J = 7.6 Hz).

【0 4 0 1】

【参考例 133】

6-n-ブチル-7-メチル-2-*i*-プロピル-5-オキソ-1,5-ジヒドロ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-133)

(5-イソプロピル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-アセトニトリル (I-80) 750 mg (5.0 mmol)、2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 970 mg (5.2 mmol) および酢酸アンモニウム 800 mg (10.4 mmol) の混合物を 150℃ にて 1 時間加熱した。冷却後、水を加え析出した結晶をろ取り、さらにアセトニトリルで洗浄した。これをろ取、乾燥して標記化合物 640 mg (47%) を淡桃色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 273 ($M+1$)⁺.

¹H-NMR (DMSO-*d*₆) δ : 0.87 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.25 (6H, d, J = 6.9 Hz), 1.31 (4H, m), 2.26 (3H, s), 2.46 (2H, m), 2.96 (1H, sep, J = 6.9 Hz).

【0 4 0 2】

【参考例 134】

2,6-ジ-n-ブチル-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-134)

3-n-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (I-81) 1.0 g (6.09 mmol)、2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 1.19 g (6.39 mmol) および酢酸アンモニウム 986 mg (12.8 mmol) の混合物を 150℃ にて 2 時間加熱した。冷却後、水を加え析出した結晶をろ取り、さらにアセトニトリルで洗浄した。これをろ取、乾燥して標記化合物 703 mg (40%) を淡桃色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 287 ($M+1$)⁺.

¹H-NMR (CD₃OD) δ : 0.93-0.97 (6H, m), 1.35-1.47 (6H, m), 1.73-1.83 (2H, m), 2.43 (3H, s), 2.62 (2H, t, J = 7.5 Hz), 2.81 (2H, t, J = 7.7 Hz).

【0 4 0 3】

【参考例 135】

2-*i*-ブチル-6-n-ブチル-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-135)

(5-イソブチル-4H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル)-アセトニトリル (I-82) 750 mg (5.0

0 mmol)、2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 970 mg (5.20 mmol) および酢酸アンモニウム 800 mg (10.4 mmol) の混合物を 150℃ にて 1 時間加熱した。冷却後、水を加え析出した結晶をろ取し、さらにアセトニトリルで洗浄した。これをろ取、乾燥して標記化合物 610 mg (43%) を淡桃色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 287 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 0.88 (3H, t, J = 6.9 Hz), 0.94 (6H, d, J = 6.6 Hz), 1.31 (4H, m), 2.13 (1H, m), 2.33 (3H, s), 2.53 (2H, m), 2.65 (2H, d, J = 7.2 Hz).

【0404】

【参考例136】

2-*i*-ブチル-6-*n*-ブチル-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-136)

3-tert-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (I-83) 1.0 g (6.09 mmol)、2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 1.19 g (6.39 mmol) および酢酸アンモニウム 986 mg (12.8 mmol) の混合物を 150℃ にて 3.5 時間加熱した。冷却後、反応残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:0 → 98:2 → 95:5 v/v) で溶出し、さらにアセトニトリルで洗浄した。これをろ取、乾燥して標記化合物 1.09 g (63%) を淡黄土色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 287 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ: 0.93 (3H, t, J = 7.2 Hz), 1.35-1.53 (13H, m), 2.41 (3H, s), 2.70 (2H, t, J = 7.4 Hz).

【0405】

【参考例137】

6-*n*-ブチル-5-ヒドロキシ-7-メチル-2-(2-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-137)

[5-(2-ピリジル)-2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (I-84) 500 mg (2.70 mmol)、2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 523 mg (2.81 mmol) および酢酸アンモニウム 433 mg (5.62 mmol) の混合物を 150℃ にて 20 分間加熱した。2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 950 mg (5.10 mmol) および酢酸アンモニウム 433 mg (5.62 mmol) を追加してさらに 150℃ にて 1 時間加熱した。冷却後、水およびエタノールを加え析出した結晶をメタノール (72 ml) とクロロホルム (36 ml) の混合溶液中 80℃ にて 5 分間加熱した。ついで室温にて 1 時間攪拌し析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 227 mg (27%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 308 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 0.90 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.22-1.50 (4H, m), 2.33 (3H, s), 2.43-2.65 (2H, m), 7.38-7.49 (1H, m), 7.84-7.95 (1H, m), 8.13-8.21 (1H, m), 8.63-8.71 (1H, m).

【0406】

【参考例138】

6-*n*-ブチル-5-ヒドロキシ-7-ジメチル-2-(3-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-138)

[5-(3-ピリジル)-2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (I-85) 700 mg (3.78 mmol)、2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 733 mg (3.93 mmol) および酢酸アンモニウム 606 mg (7.86 mmol) の混合物を 150℃ にて 1.5 時間加熱した。冷却後、アセトニトリルおよびエタノールを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物 887 mg (76%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 308 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ: 0.89 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.24-1.48 (4H, m), 2.32 (3H, s), 2.42-2.61 (2H, m), 7.44-7.58 (1H, m), 8.38-8.49 (1H, m), 8.57-8.68 (1H, m), 9.21-9.32 (1H, m).

【0407】

【参考例139】

6-n-ブチル-5-ヒドロキシ-7-ジメチル-2-(4-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-139)

[5-(4-ピリジル)-2H-[1,2,4]トリアゾール-3-イル]-アセトニトリル (1-86) 800 mg (4.32 mmol)、2-アセチルヘキサン酸エチルエステル 837 mg (4.50 mmol) および酢酸アンモニウム 693 mg (8.99 mmol) の混合物を150℃にて30分間加熱した。冷却後、エタノール、アセトニトリルおよび水を加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物1.01 g (76%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 308 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ : 0.89 (3H, t, J = 7.0 Hz), 1.24-1.46 (4H, m), 2.33 (3H, s), 2.45-2.60 (2H, m), 7.99-8.09 (2H, m), 8.60-8.73 (2H, m).

【0408】

【参考例140】

6-n-ブチル-5-クロロ-2,7-ジメチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-140)

6-n-ブチル-5-ヒドロキシ-2,7-ジメチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-132) 800 mg (3.27 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中1時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物768 mg (89%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 263 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.00 (3H, t, J = 7.2 Hz), 1.42-1.64 (4H, m), 2.67 (3H, s), 2.73 (3H, s), 2.81-2.93 (3H, m).

【0409】

【参考例141】

6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-i-プロピル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-141)

6-n-ブチル-7-メチル-2-i-プロピル-5-オキソ-1,5-ジヒドロ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-133) 500 mg (1.80 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中1時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物768 mg (89%) を褐色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 291 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.00 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.45 (6H, d, J = 6.9 Hz), 1.52 (4H, m), 2.72 (3H, s), 2.87 (2H, m), 3.33 (1H, sep, J = 6.9 Hz).

【0410】

【参考例142】

2,6-ジ-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-142)

2,6-ジ-n-ブチル-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-134) 500 mg (1.75 mmol) を塩化ホスホリル (3 ml) 中2.5時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物532 mg (100%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 305 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.94-1.03 (6H, m), 1.38-1.58 (6H, m), 1.80-1.90 (2H, m), 2.72 (3H, s), 2.87 (2H, t, J = 8.0 Hz), 2.97 (2H, t, J = 7.8 Hz).

【0411】

【参考例143】

2-i-ブチル-6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カル

ボニトリル (I-143)

2-*i*-ブチル-6-*n*-ブチル-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-135) 500 mg (1.70 mmol) を塩化ホスホリル (3 ml) 中2.5時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物546 mg (100%) を褐色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 305 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.00 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.01 (6H, d, J = 6.6 Hz), 1.53 (4H, m), 2.30 (2H, m), 2.73 (3H, s), 2.85 (2H, d, J = 7.2 Hz), 2.87 (2H, t, J = 7.2 Hz).

【0412】

【参考例144】

2-*tert*-ブチル-6-*n*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-144)

2-*i*-ブチル-6-*n*-ブチル-7-メチル-5-オキソ-1,5-ジヒドロ[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-136) 900 mg (3.14 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中1.5時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物939 mg (98%) を淡褐色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 305 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.00 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.45-1.60 (13H, m), 2.71 (3H, s), 2.86 (2H, t, J = 7.8 Hz).

【0413】

【参考例145】

6-*n*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-(2-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-145)

6-*n*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-(2-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-137) 200 mg (0.651 mmol) を塩化ホスホリル (8 ml) 中2時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加え、さらに飽和重曹水にてpH 7としてクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物233 mg (100%) を黄色油状物として得た。

MS (FAB) m/z : 326 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.02 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.43-1.67 (4H, m), 2.77 (3H, s), 2.87-2.95 (2H, m), 7.42-7.51 (1H, m), 7.86-7.97 (1H, m), 8.42-8.50 (1H, m), 8.82-8.93 (1H, m).

【0414】

【参考例146】

6-*n*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-(3-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-146)

6-*n*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-(3-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (I-138) 700 mg (2.28 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中2時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加え、さらに飽和重曹水にてpH 7としてクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物201 mg (27%) を黄色固体として得た。

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.98-1.07 (3H, m), 1.45-1.65 (4H, m), 2.76 (3H, s), 2.86-2.96 (2H, m), 7.41-7.48 (1H, m), 8.58-8.65 (1H, m), 8.70-8.77 (1H, m), 9.53-9.58 (1H, m).

【0415】

【参考例147】

6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-(4-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-147)

6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-(4-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-139) 910 mg (2.96 mmol) を塩化ホスホリル (10 ml) 中2時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加え、さらに飽和重曹水にてpH 8としてクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して粗製の標記化合物1.09 gを得た。これはそのまま次の反応に用いた。

【0416】

【実施例50】

6-n-ブチル-2,7-ジメチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 50)

6-n-ブチル-5-クロロ-2,7-ジメチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-140) 500 mg (1.90 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (6 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン239 mg (2.09 mmol) およびトリエチルアミン530 μ l (3.80 mmol) を加え80-90℃にて5.5時間撹拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物515 mg (80%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 341 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.93 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.36-1.54 (4H, m), 1.97-2.12 (1H, m), 2.22-2.39 (7H, m), 2.56 (3H, s), 2.63 (3H, s), 2.68-2.80 (2H, m), 3.02-3.14 (1H, m), 3.43-3.54 (2H, m), 3.57-3.66 (1H, m), 3.73-3.84 (1H, m).

IR (KBr): 2953, 2868, 2815, 2768, 2222, 1616, 1508, 1475 cm⁻¹.

元素分析値: C₁₉H₂₈N₆として

理論値: C, 67.03%; H, 8.29%; N, 24.68%

実測値: C, 66.99%; H, 8.38%; N, 25.01%.

【0417】

【実施例51】

6-n-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-2-i-プロピル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 51)

6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-i-プロピル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-141) 400 mg (1.40 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (4 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン220 μ l (1.70 mmol) およびトリエチルアミン480 μ l (3.40 mmol) を加え80-90℃にて5.5時間撹拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物515 mg (83%) を赤色油状物として得た。

MS (FAB) m/z: 369 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.97 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.43 (6H, d, J = 6.9 Hz), 1.45 (4H, m), 2.04 (1H, m), 2.27 (1H, m), 2.33 (6H, s), 2.68 (3H, s), 2.74 (2H, m), 3.12 (1H, m), 3.26 (1H, sep, J = 6.9 Hz), 3.43 (1H, t, J = 8.1 Hz), 3.52 (3H, dt, J = 2.7, 8.7 Hz), 3.71 (2H, m).

IR (neat): 2920, 2233, 1613, 1532, 1504, 1470, 1348 cm⁻¹.

【0418】

【実施例52】

2,6-ジ-n-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 52)

2,6-ジ-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-142) 400 mg (1.31 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (4 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン183 μ l (1.44 mmol) およびトリエチルアミン366 μ l (2.62 mmol) を加え80-90℃にて3.5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (99:1 v/v) 溶出部より標記化合物461 mg (92%) を黄色油状物として得た。

MS (FAB) m/z: 383 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.94-0.99 (6H, m), 1.38-1.51 (6H, m), 1.78-1.89 (2H, m), 1.98-2.11 (1H, m), 2.22-2.33 (1H, s), 2.33 (6H, s), 2.64 (3H, s), 2.68-2.77 (2H, m), 2.92 (2H, t, J = 7.7 Hz), 3.05-3.15 (1H, m), 3.43-3.53 (2H, m), 3.64 (1H, t, J = 7.8 Hz), 3.71-3.80 (1H, m).

IR (neat): 2918, 2843, 2223, 1614, 1461 cm⁻¹.

【0419】

【実施例53】

2-i-ブチル-6-n-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 53)

2-i-ブチル-6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-143) 400 mg (1.31 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (4 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン190 μ l (1.50 mmol) およびトリエチルアミン420 μ l (3.00 mmol) を加え80-90℃にて5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (75:1 v/v) 溶出部より標記化合物480 mg (97%) を赤色油状物として得た。

MS (FAB) m/z: 383 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.97 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.00 (6H, d, J = 6.6 Hz), 1.46 (4H, m), 2.05 (1H, m), 2.26 (1H, m), 2.33 (6H, s), 2.64 (3H, s), 2.75 (2H, m), 2.79 (2H, d, J = 7.2 Hz), 3.11 (1H, m), 3.45 (2H, m), 3.70 (2H, m).

IR (neat): 2956, 2905, 2223, 1612, 1504, 1469, 1349 cm⁻¹.

【0420】

【実施例54】

2-tert-ブチル-6-n-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 54)

2-tert-ブチル-6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-144) 600 mg (1.97 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (6 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン275 μ l (2.17 mmol) およびトリエチルアミン549 μ l (3.94 mmol) を加え80-90℃にて4時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (99:1 v/v) 溶出部より標記化合物723 mg (97%) を赤色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 383 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.97 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.36-1.55 (13H, m), 1.97-2.11 (1H, m), 2.21-2.34 (1H, m), 2.34 (6H, s), 2.63 (3H, s), 2.68-2.77 (2H, m), 3.14 (1H, quint, J = 8.1 Hz), 3.40 (1H, t, J = 8.6 Hz), 3.53 (1H, dt, J = 2.4, 8.6 Hz), 3.66-3.74 (2H, m).

IR (KBr): 2956, 2869, 2772, 2216, 1607 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{22}\text{H}_{34}\text{N}_6 \cdot 0.25\text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 68.27%; H, 8.98%; N, 21.71%

実測値: C, 68.45%; H, 8.89%; N, 21.85%.

【0421】

【実施例55】

6-n-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-2-(2-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#55)

6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-(2-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-145) 163 mg (0.50 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン68.6 mg (0.60 mmol) およびトリエチルアミン133 μl (1.00 mmol) を加え80-90℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 \rightarrow 97:3 v/v) 溶出部より標記化合物63.7 mg (32%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 404 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl_3) δ : 0.99 (3H, t, J = 7.1 Hz), 1.39-1.60 (4H, m), 2.03-2.24 (2H, m), 2.28-2.45 (7H, m), 2.69 (3H, s), 2.72-2.86 (2H, m), 3.09-3.25 (1H, m), 3.53-3.66 (2H, m), 3.66-3.79 (1H, m), 3.88-4.01 (1H, m), 7.35-7.44 (1H, m), 7.79-7.91 (1H, m), 8.32-8.42 (1H, m), 8.76-8.89 (1H, m).

IR (KBr): 2957, 2822, 2773, 2218, 1611, 1532, 1504, 1478, 1415 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{23}\text{H}_{29}\text{N}_7 \cdot 0.25\text{H}_2\text{O}$ として

理論値: C, 67.70%; H, 7.29%; N, 24.03%

実測値: C, 67.66%; H, 7.24%; N, 23.86%.

【0422】

【実施例56】

6-n-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-2-(3-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#56)

6-n-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-(3-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-146) 130 mg (0.399 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (3 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン54.7 mg (0.479 mmol) およびトリエチルアミン106 μl (0.798 mmol) を加え80-90℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 \rightarrow 97:3 v/v) 溶出部より標記化合物145 mg (90%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 404 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl_3) δ : 0.94 (3H, t, J = 7.0 Hz), 1.38-1.60 (4H, m), 2.03-2.19 (1H, m), 2.28-2.49 (7H, m), 2.68 (3H, s), 2.72-2.86 (2H, m), 3.08-3.23 (1H, m), 3.46-3.65 (2H, m), 3.69-3.91 (2H, m), 7.38-7.47 (1H, m), 8.55-8.64 (1H, m), 8.67-8.75 (1H, m).

IR (KBr): 2957, 2822, 2773, 2218, 1611, 1532, 1504, 1478, 1415 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{23}\text{H}_{29}\text{N}_7$ として

理論値: C, 68.46%; H, 7.24%; N, 24.30%

実測値: C, 68.26%; H, 7.24%; N, 24.28%.

【0423】

【実施例57】

6-n-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-2-(4-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#57)

6-*n*-ブチル-5-クロロ-7-メチル-2-(4-ピリジル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (1-147) 1.09 g (3.34 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (20 ml) 溶液に(3*S*)-ジメチルアミノピロリジン405 mg (3.55 mmol) およびトリエチルアミン786 μ l (5.92 mmol) を加え80-90℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 \rightarrow 97:3 v/v) 溶出部より標記化合物388 mg (32%、1-139からの収率) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 404 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.99 (3H, t, J = 6.9 Hz), 1.38-1.58 (4H, m), 2.03-2.21 (1H, m), 2.26-2.48 (7H, m), 2.68 (3H, s), 2.73-2.85 (2H, m), 3.07-3.22 (1H, m), 3.50-3.64 (2H, m), 3.68-3.77 (1H, m), 3.78-3.91 (1H, m), 8.14-8.22 (2H, m), 8.72-8.81 (2H, m).

IR (KBr): 2949, 2868, 2812, 2778, 2754, 2225, 1617, 1502, 1476 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₃H₂₉N₇ · 0.25H₂Oとして

理論値: C, 67.70%; H, 7.29%; N, 24.03%

実測値: C, 67.71%; H, 7.05%; N, 24.02%.

【0424】

【参考例148】

2-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (1-148)

3-tert-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-83) 490 mg (3.00 mmol) のテトラヒドロフラン (30 ml) 溶液に、窒素雰囲気下-40℃にて2.0Mのリチウムジイソプロピルアミドのヘプタン-テトラヒドロフラン-エチルベンゼンの混合溶液 3.3 ml (6.6 mmol) を滴下した。同温にて30分間攪拌後、3-メトキシ-2-フェニルアクリル酸エチル0.58 g (3.0 mmol) のテトラヒドロフラン (10 ml) 溶液を滴下した後、同温にて一夜攪拌しさらに室温に室温に昇温して一夜攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (10:1 v/v) 溶出部より標記化合物112 mg (13%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 293 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-*d*₆) δ : 1.42 (9H, s), 7.24-7.29 (1H, m), 7.35-7.40 (2H, m), 7.68-7.71 (2H, m), 7.99 (1H, s).

【0425】

【参考例149】

2-tert-ブチル-5-クロロ-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (1-149)

2-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (1-148) 80 mg (0.27 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中5.5時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物95 mg (100%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 311 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.54 (9H, s), 7.44-7.54 (5H, m), 7.96 (1H, s).

【0426】

【実施例58】

2-tert-ブチル-5-[(3*S*)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニトリル (# 58)

2-tert-ブチル-5-クロロ-6-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-*a*]ピリジン-8-カルボニ

トリル (1-149) 85 mg (0.27 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン41 μ l (0.32 mmol) およびトリエチルアミン56 μ l (0.40 mmol) を加え80-90℃にて3.5時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より粗製の標記化合物を得た。これをジエチルエーテル (5 ml) に溶解し、4規定塩酸の酢酸エチル溶液0.25 ml (1.0 mmol) を加えて室温にて5分間攪拌した。析出した結晶をろ取して標記化合物の塩酸塩84 mg (73%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 389 (-HCl) (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.56 (9H, s), 2.32 (1H, m), 2.74 (1H, m), 2.79 (3H, t, J = 4.2 Hz), 2.87 (3H, d, J = 4.2 Hz), 3.47 (1H, m), 3.68 (1H, m), 3.97 (1H, m), 4.08 (1H, m), 4.41 (1H, m), 7.38-7.53 (5H, m), 7.77 (1H, m), 12.84 (1H, brs).

IR (KBr): 3417, 2965, 2222, 1604, 1513, 1444, 1357, 1207 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₃H₂₈N₆ · HCl · 1.25H₂Oとして

理論値: C, 61.73%; H, 7.10%; N, 18.57%; Cl, 7.92%

実測値: C, 61.34%; H, 6.69%; N, 18.57%; Cl, 8.70%.

【0427】

【参考例150】

6-ベンジル-2-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-150)

3-tert-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (1-83) 990 mg (6.00 mmol)、2-ベンジル-3-オキソ酢酸エチルエステル1.45 g (6.60 mmol) および酢酸アンモニウム1.02 g (13.2 mmol) の混合物を160℃にて30分間加熱した。冷却後、アセトニトリルを加え析出した結晶をろ取、乾燥して標記化合物726 mg (38%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 321 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ : 1.40 (9H, s), 2.29 (3H, s), 3.92 (2H, s), 7.10-7.24 (5H, m).

【0428】

【参考例151】

6-ベンジル-2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-151)

6-ベンジル-2-tert-ブチル-5-ヒドロキシ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-150) 650 mg (2.00 mmol) を塩化ホスホリル (10 ml) 中4時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物687 mg (100%) を淡黄色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 339 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.52 (9H, s), 2.59 (3H, s), 4.30 (2H, s), 7.05-7.08 (2H, m), 7.21-7.33 (3H, m).

【0429】

【実施例59】

6-ベンジル-2-tert-ブチル-7-メチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (#59)

6-ベンジル-2-tert-ブチル-5-クロロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (1-151) 150 mg (0.44 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン67 μ l (0.53 mmol) およびトリエチルアミン92 μ l (0.66 mmol) を加え70-80℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマト

グラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物161 mg (88%) を紫色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 417 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.48 (9H, s), 1.88-2.00 (1H, m), 2.11-2.21 (1H, m), 2.29 (6H, s), 2.47 (3H, s), 3.08 (1H, brs), 3.38-3.52 (2H, m), 3.62-3.71 (2H, m), 4.18 (2H, s), 7.02 (2H, d, J = 6.6 Hz), 7.14-7.30 (3H, m).

IR (KBr): 2962, 2218, 1606, 1508, 1472, 1450, 1209 cm⁻¹.

元素分析値: C₂₅H₃₂N₆ · 0.25H₂Oとして

理論値: C, 71.31%; H, 7.78%; N, 19.96%

実測値: C, 71.35%; H, 7.74%; N, 19.48%.

【0430】

【参考例152】

2-ベンジル-3-オキソペンタン酸メチルエステル (I-152)

3-オキソペンタン酸メチルエステル7.26 g (55.8 mmol) のアセトン (100 ml) 溶液に炭酸カリウム (10 g) およびベンジルブロミド7.96 ml (66.9 mmol) を加え15時間加熱還流した。放冷後、反応液をろ過し、ろ液の溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサノール-酢酸エチル (9:1 v/v) 溶出部より標記化合物7.08 g (58%) を無色油状物として得た。これはそのままつぎの反応に用いた。

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 0.99 (3H, t, J = 7.3 Hz), 2.25-2.37 (1H, m), 2.50-2.62 (1H, m), 3.16 (2H, d, J = 7.6 Hz), 3.68 (3H, s), 3.80 (3H, t, J = 7.6 Hz), 7.14-7.29 (5H, m).

【0431】

【参考例153】

6-ベンジル-2-tert-ブチル-7-エチル-5-ヒドロキシ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-153)

3-tert-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (I-83) 990 mg (6.00 mmol)、2-ベンジル-3-オキソペンタン酸メチルエステル (I-152) 1.45 g (6.60 mmol) および酢酸アンモニウム1.02 g (13.2 mmol) の混合物を160℃にて40分間加熱した。冷却後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物442 mg (22%) を無色結晶として得た (アセトニトリルで結晶化した)。

MS (FAB) m/z : 335 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ : 1.01 (3H, t, J = 7.5 Hz), 1.40 (9H, s), 2.65 (2H, q, J = 7.5 Hz), 3.92 (2H, s), 7.10-7.24 (5H, m).

【0432】

【参考例154】

6-ベンジル-2-tert-ブチル-5-クロロ-7-エチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-154)

6-ベンジル-2-tert-ブチル-7-エチル-5-ヒドロキシ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-153) 400 mg (1.20 mmol) を塩化ホスホリル (10 ml) 中4時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物444 mg (100%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 353 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.19 (3H, t, J = 7.5 Hz), 1.52 (9H, s), 2.97 (2H, q, J = 7.5 Hz), 4.32 (2H, s), 7.04-7.07 (2H, m), 7.23-7.32 (3H, m).

【0433】

【実施例60】

6-ベンジル-2-tert-ブチル-7-エチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 60)

6-ベンジル-2-tert-ブチル-5-クロロ-7-エチル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-154) 150 mg (0.43 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン67 μ l (0.53 mmol) およびトリエチルアミン92 μ l (0.66 mmol) を加え70-80℃にて6時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より標記化合物144 mg (78%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z: 431 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.19 (3H, t, J = 7.5 Hz), 1.48 (9H, s), 1.84-1.97 (1H, m), 2.08-2.17 (1H, m), 2.29 (6H, s), 2.87 (2H, q, J = 7.5 Hz), 3.05 (1H, brs), 3.34-3.45 (2H, m), 3.58-3.66 (2H, m), 4.19 (2H, s), 7.00-7.04 (2H, m), 7.17-7.29 (3H, m).

IR (KBr): 2966, 2221, 1604, 1507, 1492, 1458, 1209 cm⁻¹.

【0434】

【参考例155】

2-tert-ブチル-6-エチル-5-ヒドロキシ-7-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-155)

3-tert-ブチル-5-シアノメチル-1H-[1,2,4]トリアゾール (I-83) 1.00 g (6.00 mmol)、2-ベンゾイル酪酸エチルエステル1.45 g (6.60 mmol) および酢酸アンモニウム1.02 g (13.2 mmol) の混合物を150℃にて5時間加熱した。冷却後、クロロホルムに溶解し水および飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物152 mg (8%) を淡青色固体として得た (アセトニトリルで結晶化した)。

MS (FAB) m/z: 321 (M+1)⁺.

¹H-NMR (DMSO-d₆) δ : 0.87 (3H, t, J = 7.2 Hz), 1.41 (9H, s), 2.22 (2H, q, J = 7.2 Hz), 7.28-7.31 (2H, m), 7.43-7.54 (3H, m).

【0435】

【参考例156】

2-tert-ブチル-5-クロロ-6-エチル-7-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-156)

2-tert-ブチル-6-エチル-5-ヒドロキシ-7-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-155) 120 mg (0.37 mmol) を塩化ホスホリル (5 ml) 中5時間加熱還流した。冷後、塩化ホスホリルを減圧下留去し、得られた残留物に氷水を加えクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物90 mg (72%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z: 339 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.03 (3H, t, J = 7.5 Hz), 1.52 (9H, s), 2.70 (2H, q, J = 7.5 Hz), 7.30-7.34 (2H, m), 7.53-7.57 (3H, m).

【0436】

【実施例61】

2-tert-ブチル-6-エチル-5-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-7-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (# 61)

2-tert-ブチル-5-クロロ-6-エチル-7-フェニル-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリジン-8-カルボニトリル (I-156) 76 mg (0.22 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (5 ml) 溶液に(3S)-ジメチルアミノピロリジン31 μ l (0.24 mmol) およびトリエチルアミン46 μ l (0.33 mmol) を加え70-80℃にて3時間攪拌した。冷却後、反応液を減圧下濃縮し得られた残留物をクロロホルムで溶解し飽和重曹水および飽和食塩水で洗浄した。有機層を硫酸マグ

ネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (50:1 v/v) 溶出部より粗製の標記化合物を得た。これをジエチルエーテル (5 ml) に溶解し、4規定塩酸の酢酸エチル溶液 0.25 ml (1.0 mmol) を加えて室温にて5分間攪拌した。析出した結晶をろ取して標記化合物の塩酸塩 80 mg (80%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 417 ($-HCl$) ($M+1$)⁺.

¹H-NMR ($CDCl_3$) δ : 0.91 (3H, t, $J = 7.5$ Hz), 1.50 (9H, s), 2.59-2.78 (4H, m), 2.93 (6H, dd, $J = 4.5, 18.3$ Hz), 3.64-3.72 (1H, m), 3.79-3.87 (1H, m), 4.01-4.25 (3H, m), 7.27-7.31 (2H, m), 7.51-7.53 (3H, m), 13.09 (1H, brs).

IR (KBr): 3402, 2966, 2224, 1607, 1505, 1443, 1247 cm^{-1} .

元素分析値: $C_{25}H_{32}N_6 \cdot 1.25HCl \cdot 1.5H_2O$ として

理論値: C, 61.38%; H, 7.47%; N, 17.18%; Cl, 9.06%

実測値: C, 61.50%; H, 7.18%; N, 17.12%; Cl, 9.19%.

【0437】

【参考例157】

5-tert-ブチル-1H-ピラゾール-3-カルボン酸エチルエステル (I-157)

エタノール (150 ml) および金属ナトリウム 2.30 g (0.1 mol) から調製したナトリウムエトキシドのエタノール溶液に、ピナコロン 12.7 ml (0.1 mol) およびしゅう酸ジエチル 13.6 ml (0.1 mol) を氷冷下滴下した後、室温にて3.5時間攪拌した。反応液を減圧下濃縮し得られた残留物に氷冷下酢酸 (46 ml) を加えた。ついでヒドラジン-水和物 6.69 ml (80%min., 0.11 mol) を氷冷下滴下した後、40℃にて3時間攪拌した。放冷後、減圧下濃縮乾固し得られた残留物に水を加え不溶物をろ取、乾燥して標記化合物 12.6 g (64%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 197 ($M+1$)⁺.

¹H-NMR ($CDCl_3$) δ : 1.25-1.42 (12H, m), 4.36 (2H, q, $J = 7.1$ Hz), 6.64 (1H, s).

【0438】

【参考例158】

5-tert-ブチル-3-ヒドロキシメチル-1H-ピラゾール (I-158)

5-tert-ブチル-1H-ピラゾール-3-カルボン酸エチルエステル (I-157) 12.0 g (61.1mmol) のテトラヒドロフラン (150 ml) 溶液に-5℃にて水素化リチウムアルミニウム 3.48 g (純度80%、73.3 mmol) のテトラヒドロフラン (180 ml) 溶液を内温15℃以下に保ちながら滴下した。室温で一夜攪拌した後、含水テトラヒドロフランを加え溶媒を減圧下留去した。得られた残留物に酢酸エチルおよび飽和(+)-酒石酸ナトリウム水溶液を加え不溶物をろ去した。ろ液の有機層を分取し飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去して標記化合物 8.33 g (88%) を無色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 155 ($M+1$)⁺.

¹H-NMR ($CDCl_3$) δ : 1.29 (9H, s), 4.65 (2H, s), 6.03 (1H, s), 6.71 (2H, brs).

【0439】

【参考例159】

5-tert-ブチル-3-クロロメチル-1H-ピラゾール 一塩酸塩 (I-159)

5-tert-ブチル-3-ヒドロキシメチル-1H-ピラゾール (I-158) 8.33 g (54 mmol) を4規定塩酸のジオキサン溶液 134 ml (0.54 mol) に溶解し10分間攪拌した後、減圧下濃縮した。得られた残留物に塩化チオニル (60 ml) を加え75℃にて20分間攪拌した。放冷後、減圧下濃縮して得られた残留物をジエチルエーテルで洗浄して標記化合物 9.42 g (83%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 173 ($-HCl$) ($M+1$)⁺.

¹H-NMR (CD_3OD) δ : 1.41 (9H, s), 4.80 (2H, s), 6.73 (1H, s).

【0440】

【参考例160】

(5-tert-ブチル-1H-ピラゾール-3-イル)アセトニトリル (I-160)

シアン化カリウム19.2 g (0.295 mol) の水 (23 ml) 溶液に氷冷下5-tert-ブチル-3-クロロメチル-1H-ピラゾール 一塩酸塩 (1-159) 8.80 g (42.1 mmol) のエタノール (80 ml) 溶液を滴下し、同温で1時間攪拌後さらに室温にて4.5時間攪拌した。不溶物をろ去し、ろ液の溶媒を留去した。得られた残留物をクロロホルムで洗浄し再度、不溶物をろ去し、ろ液の溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物5.87 g (85%) を黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 164 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.33 (9H, s), 3.74 (2H, s), 6.10 (1H, s).

【0441】

【参考例161】

α -アセチルフェニルアセトニトリル (1-161)

エタノール (150 ml) および金属ナトリウム6.38 g (0.277 mol) から調製したナトリウムエトキシドのエタノール溶液にフェニルアセトニトリル25 g (0.213 mol) および酢酸エチル33mlを加えた後3時間加熱還流した。放冷後、減圧下濃縮し得られた残留物に水およびジクロロメタンを加え有機層を分取した。1規定塩酸および飽和食塩水で洗浄し硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (5:1 \rightarrow 3:1 v/v) 溶出部より標記化合物3.15 g (9%) を無色油状物として得た。

MS (FAB) m/z : 160 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.27 (3H, s), 4.68 (1H, s), 7.36-7.52 (5H, m).

【0442】

【参考例162】

3-メトキシ-2-フェニル-2-ブテンニトリル (1-162)

α -アセチルフェニルアセトニトリル (1-161) 25.0 g (0.157 mol) をオルト酢酸トリメチル140 ml (1.21 mol) 中6時間加熱還流した。放冷後、減圧下濃縮し得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (10:1 \rightarrow 5:1 v/v) 溶出部より標記化合物15.4 g (57%) を淡黄色油状物として得た。

MS (FAB) m/z : 174 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 2.45 (3H, s), 3.86 (3H, s), 7.18-7.26 (1H, m), 7.26-7.37 (2H, m), 7.58-7.64 (2H, m).

【0443】

【参考例163】

7-アミノ-2-tert-ブチル-5-メチル-6-フェニルピラゾロ [1,5-a]ピリジン-4-カルボニトリル (1-163)

(5-tert-ブチル-1H-ピラゾール-3-イル)アセトニトリル (1-160) 300 mg (1.84 mmol) のテトラヒドロフラン (30 ml) 溶液に窒素雰囲気下、-30℃にて2.0Mのリチウムジイソプロピルアミドのヘプタン-テトラヒドロフラン-エチルベンゼンの混合溶液 2.02 ml (4.05 mmol) を滴下し同温で30分間攪拌した。3-メトキシ-2-フェニル-2-ブテンニトリル (1-162) 318 mg (1.84 mmol) のテトラヒドロフラン (5 ml) 溶液を-30℃にて滴下し同温にて4時間攪拌し、ついで0℃まで昇温し15時間攪拌した。酢酸エチルを加え有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (8:1 \rightarrow 6:1 v/v) 溶出部より標記化合物235 mg (42%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 305 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.42 (9H, s), 2.25 (3H, s), 5.48 (2H, brs), 6.44 (1H, s), 7.23-7.30 (2H, m), 7.42-7.56 (3H, m).

【0444】

【実施例62 & 63】

2-tert-ブチル-5-メチル-7-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニルピラゾ

ロ [1,5-a]ピリジン-4-カルボニトリル (# 62) および 2-tert-ブチル-3-クロロ-5-メチル-7-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-6-フェニルピラゾロ [1,5-a]ピリジン-4-カルボニトリル (# 63)

亜硝酸tert-ブチル 88 μ l (0.74 mmol) および塩化銅 (II) 80 mg (0.59 mmol) を窒素雰囲気下アセトニトリル (3 ml) 中75℃にて数分間加熱した。そこに7-アミノ-2-tert-ブチル-5-メチル-6-フェニルピラゾロ [1,5-a]ピリジン-4-カルボニトリル (I-163) 150 mg (0.49 mmol) を加え、同温にて1時間攪拌した。クロロホルムを加え有機層を1規定塩酸および飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (8:1 v/v) 溶出部より主生成物を得た。これをN,N-ジメチルホルムアミド (2 ml) に溶解し、(3S)-ジメチルアミノピロリジン 21 mg (0.185 mmol) およびトリエチルアミン 41 μ l (0.308 mmol) を加え80-90℃にて4時間攪拌した。冷却後、反応液に酢酸エチルを加え飽和食塩水で洗浄し有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (200:1 \rightarrow 100:1 v/v) 溶出部より標記化合物 (# 62: 23 mg、黄色固体; # 63: 24.8 mg、黄色固体) をそれぞれ得た。

【0445】

62:

MS (FAB) m/z: 402 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.42 (9H, s), 1.50-1.70 (1H, m), 1.88-1.97 (1H, m), 2.17 (6H, s), 2.20 (3H, s), 2.63-2.75 (1H, m), 3.16-3.26 (2H, m), 3.38-3.59 (2H, m), 6.45 (1H, s), 7.09-7.23 (2H, m), 7.35-7.47 (3H, m).

IR (KBr): 2960, 2865, 2817, 2768, 2209, 1603, 1515, 1468, 1443 cm⁻¹.

63:

MS (FAB) m/z: 436 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.50 (9H, s), 1.55-1.75 (1H, m), 1.87-2.02 (1H, m), 2.15 (6H, s), 2.23 (3H, s), 2.58-2.70 (1H, m), 3.09-3.23 (2H, m), 3.37-3.58 (2H, m), 7.07-7.23 (2H, m), 7.36-7.47 (3H, m).

IR (KBr): 2965, 2864, 2816, 2770, 2212, 1599, 1514, 1470, 1442 cm⁻¹.

【0446】

【参考例164】

3-クロロメチル-5-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸エチル塩酸塩 (I-164)

文献 (Synthesis, 448, (1978)) 記載の方法に従い合成した3-ヒドロキシメチル-5-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸エチル 16.0 g (86.9 mmol) に4規定塩酸のジオキサン溶液 (220 ml) を加え室温にて20分間攪拌した。反応液にエーテルを加え20分間攪拌した後、析出した結晶をろ取した (原料の塩酸塩、18.4 g, 96%)。この塩酸塩 18 g (81.6 mmol) に塩化チオニル (90 ml) を加え70℃にて3時間攪拌した。放冷後、反応液を減圧下濃縮し、得られた残留物にエーテルを加え析出した結晶をろ取して標記化合物 18.7 g (96%) を得た。

MS (FAB) m/z: 203 (-HCl) (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.42 (3H, t, J = 7.2 Hz), 2.75 (3H, s), 4.41 (2H, q, J = 7.2 Hz), 4.99 (2H, s), 13.22 (2H, brs).

【0447】

【参考例165】

5-シアノメチル-3-メチル-1H-ピラゾロ-4-カルボン酸エチル (I-165)

3-クロロメチル-5-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸エチル塩酸塩 (I-164) 18.0 g (75.3 mmol) のエタノール (150 ml) 溶液をシアン化カリウム 34.5 g (0.53 mol) の水 (50 ml) 溶液に氷冷下1時間かけて滴下し同温にて1時間、さらに室温にて4時間攪拌した。反応液をろ過し、ろ液を減圧下濃縮後、得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (40:1 v/v) 溶出部より標記化合物 12.2 g (84

%) を無色結晶として得た。

MS (FAB) m/z : 194 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.39 (3H, t, J = 7.2 Hz), 2.56 (3H, s), 4.01 (2H, s), 4.33 (2H, q, J = 7.2 Hz), 11.04 (1H, brs).

【0448】

【参考例166】

7-アミノ-4-シアノ-2,5-ジメチル-6-フェニルピラゾロ[1,5-a]ピリジン-3-カルボン酸エチル (1-166)

ジイソプロピルアミン4.7 ml (33.0 mmol) のテトラヒドロフラン (170 ml) 溶液に-30℃にて1.55 mol/lのn-ブチルリチウムのn-ヘキサン溶液21.3 ml (33.0 mmol) を加え同温にて1時間攪拌した。次いで、5-シアノメチル-3-メチル-1H-ピラゾロ-4-カルボン酸エチル (1-165) 2.9 g (15.0 mmol) のテトラヒドロフラン (100 ml) 溶液を10分間以上かけて滴下し同温にて1時間攪拌した後、3-メトキシ-2-フェニル-2-ブテンニトリル (1-162) 2.60 g (15.0 mmol) のテトラヒドロフラン (30 ml) 溶液を10分間以上かけて滴下し同温にて2時間、さらに0℃にて15時間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (1:1 v/v) 溶出部より標記化合物750 mg (15%) を褐色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 335 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.45 (3H, q, J = 7.2 Hz), 2.35 (3H, s), 2.67 (3H, s), 4.48 (2H, q, J = 7.2 Hz), 5.61 (2H, brs), 7.27-7.30 (2H, m), 7.45-7.58 (3H, m).

【0449】

【参考例167】

7-クロロ-4-シアノ-2,5-ジメチル-6-フェニルピラゾロ[1,5-a]ピリジン-3-カルボン酸エチル (1-167)

亜硝酸tert-ブチル320 μ l (2.69 mmol) および塩化銅 (II) 289 mg (2.15 mmol) を窒素雰囲気下アセトニトリル (12 ml) 中70℃にて数分間加熱した。そこに7-アミノ-4-シアノ-2,5-ジメチル-6-フェニルピラゾロ[1,5-a]ピリジン-3-カルボン酸エチル (1-166) 600 mg (1.79 mmol) を加え、同温にて1時間攪拌した。放冷後、減圧下溶媒を留去し得られた残留物にクロロホルムを加え有機層を1規定塩酸および飽和食塩水で洗浄後、硫酸マグネシウムで乾燥し溶媒を留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、n-ヘキサン-酢酸エチル (8:1 v/v) 溶出部より標記化合物274 mg (41%) を淡黄色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 354 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.46 (3H, q, J = 7.2 Hz), 2.45 (3H, s), 2.74 (3H, s), 4.50 (2H, q, J = 7.2 Hz), 7.19-7.28 (2H, m), 7.48-7.59 (3H, m).

【0450】

【実施例64】

4-シアノ-7-[(3S)-ジメチルアミノピロリジン-1-イル]-2,5-ジメチル-6-フェニルピラゾロ[1,5-a]ピリジン-3-カルボン酸エチル (# 64)

7-クロロ-4-シアノ-2,5-ジメチル-6-フェニルピラゾロ[1,5-a]ピリジン-3-カルボン酸エチル (1-167) 262 mg (0.741 mmol) のN,N-ジメチルホルムアミド (10 ml) に溶解し、(3S)-ジメチルアミノピロリジン102 mg (0.889 mmol) およびトリエチルアミン197 μ l (1.48 mmol) を加え80-90℃にて4.5時間攪拌した。冷却後、反応液に酢酸エチルを加え飽和食塩水で洗浄し有機層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧下留去した。得られた残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、クロロホルム-メタノール (100:1 v/v) 溶出部より標記化合物281 mg (88%) を淡茶色固体として得た。

MS (FAB) m/z : 432 (M+1)⁺.

¹H-NMR (CDCl₃) δ : 1.44 (3H, q, J = 7.1 Hz), 1.56-1.72 (1H, m), 1.88-2.00 (1H, m), 2.14 (6H, s), 2.31 (9H, s), 2.60-2.70 (4H, m), 3.11-3.23 (2H, m), 3.33-3.53 (2

H, m), 4.49 (2H, q, J = 7.1 Hz), 7.08-7.14 (1H, m), 7.20-7.28 (1H, m), 7.35-7.51 (3H, m).

IR (KBr): 2970, 2953, 2814, 2763, 2214, 1706, 1595, 1512, 1483, 1465 cm^{-1} .

元素分析値: $\text{C}_{25}\text{H}_{29}\text{N}_5\text{O}_2$ として

理論値: C, 69.58%; H, 6.77%; N, 16.23%

実測値: C, 69.43%; H, 6.77%; N, 16.22%.

【0451】

【試験例1】

本発明化合物の抗真菌活性の測定法は、日本医真菌学会標準化委員会、1999年 真菌誌 40, 243-246 に準じて行い（アラマーブルー）、薬剤無添加発育を陽性コントロールとして、これに対する50%もしくは80%増殖抑制（GI50, GI80）濃度（ $\mu\text{g/ml}$ ）を測定した。結果を表3に示す。

【0452】

【表3】

実施例	D-No.	<i>Saccharomyces</i>	<i>Candida</i>	<i>Candida</i>	<i>Candida</i>
		<i>cerevisiae</i>	<i>albicans</i>	<i>glabrata</i>	<i>krusei</i>
		AY-14	ATCC MYA-573	ATCC48435	ATCC44507
8	D21-7677	2	1	0.125	>4
9	D21-5964	0.125	0.25	0.25	>4
25	D21-1791	0.063	4	0.125	>4
33	D21-3166	0.004	4	0.008	4
39	D21-7628	0.063	0.5	0.25	>4
62	D31-1733	2	4	2	4
	AMPH	0.016	0.063	0.016	0.063
	Fluconazole	4	>4	4	>4
		GI80	GI50	GI80	GI50


【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 1, 6-β-グルカン合成阻害という作用メカニズムに基づく抗真菌作用を広くスペクトルで、かつ特異的または選択的に発現し得るような化合物を提供し、このような化合物、その塩、またはそれらの溶媒和物を含有する抗真菌剤を提供する。

【解決手段】 下式（I）で表される化合物、その塩、またはそれらの溶媒和物。


【化1】



【書類名】 手続補正書
 【整理番号】 P046130
 【提出日】 平成16年 2月25日
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【事件の表示】
 【出願番号】 特願2004- 38918
 【補正をする者】
 【識別番号】 000002831
 【氏名又は名称】 第一製薬株式会社
 【代理人】
 【識別番号】 100105647
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 小栗 昌平
 【電話番号】 03-5561-3990
 【手続補正1】
 【補正対象書類名】 特許請求の範囲
 【補正対象項目名】 請求項1
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】


下式（I）で表される化合物、その塩、またはそれらの溶媒和物。

【化1】



【式中、
 R^1 は、置換基を有していてもよい塩基性基を意味し、
 R^2 は、
 水素原子、
 ハロゲン原子、
 カルボキシ基、下式

【化2】



（式中、 R^{21} および R^{22} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を表す。）で表される基、
 炭素数1から6のアルキル基、
 炭素数2から6のアルケニル基、
 炭素数2から6のアルキニル基、
 炭素数2から7のアシル基、
 炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、

炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 5 から 6 のシクロアルケニル基、
炭素数 4 から 12 のシクロアルキルアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）


、
炭素数 3 から 10 のヘテロアリール基、または
炭素数 3 から 12 のヘテロアリールアルキル基を意味するが、
 R^{21} が、

アルキル基、
アルケニル基、
アルキニル基、
アシル基、または
アルコキシカルボニル基である場合、これらは、【置換基群 2-1】から選ばれる 1 種以上の基 1 個以上を置換基として有していてもよい；

【置換基群 2-1】：

ハロゲン原子、
アミノ基、
イミノ基、
ニトロ基、
水酸基、
メルカプト基、
カルボキシ基、
シアノ基、
スルホ基、
ジアルキルホスホリル基、下式

【化 3】



（式中、 R^{211} および R^{221} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。）で表される基、


炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 3 からの 6 シクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、および
炭素数 6 から 10 のアリールチオ基；
ここで【置換基群 2-1】のアミノ基は、
ホルミル基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、

炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
芳香族複素環基、
炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および
炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基
からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、
該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよく、
【置換基群 2-1】の水酸基、または【置換基群 2-1】のメルカプト基は、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
芳香族複素環基からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。) からなる群から選ばれる置換基を有していてもよく、
 R^{21} が、シクロアルキル基であるときは、これらは【置換基群 2-2】から選ばれる 1 種以上の基 1 個以上を置換基として有していてもよい；

【置換基群 2-2】：


ハロゲン原子、
アミノ基、
イミノ基、
ニトロ基、
水酸基、
メルカプト基、
カルボキシ基、
シアノ基、
スルホ基、下式

【化 4】



(式中、 R^{212} および R^{222} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。) で表される基、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、および
炭素数 1 から 7 のアルコキシカルボニル基、
【置換基群 2-2】のアミノ基は、
ホルミル基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、

炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
芳香族複素環基、
炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および
炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基
からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、
該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。
 R^{213} が、
アリール基、
アラルキル基、
ヘテロアリール基、または
ヘテロアリールアルキル基である場合、これらは【置換基群 2－3】から選ばれる 1 種以上
の基 1 個以上を置換基として有していてもよい；
【置換基群 2－3】：
ハロゲン原子、
アミノ基、
イミノ基、
ニトロ基、
水酸基、
メルカプト基、
カルボキシ基、
シアノ基、
スルホ基、下式
【化 5】




(式中、 R^{213} および R^{223} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、
または炭素数 6 から 10 のアリール基を意味する。) で表される基、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 7 から 12 のアラルキルオキシ基、
炭素数 8 から 15 のアラルキルオキシカルボニル基、
アリール基、および
炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子
、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）
；
【置換基群 2－3】のアミノ基は、
ホルミル基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、

炭素数 2 から 7 のアシル基、
 炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
 炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
 炭素数 6 から 10 のアリール基、
 炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
 芳香族複素環基、
 炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および
 炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基
 からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、
 該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。
 R^{214} が、複素環基である場合は、次の【置換基群 2-4】から選ばれる 1 個または 2 個の
 基を置換基として有してもよい；

【置換基群 2-4】：

ハロゲン原子、
 アミノ基、
 水酸基、
 メルカプト基、
 カルボキシ基、
 スルホ基、下式

【化 6】



(式中、 R^{214} および R^{224} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、
 または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。) で表される基、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、
 炭素数 2 から 6 のアルケニル基、
 炭素数 2 から 6 のアルキニル基、
 炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
 炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、
 炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、
 炭素数 2 から 7 のアシル基、
 炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、および
 炭素数 6 から 10 のアリール基；

ここで、【置換基群 2-4】のアミノ基は、

ホルミル基、
 炭素数 1 から 6 のアルキル基、
 炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
 炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
 炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、
 炭素数 2 から 7 のアシル基、
 炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
 炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
 炭素数 6 から 10 のアリール基、
 炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
 炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子
 、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）

芳香族複素環基、

炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および

炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、

該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

また、 R^1 と R^2 とが一緒になり、これらが結合している炭素原子を含んで、環状構造を形成してもよく、この環内には、窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種または 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 2 個を含み、ここで形成される構造部分は、飽和でも不飽和でもいずれでもよい。

R^3 は、

水素原子、

ハロゲン原子、

アミノ基、

水酸基、

メルカプト基、


ニトロ基、

シアノ基、

ホルミル基、

カルボキシ基、下式

【化 7】



（式中、 R^{31} および R^{32} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を表す。）で表される基、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、

炭素数 2 から 6 のアルケニル基、

炭素数 2 から 6 のアルキニル基、

炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、

炭素数 2 から 5 のアシル基、

炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基、

炭素数 3 から 7 のシクロアルキル基、

炭素数 4 から 7 のシクロアルケニル基、

炭素数 6 から 10 のアリール基、

炭素数 7 から 12 のアラルキル基、

炭素数 3 から 10 のヘテロアリール基を意味するが、

該アミノ基、該水酸基、または該メルカプト基は、保護基によって保護されていてもよい。

R^3 が、

アルキル基、

アルケニル基、

アルキニル基、

アルコキシ基、

アルキルチオ基、

アシル基、

アルコキシカルボニル基、

シクロアルキル基、

シクロアルケニル基、

アリール基、
アラルキル基、または
ヘテロアリール基である場合、
これらは【置換基群 3-1】から選ばれる 1 種以上の基を 1 個以上置換基として有していてもよい。

【置換基群 3-1】：

アミノ基、
水酸基、
メルカプト基、
ハロゲン原子、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、
炭素数 2 から 5 のアシル基、および
炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基；

【置換基群 3-1】のアミノ基は、
ホルミル基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
芳香族複素環基、
炭素数 2 から 5 のアシル基、および
炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基

からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、
該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。
また、 R^2 と R^3 とが一緒になってポリメチレン鎖構造を形成し、 R^2 と R^3 が結合する炭素原子を含んで、5 員環または 6 員環の環状構造を形成してもよい。さらにこのポリメチレン鎖は、窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 または 2 個含んでいてもよい。
ここで形成されたポリメチレン鎖は、【置換基群 3-2】から選ばれる 1 種以上の基を 1 個以上置換基として有していてもよい。

【置換基群 3-2】：


アミノ基、
水酸基、
メルカプト基、
ハロゲン原子、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、
炭素数 2 から 5 のアシル基、および
炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基；

【置換基群 3-2】のアミノ基は、
ホルミル基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
芳香族複素環基、
炭素数 2 から 5 のアシル基、および
炭素数 2 から 5 のアルコキシカルボニル基

からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有してもよく、
該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。
 R^4 は、

水素原子、
炭素数 1 から 4 のアルキル基、
炭素数 3 から 8 の環状アルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 5 から 9 のヘテロアリール基、
炭素数 2 から 6 のアルキニル基、または下式

【化 8】



(式中、 R^{41} および R^{42} は、各々独立に、
水素原子、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基であるか、
または、両者が一体化して、エクソメチレン構造となってもよく、
このエクソメチレン構造は、さらに
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
または炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基
を置換基として有していてもよい。

R^{43} は、
水素原子、
ハロゲン原子、
水酸基、
メルカプト基、
ニトリル基、
ニトロ基、
カルボキシ基、
炭素数 2 から 7 のアルコシカルボニル基、
炭素数 2 から 7 のアルキルアミノカルボニル基、
炭素数 7 から 11 のアリールアミノカルボニル基、
炭素数 2 から 7 のシクロアルキルアミノカルボニル基、
炭素数 8 から 12 のアラルキルアミノカルボニル基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、
炭素数 3 から 8 のシクロアルキル基、
炭素数 3 から 8 のシクロアルキルオキシ基、
炭素数 7 から 11 のアラルキル基、または
炭素数 7 から 11 のアラルキルオキシ基を意味する。)


で表される基であるが、

R^{41} が、アルキル基、環状アルキル基、アリール基、またはヘテロアリール基である場合、
そして R^{43} がアルキル基である場合、これらは【置換基群 4】から選ばれる 1 種以上の
基を 1 個以上置換基として有していてもよい。

【置換基群 4】：

ハロゲン原子、
アミノ基、
イミノ基、
ニトロ基、
水酸基、
メルカプト基、
カルボキシ基、
シアノ基、
スルホ基、下式

【化9】



（式中、 R^{411} および R^{421} は、各々独立して、水素原子、炭素数1から6のアルキル基、または炭素数6から10のアリール基を意味する。）

で表される基、

炭素数1から6のアルコキシ基、

炭素数1から6のアルキルチオ基、

炭素数2から7のアシル基、

炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、

炭素数7から12のアラルキルオキシ基、

炭素数8から15のアラルキルオキシカルボニル基、

炭素数6から10のアリール基、および

炭素数2から10の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる1種以上のヘテロ原子を1個から4個含む。）
；

【置換基群4】のアミノ基は、

ホルミル基、

炭素数1から6のアルキル基、

炭素数1から6のアミノアルキル基、

炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、

炭素数1から6のメルカプトアルキル基、

炭素数2から7のアシル基、

炭素数2から7のアルコキシカルボニル基、

炭素数3から6のシクロアルキル基、

炭素数6から10のアリール基、

炭素数7から12のアラルキル基、

芳香族複素環基、

炭素数1から6のアルキルスルホニル基、および

炭素数6から10のアリールスルホニル基

からなる群から選ばれる1個または2個の基を置換基として有していてもよく、さらに、該アミノ基の置換基が2個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。

【置換基群4】の水酸基、または【置換基群4】のメルカプト基は、

炭素数1から6のアルキル基、

炭素数1から6のアミノアルキル基、

炭素数1から6のヒドロキシアルキル基、

炭素数1から6のメルカプトアルキル基、

炭素数2から7のアシル基、

炭素数3から6のシクロアルキル基、

炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
芳香族複素環基からなる群から選ばれる置換基を有していてもよく、
 R^4 が、アルキニル基の場合は、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 2 から 12 のアルコキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、または
カルボキシ基、
を置換基として有していてもよい。

X^1 および X^2 は、各々独立に、
窒素原子であるかまたは、

水素原子、

ハロゲン原子、

炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

置換基を有していてもよい炭素数 1 から 6 のアルキル基、もしくは
エステル基からなる群の基から選ばれる基で置換された炭素原子を意味するが、
 X^1 および X^2 のいずれか一方は必ず窒素原子である。

ここで、アルキル基の置換基は、次の置換基の群から選ばれる、1 または 1 以上の基である。

ハロゲン原子、

アミノ基、

ニトロ基、

水酸基、

メルカプト基、

カルボキシ基、

シアノ基、

炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、

炭素数 2 から 7 のアシル基、

炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、

炭素数 3 からの 6 シクロアルキル基、および

炭素数 6 から 10 のアリール基；

炭素原子上の置換基がエステルであるときこれらは、

炭素数 1 から 6 のアルキルエステル、

炭素数 6 から 10 のアリールエステル、

または炭素数 1 から 6 のアルキル基と炭素数 6 から 10 のアリール基とから構成されるアラルキルエステルでよく；

さらにこれらのアリールエステルおよびアラルキル基のアリール部分は、次の置換基の群から選ばれる、1 または 1 以上の基によって置換されていてもよい；

ハロゲン原子、

アミノ基、

ニトロ基、

水酸基、

メルカプト基、

カルボキシ基、

シアノ基、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、

炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、

炭素数 2 から 7 のアシル基、

炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 3 からの 6 シクロアルキル基、および
炭素数 6 から 10 のアリール基；
を意味する。】

【手続補正 2】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 請求項 6


【補正方法】 変更

【補正の内容】

【請求項 6】

R^{51} が、下式で表される基である請求項 5 に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物；


【化 13】



【式中、Xa は、酸素原子、硫黄原子、または $>NR^{52}$ を意味する。

R^{51} および R^{52} は、各々独立に、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、または炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基を意味し、置換基 Q は、次式、

【化 14】



で表わされる置換基を意味し、

b は、0、1、または 2 の整数を意味し、

n は 0 または 1 の整数を意味し、

R^{61} および R^{62} は、各々独立に、

水素原子、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、または

炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基であるか、

アミノ酸、ジペプチド、もしくは個から 5 個のアミノ酸からなるポリペプチドを意味し、

R^{71} および R^{72} は、各々独立に、

水素原子、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、

炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、

炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、

炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、

炭素数 2 から 12 のアルコキシアルキル基、

炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、

置換基を有してもよいフェニル基、または

置換基を有していてもよい炭素数 3 から 10 のヘテロアリール基を意味する。】

【手続補正3】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 請求項 8


【補正方法】 変更

【補正の内容】


【請求項 8】

R^2 が、下式化 1 5 または 化 1 6 で表される基である請求項 7 に記載の化合物、その塩、またはそれらの水和物。

【化 1 5】



【化 1 6】



(式中、X_bは、酸素原子、硫黄原子、または >NR^8 を意味するが、ここで R^8 は、水素原子、

炭素数 1 から 6 のアルキル基、または

炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基を意味する。

置換基 Y^1 は、

ハロゲン原子、

アミノ基、

イミノ基、

ニトロ基、

水酸基、


メルカプト基、

カルボキシ基、

シアノ基、

スルホ基、下式

【化 1 7】



(式中、 R^{213} および R^{223} は、各々独立して、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 6 から 10 のアリール基を意味する。) で表される基、

炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、

炭素数 1 から 6 のアルキルチオ基、

炭素数 2 から 7 のアシル基、

炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、

炭素数 7 から 12 のアラルキルオキシ基、

炭素数 8 から 15 のアラルキルオキシカルボニル基、

アリール基、および

炭素数 2 から 10 の単環式、二環式もしくはスピロ環式の複素環基（窒素原子、酸素原子、および硫黄原子からなる群から選ばれる 1 種以上のヘテロ原子を 1 個から 4 個含む。）

を表し、

該アミノ基は、

ホルミル基、
炭素数 1 から 6 のアルキル基、
炭素数 1 から 6 のアミノアルキル基、
炭素数 1 から 6 のヒドロキシアルキル基、
炭素数 1 から 6 のメルカプトアルキル基、
炭素数 2 から 7 のアシル基、
炭素数 2 から 7 のアルコキシカルボニル基、
炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基、
炭素数 6 から 10 のアリール基、
炭素数 7 から 12 のアラルキル基、
芳香族複素環基、
炭素数 1 から 6 のアルキルスルホニル基、および
炭素数 6 から 10 のアリールスルホニル基
からなる群から選ばれる 1 個または 2 個の基を置換基として有していてもよく、さらに、
該アミノ基の置換基が 2 個の場合は互いに結合して環状構造を形成してもよい。)

【手続補正 4】

【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 0049
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【0049】

X¹およびX²は、各々独立に、窒素原子であるかまたは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数 1 から 6 のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数 1 から 6 のアルキル基、もしくはエステル基からなる群の基から選ばれる基で置換された炭素原子を意味するが、X¹およびX²のいずれか一方は必ず窒素原子である。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 0094
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【0094】

【式中、X^aは、酸素原子、硫黄原子、または $\geq \text{NR}^{52}$ を意味する。R⁵¹およびR⁵²は、各々独立に、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基、または炭素数 3 から 6 のシクロアルキル基を意味し、置換基 Q は、次式、

【手続補正 6】

【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 0120
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【0120】

(式中、X^bは、酸素原子、硫黄原子、または $\geq \text{NR}^8$ を意味するが、ここでR⁸は、水素原子、炭素数 1 から 6 のアルキル基、または炭素数 1 から 6 のハロゲノアルキル基を意味する。置換基 Y¹は、【置換基群 2-3】に前述したと同じものを意味する。)

【手続補正7】

【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 0 1 5 6
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【0 1 5 6】

X^1 および X^2 は、各々独立に、窒素原子であるかまたは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1から6のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1から6のアルキル基、もしくはエステル基からなる群の基から選ばれる基で置換された炭素原子を意味するが、 X^1 および X^2 のいずれか一方は必ず窒素原子である。

【手続補正8】

【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 0 1 7 4
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【0 1 7 4】

(式中、 X^1 および X^2 は、各々独立に、窒素原子であるかまたは、水素原子、ハロゲン原子、炭素数1から6のアルコキシ基、置換基を有していてもよい炭素数1から6のアルキル基、もしくはエステル基からなる群の基から選ばれる基で置換された炭素原子を意味するが、 X^1 および X^2 のいずれか一方は必ず窒素原子である。)

【書類名】	手続補正書
【整理番号】	P046130
【提出日】	平成17年 2月17日
【あて先】	特許庁長官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	特願2004- 38918
【補正をする者】	
【識別番号】	000002831
【氏名又は名称】	第一製薬株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100105647
【弁理士】	
【氏名又は名称】	小栗 昌平
【電話番号】	03-5561-3990
【手続補正1】	
【補正対象書類名】	特許願
【補正対象項目名】	発明者
【補正方法】	変更
【補正の内容】	
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社内
【氏名】	川上 勝浩
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社内
【氏名】	金井 一夫
【発明者】	
【住所又は居所】	富山県高岡市長慶530番地 第一ファインケミカル株式会社内
【氏名】	藤沢 哲則
【発明者】	
【住所又は居所】	富山県高岡市長慶530番地 第一ファインケミカル株式会社内
【氏名】	森田 親典
【発明者】	
【住所又は居所】	富山県高岡市長慶530番地 第一ファインケミカル株式会社内
【氏名】	鈴木 貴
【その他】	平成16年2月16日出願の特許願の発明者の欄で、発明者の内のひとりである者の氏名「鈴木 貴」が「鈴木 貫」と誤記しているのを補正をするものである。

【書類名】 手続補正書
【整理番号】 P046130
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2004- 38918
【補正をする者】
【識別番号】 000002831
【氏名又は名称】 第一製薬株式会社
【代理人】
【識別番号】 100105647
【弁理士】
【氏名又は名称】 小栗 昌平
【電話番号】 03-5561-3990
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許願
【補正対象項目名】 発明者
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【発明者】
【住所又は居所】 東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社内
【氏名】 川上 勝浩
【発明者】
【住所又は居所】 東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社内
【氏名】 金井 一夫
【発明者】
【住所又は居所】 富山県高岡市長慶寺530番地 第一ファインケミカル株式会社内
【氏名】 藤沢 哲則
【発明者】
【住所又は居所】 富山県高岡市長慶寺530番地 第一ファインケミカル株式会社内
【氏名】 森田 親典
【発明者】
【住所又は居所】 富山県高岡市長慶寺530番地 第一ファインケミカル株式会社内
【氏名】 鈴木 貴
【その他】 私共、代理人は第一製薬株式会社からの依頼により平成16年2月16日付で出願いたしました。その際、願書を作成するにあたり、発明者の「藤沢 哲則、森田 親典、鈴木 貴」の住所又は居所を正しくは「富山県高岡市長慶寺530番地 第一ファインケミカル株式会社内」と記載すべきところ、「富山県高岡市長慶寺530番地 第一ファインケミカル株式会社内」と誤って記載してしまいました。よって、本手続補正書により正しい住所又は居所である「富山県高岡市長慶寺530番地 第一ファインケミカル株式会社内」に訂正させて頂きたく、お願いする次第であります。

出願人履歴

0 0 0 0 0 2 8 3 1

19900828

新規登録

東京都中央区日本橋3丁目14番10号

第一製薬株式会社